

DIETA SENSORIAL – PROGRAMA DE ATENCIÓN TEMPRANA PAT

I. Antecedentes:

Nombre: Trinidad Bravo Peña

Edad: 6 años

Diagnóstico: Trastorno del Espectro Autista

Instrumentos evaluación: Sensory Processing Measure 2 – Observación clínica – Pauta semiestructurada de integración sensorial – Entrevista a padres.

Áreas sensoriales más afectadas:

- Auditiva (hipersensibilidad)
- Gusto/Olfato (selectividad alimentaria)
- Conciencia corporal (propiocepción y autorregulación motora)
- Planificación motora y praxis
- Participación social (desregulación ante cambios, cercanía y ruido)


II. Fundamentación:

La dieta es una estrategia terapéutica que consiste en incorporar de forma planificada actividades sensoriales durante el día, con el objetivo de ayudar a regular el sistema nervioso y mantener un nivel de alerta adecuado. Está diseñada según las necesidades individuales de cada persona, considerando estímulos como el movimiento, el tacto, los sonidos, los sabores y las señales internas del cuerpo.

III. Valoración Cuantitativa:

1) Resultado del Sensory Processing Measure, Second Edition (SPM-2)

Area	Puntaje	Interpretación
Participación Social	70	Dificultades severas
Visión	58	Funcionamiento típico
Audición	64	Dificultades moderadas
Tacto	56	Funcionamiento típico
Gusto y Olfato	60	Dificultades moderadas
Conciencia corporal	63	Dificultades moderadas
Equilibrio y movimiento	49	Funcionamiento típico
Planificación e ideas	66	Dificultades moderadas
Puntaje corporal total	61	Dificultades moderadas



IV. Valoración Cualitativa

• Perfil Sensorial:

Según la observación clínica y la aplicación del instrumento de evaluación *Sensory Processing Measure-2 (SPM-2)*, Trinidad presenta, a nivel general, **dificultades sensoriales moderadas** en las áreas de audición, gusto y olfato, conciencia corporal, y planificación e ideación motora. Asimismo, se identifican **dificultades severas en la participación social**.

DIETA SENSORIAL – PROGRAMA DE ATENCIÓN TEMPRANA PAT

Desde el área de la **propiocepción** (sentido que informa sobre la posición y el movimiento del cuerpo en el espacio, así como la fuerza y presión ejercida.) Trinidad muestra un perfil **hiposensible**, lo que se traduce en un **bajo registro sensorial**. Esta condición la lleva a **buscar activamente estímulos propioceptivos** con el fin de regular su nivel de alerta y mantener un estado óptimo de funcionamiento.

Esta hiposensibilidad también puede repercutir en el sentido de la **interocepción**, que nos permite percibir señales internas del cuerpo, como el hambre, la sed, el ritmo cardíaco o la necesidad de ir al baño. En este contexto, una **disminución en la conciencia corporal general** puede dificultar el reconocimiento de señales internas, como la presión en la vejiga o el recto.

En consecuencia, una alteración en la interocepción puede impedir que Trinidad **perciba o interprete adecuadamente** las señales que indican la necesidad de ir al baño, lo cual podría explicar los **episodios de enuresis y encopresis** que presenta.

- **Objetivos:**

- 1) Promover un estado de alerta óptimo para el aprendizaje y la interacción.
- 2) Disminuir respuestas de sobrecarga sensorial auditiva.
- 3) Mejorar la conciencia corporal y la modulación de la fuerza.
- 4) Establecer rutinas sensoriales predecibles que favorezcan la autorregulación.
- 5) Facilitar la participación social y el juego mediante ajustes sensoriales.

- **Estrategias:**

Según horario rutina:

Horario	Actividades/ Estrategias
Mañana	• Actividades de presión profunda: envolverla como burrito con una frazada, o recibir masajes con pelotas suaves. • Respiración profunda con imágenes visuales (“inflar un globo”, “apagar una vela”). • Uso de ropa ajustada tipo lycra o chaleco con peso suave si es tolerado (estimulación propioceptiva constante). • Reducción de ruidos ambientales fuertes durante la rutina (evitar música o TV fuerte).
En la escuela	Entrada al aula: • Uso de audífonos con cancelación de ruido o protectores auditivos durante transiciones. • Estrategia visual de anticipación (panel con pictogramas de la jornada).

DIETA SENSORIAL – PROGRAMA DE ATENCIÓN TEMPRANA PAT

	Durante las actividades: • Alternancia entre tareas estructuradas y pausas sensoriales. • Caja sensorial con objetos para manipular (pelotas con textura, plastilina, peso leve). • Uso de elementos pesados durante la jornada: libros sobre el regazo, mochila con peso leve, manta de peso. Durante el recreo: • Actividades motoras dirigidas: empujar una caja con peso, juego de arrastre o circuito propioceptivo (colchonetas, túneles, escaleras). • Supervisión estructurada del juego con apoyo visual si hay desregulación social.
Tarde en casa	• Actividades de organización corporal: ◦ Jugar con peso: llevar ropa al canasto, cargar cojines, arrastrar objetos. ◦ Juegos de presión profunda: “lucha de almohadas”, “hacer fuerza con las manos” (push wall). ◦ Juego simbólico guiado con bloques o muñecos (acompañamiento adulto para modelar ideas). • Actividades de estimulación táctil y olfativa: ◦ Ayudar con la preparación de alimentos, generando exploración de nuevas texturas, olores y comidas. ◦ Estimulación olfativa controlada si se tolera: jugar con masas aromáticas, explorar esencias suaves.
Noche	• Rutina calmante estructurada: baño tibio, luces bajas, sin pantallas. • Actividad sensorial pasiva: masaje con crema, manta con peso (si se tolera). • Historia con imágenes + respiración profunda antes de dormir. • Uso de manta de peso para dormir.

DIETA SENSORIAL – PROGRAMA DE ATENCIÓN TEMPRANA PAT

Según sistemas sensoriales:

Input Sensorial	Objetivo	Actividades/Estrategias
Propiocepción	Establecer estrategias propioceptivas de regulación.	- Ofrecer un “Abrazo con fuerza”. - Dar apretones leves o carga de peso a través de la palma de la mano en la espalda, los hombros y los brazos. - Tomar una pelota con peso. - Entregar una pelota antiestrés para apretar. - Uso de manta de peso.
Audición	Disminuir las respuestas de malestar o evitación frente a estímulos auditivos del entorno.	- Usar protectores auditivos suaves o auriculares con cancelación de ruido en entornos ruidosos. - Usar pictogramas o señales visuales para anticipar actividades ruidosas. - Escuchar música relajante (con ritmo lento y sin letra). - Tiempos breves en silencio total o con sonidos naturales (ruido blanco, lluvia suave, bosque).
Vestibular	Establecer estrategias vestibulares de regulación.	- Realizar pausas en el columpio. - Juegos de balance en una tabla de equilibrio o cojín inestable. - Caminar sobre líneas, laberintos o formas en el suelo. - Movimientos suaves para activar el cuerpo (balanceo sentado, estiramientos con movimiento). - Meceo en una hamaca, silla mecedora o pelota terapéutica.

**DIETA SENSORIAL –
PROGRAMA DE ATENCIÓN TEMPRANA PAT**

Visual	Reducir estímulos visuales. Promover el movimiento ocular en todo su espacio	- Bajar la intensidad de las luces - Disminuir la cantidad de objetos en el entorno
Gusto	Favorecer la exploración y aceptación gradual de nuevas texturas y sabores	- Presentar alimentos similares a los que tolera, con leves variaciones en forma o presentación. - Que Trinidad toque, huela y explore con utensilios alimentos nuevos sin necesidad de comerlos (jugar, cortar, ordenar por colores o texturas). - Realizar juego simbólico de alimentación con fideos, arroz o agua a un muñeco.
Interocepción	Favorecer el registro y la interpretación de señales internas del cuerpo (como hambre, sed y necesidad de ir al baño)	- Establecer horarios fijos para ir al baño, comer e hidratarse, acompañados de señales visuales (pictogramas, relojes visuales, canciones de rutina). - Usar muñecos o cuentos con imágenes que representen personajes que sienten ganas de ir al baño - Utilizar un “reloj del baño” o timer que le indique cuándo hacer una pausa para chequear su cuerpo (cada 1 hora o 1 hora y media) - Establecer una rutina con pictogramas que indique que luego de cada comida debe ir al baño.

V. Sugerencias

Entorno Familiar

- Usar apoyos visuales para la rutina diaria.
- No forzar el contacto físico si Trinidad lo evita.

DIETA SENSORIAL – PROGRAMA DE ATENCIÓN TEMPRANA PAT

- Acompañar con anticipación los cambios de rutina (transiciones, visitas, salidas).
- Evitar estímulos auditivos inesperados o muy intensos.
- Utilizar manta de peso al dormir.

Entorno Escolar

- Apoyo estructurado en el aula: rutina visual, anticipación y pausas sensoriales programadas.
- Permitir el uso de protectores auditivos en momentos ruidosos.
- Supervisar el juego con pares y reforzar interacciones sociales positivas.
- Adaptar la instrucción: tareas divididas en pasos visuales, tiempo extendido, repetición modelada.
- Dar espacio ante una desregulación, manteniendo lugar seguro y dando input propioceptivo de manera controlada y según tolerancia de Trinidad, luego se puede incorporar input vestibular.

Entorno Terapéutico

- Incorporar circuitos sensoriales con peso, balance, presión y coordinación.
- Trabajar la planificación motora desde lo funcional (vestirse, guardar objetos, juego con bloques).
- Apoyar el desarrollo de la comunicación y la participación desde el juego compartido.



Javiera Carvajal Herrán
Terapeuta Ocupacional Infanto-juvenil
Reg. SIS: 691375
GRUPO PSICOEDUKA



Valeska Ananías Gómez
Directora Clínica
GRUPO PSICOEDUKA

Viña del Mar, junio 2025