

RECOMENDACIONES DE TERAPIA OCUPACIONAL DIETA SENSORIAL – LUCAS REYES

A continuación, se detallan estrategias de intervención dirigidas a promover la regulación del sistema nervioso, optimizar el procesamiento sensorial y favorecer respuestas adaptativas en los distintos contextos de desempeño.

	RECOMENDACIONES
MAÑANA (10 – 15 minutos)	• Trabajo pesado: empujar caja con juguetes / arrastrar manta con peso liviano (3– 5 min). • “Sándwich” con cojines + presión profunda en brazos/piernas (2–3 min). • Vestibular breve: 6–10 giros controlados o balanceo (1–2 min) → terminar con presión profunda. (solo si permite el balanceo) • Oral propioceptivo: desayuno con crujientes (tostada dura, zanahoria cocida firme) o bombilla gruesa.
MEDIA MAÑANA (o antes de actividad dirigida) 5 – 10 minutos	• Empujar pared (10 repeticiones) + “carrera de animales” (oso/cangrejo). • Apretar pelota dura / banda elástica (1–2 min). • Regla: 1 instrucción → acción inmediata → reforzador breve.
ANTES DE ALMUERZO (3– 5 minutos)	• Presión profunda (cojines/masaje firme). • 1 actividad de empuje/carga corta. • Rutina visual de pasos (sentarse–comer–terminar).
TARDE 10–15 minutos	• Circuito: trepar–arrastrarse–empujar (5–7 min). • Rodar envuelto en manta / “burrito” (2–3 min). • Juego funcional con peso (llevar compras livianas, ordenar con cajas).
ANTES DE DORMIR (10 minutos)	• Propiocepción calmante: presión profunda lenta (ritmo constante). • Balanceo suave (no rotatorio intenso). • Rutina fija (mismas secuencias, misma música). • Considerar manta con peso solo si es segura y bien tolerada.
EN DESPERTARES NOCTURNOS	• Baja estimulación (luz tenue, voz baja). • Co-regulación corporal inmediata: ○ abrazo profundo / presión con cojines, ○ alternativa a cabezazos: “golpea cojín”, empuja pared con manos/pies. • Secuencia siempre igual (condiciona al sistema). • Evitar diálogo/explicaciones en ese momento.