

□心理テスト

- ・ 私は ()
- ・ 私は ()
- ・ 私は ()
- ・ 私は ()
- ・ 私は ()
- ・ 私は ()
- ・ 私は ()
- ・ 私は ()
- ・ 私は ()
- ・ 私は ()
- ・ 私は ()
- ・ 私は ()
- ・ 私は ()
- ・ 私は ()
- ・ 私は ()
- ・ 私は ()
- ・ 私は ()
- ・ 私は ()
- ・ 私は ()

□心理テスト (30 項目)

- ・ 回答の仕方
 - よくあてはまる (5)
 - ややあてはまる (4)
 - どちらともいえない (3)
 - あまりあてはまらない (2)
 - まったくあてはまらない (1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

□心理テスト（10 項目）

・ 回答の仕方

- 非常にあてはまる（4）
- やや当てはまる（3）
- やや当てはまらない（2）
- まったく当てはまらない（1）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

□心理テスト

1	受容的		21	優しい	
2	適応力がある		22	知識豊富である	
3	大胆な		23	論理的な	
4	勇敢な		24	愛情深い	
5	穏やかな		25	控えめな	
6	思いやりのある		26	神経質な	
7	明るい		27	忍耐力のある	
8	賢い		28	誇り高い	
9	自信のある		29	物静かな	
10	頼りになる		30	リラックスした	
11	威厳がある		31	感傷的な／センチメンタルな	
12	共感性のある		32	恥ずかしがりな	
13	エネルギーのある		33	信頼できる	
14	外向的な		34	あたたかい	
15	友好的な		35	気が利く	
16	幸せな				
17	理想的な				
18	自立した				
19	知的な				
20	内向的な				

- ・ このページをコピーして、家族や親友などあなたのことをよく知っている人に呈示する

■自己意識特性

- ・ 自己意識特性は複数の側面からなる
- ・ 自己意識特性には個人差がある
 - 公的自己意識特性：他人から見られている自分を意識しやすい傾向、すなわち自分の容姿や振る舞い方に注意を向けやすい傾向
 - 私的自己意識特性：自分の感情や態度、考えていることなど、内的で、他人は直接知ることができないような私的な側面に注意を向けやすい傾向
 - 対人不安の性格特性：他人がいる場面で精神的に動揺しやすい程度

■自己意識の発達

- ・ 自己意識特性には個人差がある
- ・ 一方で、一般的な発達傾向もある

■自己意識と抑うつ

- ・ 抑うつ傾向や不安の高い人は、慢性的に自己へ注意を向けた状態
→ 状況への対応や課題の遂行が妨げられていることを示唆

■自己評価 (self evaluation)

- ・ 自己の側面ごとの評価
- ・ コミュニケーションや他者との比較のなかで決まってくる



■自己複雑性

- ・ 夫であり、教師であり、テニスを楽しみ、釣りを楽しみ、多くの友人をもつ、男性
- ・ 夫である、男性

☆参考資料 1

- ・ 5、7、8、13、15、17、23、25、29
- ・ 3、4、6、14、18、24、30、16*、28*
- ・ 10、19、20、26、27、12*

FIGURE 1
The Johari Window




■自己開示 (self-disclosure)

- ・ 自分から話さなければ、他者は知りえないことについて、自分から話すこと

↓


- ・ 私たちは、だれにでも自己を開示するわけではない = 「なにをどのように話すか」が、その相手との親密さをあらわす

■自己開示の広がり (Altman & Taylor, 1973)



■自己開示の返報性 (Altman,1973)

- ・ 自己開示の受け手は、おなじくらいの量、おなじくらいの深さの自己開示を相手に返す傾向がある
↓
- ・ 関係の親密化過程において重要





■オープナー

- ・ 他者から自己開示を引き出しやすいタイプとそうでないタイプがある
- ・ 引き出しやすいタイプ = オープナー

□Miller, Berg, & Archer (1983)

- ・ 参加者：おなじ大学の寮に住んでいる女子学生 54 名
- ・ 手続き：
- ・ 事前にオープナー尺度と自己開示尺度に回答
 - オープナー（高 vs. 低）
 - 自己開示（高 vs. 低）
- ・ 従属変数：自分以外の参加者にたいする
 - 開示量
 - 好意度



☆参考資料 2

- ・ 1、3、4、7、10、2*、5*、6*、8*、9*

■自己開示と健康

- ・ カタルシス：浄化作用
 - つらい体験について語ることで、気分が晴れる、といわれている
 - ↓
- ・ 外傷体験の自己開示と健康にはどのような関連があるだろうか

□Pennebaker & Beall(1986)

- ・ 参加者：大学生男女46名
- ・ 手続き：4夜連続で15分ずつ、エッセーを書いてもらった
- ・ 条件：エッセーの種類4パターン
 - 統制条件
 - 外傷感情条件
 - 外傷事実条件
 - 外傷連合条件
- ・ 調べたこと
 - 短期効果
 - ✧ エッセーを書く前後で、心拍数、血圧、そのときの感情を評定
 - 長期効果（実験後6ヶ月）
 - ✧ 病院への来院頻度、病気になった回数
- ・ 結果と考察
- ・ 短期効果
 - 血圧：

統制条件	外傷事実条件	外傷連合条件
------	--------	--------
 - ネガティブ感情：

統制条件	外傷事実条件	外傷連合条件
------	--------	--------
- ・ 長期効果
 - 病院への来院頻度の増加：

統制条件	外傷感情条件	外傷事実条件	外傷連合条件
------	--------	--------	--------
 - 病気の回数：

統制条件	外傷事実条件	外傷感情条件	外傷連合条件
------	--------	--------	--------

(以下、余白)