第一章

解表劑

신순식

解表藥을 위주로 사용해서 조성된 것으로, 發汗·解肌·透疹 등의 작용을 갖추고 있으면서 주로 表證을 치료하는 方劑를 解表劑라고 부르는데, '八法' 중 汗法에 속한다.

解表劑의 응용은 마땅히 위로 岐黃까지 거슬러 올라가며 아래로는 百世에까지 이른다. 일찍이 『內經』 중에서 이미 명확하게 發汗法의 사용원칙을 제시하였다. 예를 들면 "因其輕而揚之"라고 하였고, "其有邪者, 漬形以爲汗, 其在皮者, 汗而發之"(『素問』「陰陽應象大論」)라고 하였으며, "汗者不以奇"(『素問』「至眞要大論」)라고 하였고, "發表不遠熱"(『素問』「六元正紀大論」)이라는 등의 논술이 있다. 이것으로부터 解表方劑의 이론을 세운 근거가 된다. 해표제에 대하여 巨大한 공헌을 만들어낸 것은 東漢末年에 張仲景이 지은 『傷寒雜病論』으로 추론할 수 있다. 본서에 麻黃湯·桂枝湯·大青龍湯·小青龍湯·麻杏石甘湯 및 麻黃細辛附子湯 등 거의 30여 개의 解表와 관련된 方劑가 수재되어 있다. 수재된 방제는 방제의 조합이 간결하면서 약물의 配伍가 엄밀하고 치료효과가 탁월하기 때문에 지금까지 계속 사용하고 있다. 그것이 구현하고 있는 解表宣肺·調和營衛·解表清裏·解表化飮·辛涼疏表 및 助陽解表 등의 治法은 이미 역대 의학자들이 규범으로 받들었으며, 또한 현대에 나온 여러 판의 『방제학』 교재도 표준으로 보고 있다. 解表劑가 漢代에 이미 비교적 높은 수준에 있었음을 충분히 알 수 있다. 魏·晉 이후로 의학계에서는 종래의 규칙이나 관례 따위를 묵수하는 것이 비록 이미 하나의 풍조가 되었지만, 아직도 일부 의학자들은 과감하게 구상하고 연구하고 經方을 활용하였으며, 적지 않게 실행하여 유효한 방제가 거듭해서 차례로 출현하게 되었다. 예를 들면 晉代 葛洪의 『肘後備急方』에서 "傷寒有數種, 人不能別"를 감안하여 "葱豉湯"과 "하나의 약으로 모두 치료한다(一藥盡治)"(『肘後備急方』卷2)를 만들었다. 唐代 孫思邈의 『備急千金要方』에서는 仲景法을 따르면서 仲景方을 고수하지 않은 것이 특징으로 그가 입안한 風溫을 치료하는 葳蕤湯은 滋陰解表劑의 효시를 제일 처음 열었으며 후세 陰虛外感을 치료하는 代表方이 되었다. 加減葳蕤湯은 곧 이것을 재단하여 나온 것이다. 宋代 『太平惠民和劑局方』 중에 수록된 敗毒散·蔘蘇飮은 그 補氣의 人蔘이 解表의 羌活·防風 및 蘇葉 등과 配伍하는 약물을 선별하는 사고의 방향은 후세 益氣解表劑의 기원이 되었으며, 또한 羌活·防風類의 方劑가 세상에 알려지는데 기초를 닦아주었다. 金·元代 이후로 학술적 논쟁을 하면서 여러 유파가 잇달아 드러나고 이름난 의학자들이 배출되면서 解表方劑의 운용은 하나의 새로운 단계로 진입하게 되었다. 劉完素는 運氣學說의 가르침 하에 '六氣皆從火化論'을 힘껏 제창하였다. 따라서 表證 특히 陽熱이 表에서 鬱結하고 막혀 생긴 惡寒

發熱에 대해서는 麻黃·桂枝 등 辛溫解表藥의 사용을 반대하고, 辛涼하거나 甘寒한 약물로 解表할 것을 주장하였다. 그러므로 "自制雙解·通聖辛涼之劑, 不遵仲景法桂枝·麻黃發表之藥."(『素問病機氣宜保命集』卷上)이라고 하였다. 劉完素는 寒涼藥을 사용하는 것에 주력하였고, 表證을 치료함에 있어 辛涼藥을 잘 사용하는 학술적인 사고방식은 후세 溫熱病의 치료에 매우 啓發을 하였다. 溫病醫家인 吳瑭이 創方한 저명한 방제인 銀翹散은 그 근본을 거슬러 올라가 보면 실제로 河間의 涼膈散을 모방하여 다시 만든 것이다. 易水學派의 元祖인 張元素는 舊說에 얽매이지 않고 과감하게 창의성을 발휘하였다. 風寒表證의 치료에서 "有汗不得服麻黃, 無汗不得服桂枝."(『此事難知』卷上)의 여러 가지 禁忌에 근거하여 그는 별도의 방책을 만들어 辛溫香燥를 위주로 하는 九味羌活湯을 創方하였다. 그 解表祛濕의 用藥 사고방식은 解表의 모든 방제 중에서 독자적으로 한 파를 형성한 것이다. '分經論治'하여 방제 조합 구조는 후세에 表證·痺證 및 痛證을 치료하는데 모두 거대한 영향을 주었다. 明代 陶華는 舊論을 고치지 않고 또한 새로운 학설을 정립하였고 精粹를 잘 채집하였는데, 그는 仲景의 六經辨證의 취지를 따르면서 易老의 羌活·白芷로 解表하는 뜻을 취하여 柴葛解肌湯을 創方하였는데 후인들에게 經方을 활용하는 모범을 보여줬다고 할 만하다. 그는 仲景의 麻黃細辛附子湯의 助陽解表法을 본받고 易老의 九味羌活湯에서 羌活·防風 및 川芎의 解表祛濕하는 뜻을 본받아서 草案한 再造散도 지금의 사람들에게 널리 전수되어 사용하고 있다. 淸代 溫病學家인 吳瑭은 '溫病忌汗'을 강조하면서 "옛날부터 전해 내려오는 傷寒法을 사용하여 溫病을 치료하는 것은 크게 잘못된 것이다(古來用傷寒法治溫病, …… 大錯也.)"(『溫病條辨』卷1)고 지적하였다. 溫病의 初期를 치료함에 있어서 『內經』의 "風淫於內, 治以辛涼, 佐以苦甘; 熱淫於內, 治以鹹寒, 佐以甘苦"의 영향과 劉完素의 辛涼解表의 계발을 깊게 받았으며, '辛涼苦甘'(『溫病條辨』卷1)法을 주장하여 銀翹散과 桑菊飮 등 辛涼解表의 名方을 만들었다. 이는 表證 치료에 하나의 커다란 법문을 열었고 辛涼解表劑의 공백을 메꾸었으며 후세에 모범을 보인 것이다. 최근 50년 동안 한의학의 교육과 과학기술의 발전에 뒤이어 解表方劑의 임상 응용경험이 누적됨에 따라 解表劑가 이론상으로 더욱 계통적으로 심화되었으며, 方劑 조성의 配伍에서도 더욱 완전하게 되었다. 특별히 解表方劑에 대한 작용기전 연구를 통하여 解表方劑에는 發汗·解熱·鎭痛·抗炎·病原微生物억제·鎭咳·平喘 및 祛痰 등의 약리작용이 있고, 또한 면역기능을 조절하고 胃腸기능을 조정하며 항알러지 反應 등의 면에도 적극적인 의의가 있다. 따라서 解表方劑의 응용범위를 진일보하게 확대하여 광활한 전망을 드러내 보였다.

解表劑는 表證을 치료하기 위하여 설정된 것이다. 表證은 六淫의 外邪가 인체의 肌表와 肺衛에 침습하여 생긴 病證이다. 衛氣는 "溫分肉, 充皮膚, 肥腠理, 司開闔"(『靈樞』「本臟」)라고 하였는데, 그 기능은 주로 外邪를 방어하고, 땀을 배설하며 체온을 조절하는 등에서 표현된다. 肺는 呼吸을 맡고 宣發과 肅降을 주로하며 鼻에 開竅하고 外로는 皮毛와 合한다. 그러므로 六淫의 病邪가 혹은 皮毛를 따라 들어오고, 혹은 口鼻를 따라서 들어오면 반드시 肺衛에 침습하여 表衛의 調節 기능이 정상을 잃고 肺氣의 宣發 기전에 지장을 받으면 惡寒發熱, 頭身疼痛, 無汗或有汗, 苔薄白, 脈浮 등의 증상이 생겨 表證을 형성한다. 六淫의 病邪에는 風·寒·暑·濕·燥 및 火의 차이가 있고, 또한 麻疹·瘡瘍·水腫 및 痢疾 등의 初期에도 대부분 表證을 겸하기 때문에 表證이 미치는 범위 또한 비교적 광범위하다. 질병의 성질에는 寒熱의 차이가 있고 체질에는 强弱의 구별이 있다. 表證 중에서 질병의 성질이 寒에 해당하는 자는 반드시 辛溫解表해야 하고, 질병의 성질이 熱에 해당하는 자는 반드시 辛涼解表해야 하며, 여기에 겸하여 氣·血·陰·陽의 모든 부족한 증상이 나타나는 자는 또한 모름지기 補益法과 결합하여 扶正祛邪하여야 한다. 때문에 解表方劑는 여기에 상응하여 辛溫解表·辛涼解表 및 扶正解表의

세 종류로 나뉘게 된다. 또한 설명이 필요한 것은 解表劑는 六淫의 外邪가 表에 침습하여 생긴 病變을 조준하여 설정한 것이므로 本書에 있는 祛暑解表·疏散外風·祛風勝濕 및 輕宣外燥 등의 章節에 나오는 方劑 또한 解表劑의 범주에 해당되기 때문에 배우는 사람들은 위의 분류에 구애될 필요가 없이 앞 뒤로 나오는 것들을 함께 참작하여야 그 전체적인 모습을 엿볼 수 있을 것이다.

辛溫解表劑는 風寒表證에 적용된다. 風寒表證은 風寒이 바깥에서 침습한 것과 연계된 것으로 肺氣의 宣發과 肅降이 조절되지 않고 津液이 펼쳐지지 못하고 營衛의 운행이 지장을 받아서 생긴 것이다. 임상에서는 대부분 惡寒發熱, 頭身疼痛, 無汗 혹은 有汗, 鼻塞流涕, 苔薄白, 脈浮緊 혹은 脈浮緩 등이 나타난다. 辛溫解表劑는 매번 辛溫解表藥을 위주로 조성되고, 麻黃·桂枝·羌活·蘇葉·防風·荊芥 및 葱白 등의 類를 常用한다. 配伍 면에서는 대략 다음의 몇 가지가 있다: ① 活血通脈藥과 配伍하는 것으로 桂枝와 川芎과 같은 類이다. 寒邪는 收引하고 凝斂으로 인해 매번 營陰의 鬱滯를 일으켜 頭身疼痛이 나타난다. 그러므로 辛溫解表劑에 항상 活血通脈藥을 配伍하여 氣血을 유통시킨다. ② 宣降肺氣藥과 配伍하는 것으로 杏仁·桔梗 및 枳殼과 같은 類이다. 肺는 宣發과 肅降을 주관하고 外로는 皮毛와 合하면서 表를 주관한다. 風寒의 邪氣가 皮毛로부터 들어오면 안으로 肺에 머물러 肺의 宣發과 肅降이 정상을 잃게되고 肺系가 不利해지면서 咳喘과 鼻塞 등의 증상이 나타난다. 그러므로 辛溫解表劑에 반드시 소량의 宣降肺氣藥을 佐藥으로 配伍하여 肺臟의 기능을 調理한다. ③ 燥濕化痰藥을 配伍하는 것으로 半夏·蘇子 및 陳皮와 같은 類이다. 寒의 성질은 凝滯하는 것이기 때문에 쉽게 津液이 응집하여 펼쳐지지 못하고, 肺는 水의 上源으로 주로 津液을 輸布하고 水道를 通調하는데, 肺가 宣發과 肅降을 잃고 津液의 輸布에 장애가 생기면 쉽게 津液이 뭉쳐서 질환이 된다. 津이 모이면 濕이 되고 痰이 되는데, 濕痰이 肺를 막으면 咯痰의 色이 희고 胸悶 등을 볼 수 있다. 그러므로 본 方劑類는 또한 대부분 燥濕化痰藥과 配伍하여 痰 치료도 겸하면서 津液의 運行도 돕는다. 이밖에 만약 裏熱을 겸한 자는 清熱藥과 配伍한다. 예를 들면 大青龍湯의 石膏와 九味羌活湯의 黃芩과 같은 것이다. 氣滯를 겸한 자는 理氣藥을 配伍한다. 예를 들면 香蘇散의 香附子와 陳皮와 같은 것이다. 辛溫解表劑의 代表方에는 麻黃湯·桂枝湯 및 九味羌活湯이 있다.

辛涼解表劑는 風熱表證에 적용된다. 風熱表證은 溫熱의 病邪와 연계된 것으로 口鼻 혹은 皮毛로부터 들어와서 肺衛를 침습하면 表衛기능은 조절되지 않고 肺氣의 宣發과 肅降은 정상을 잃고 津液이 약간의 손상을 받아서 형성된다. 임상에서는 대부분 發熱, 微惡風寒, 頭痛, 咽痛, 咳嗽, 口渴, 舌尖紅, 苔薄黃, 脈浮數 등이 나타난다. 辛涼解表劑는 매번 辛涼解表藥을 위주로 조성되고, 薄荷·牛蒡子·桑葉 및 菊花 등의 類를 常用한다. 配伍 면에서는 대략 다음의 몇 가지가 있다: ① 清熱藥과 配伍하는 것으로 金銀花·連翹 및 竹葉과 같은 類이다. 대개 溫邪가 인체에 침습하면 발병이 급하고 傳變이 빨라서 쉽게 氣血을 치고 가슴에 맺혀 毒이 되고, 또한 대부분 穢濁의 氣가 끼어 있는 등의 특징을 가지고 있다. 그러므로 辛涼解表劑로 疏散風熱하는 동시에 반드시 溫邪가 병을 일으키는 특징을 함께 고려하여 清熱解毒藥을 配伍하여 넣음으로써 傳變하여 裏로 들어가는 병세를 중단시킨다. ② 宣降肺氣藥과 配伍하는 것으로 桔梗 및 杏仁과 같은 類이다. "溫邪上受, 首先犯肺"(『溫熱論』)라고 하였다. 溫邪가 인체를 침입하면 가장 쉽게 肺臟에 누를 끼쳐 肺氣가 宣發을 잃고 肺系가 不利해져서 咳嗽와 咽痛 등이 나타난다. 그러므로 本 方劑類는 매번 宣降肺氣하는 桔梗 및 杏仁과 같은 것들을 配伍함으로써 肺氣의 宣發과 肅降을 정상적으로 회복시킨다. ③ 甘寒生津藥과 配伍하는 것으로 蘆根 및 天花粉과 같은 類이다. 이들은 生津도 하고 또한 清熱을 겸한다. 溫邪가 병을 일으키면 쉽게 津液을 손상시킨다. 溫病의 衛·氣·營·血의 4개 단계는

모두 津液의 손상을 받지만 病位의 깊이가 다르고 진액의 손상 정도에 차이가 난다. 溫病의 초기에는 邪熱이 심하지 않고 津液이 손상된 것도 가벼우므로 辛涼解表劑에 生津止渴藥을 조금 佐藥으로 하여 진액의 손상을 보살피는 것이 옳다. 辛涼解表劑의 대표방에는 銀翹散과 桑菊飮이 있다. 이밖에 外邪가 다 풀리지 않았는데 裏熱이 이미 왕성하다면 또한 辛溫解表藥에 辛寒清熱藥을 配伍하여 辛涼解表法을 구현해야 한다. 그 좋은 예가 麻杏石甘湯이다. 麻疹은 급성열병에 해당되고 초기에는 매번 肺衛의 證候가 나타나므로 本節에 넣어 논한다. 麻는 陽毒으로 初期에는 바깥으로 나가면 順證이 되고 안으로 빠져 들어가면 逆證이 된다. 그러므로 이런 方劑類는 반드시 輕清透疹의 升麻·葛根·西河柳 및 牛蒡子 등을 清熱解毒의 知母·石膏 및 竹葉 등과 배합하여 조성한다. 그 방제의 예로는 升麻葛根湯 및 竹葉柳蒡湯이 있다.

扶正解表劑는 表證에 正氣虛弱을 겸한 證에 적용된다. 正虛는 氣·血·陰 및 陽이 부족한 것을 가리킨다. 氣虛 혹은 陽虛에 外感風寒하면 身熱惡寒·頭痛無汗 등의 表證이외에도 倦怠嗜臥, 面色蒼白이 있고, 심하면 惡寒이 극심하고 肢冷, 脈沉微 등 陽氣衰弱의 證候가 나타난다. 이 證은 자신의 陽氣虛弱에 外邪가 더해지는 두 가지 모순이 존재한다. 만약 단순히 發汗解表하면 이미 허약해진 陽氣가 땀의 배설에 따라서 더욱 虛해지고 또한 正氣의 虛로 인하여 邪氣에 저항해서 밖으로 내보낼 수 없어서 邪氣가 남아서 풀리지 않게 된다. 합당한 治法은 扶正祛邪라는 두 가지 방법을 병행하여 正氣는 왕성하게하고 邪氣는 제거하는 것이다. 그러므로 이러한 方劑類는 매번 辛溫解表의 麻黃·羌活·防風 및 蘇葉 등과 益氣助陽의 人蔘·黃芪·附子 및 細辛 등으로 益氣解表劑와 助陽解表劑를 구성하여 한 편으로는 正氣를 扶助하고 또한 편으로는 發汗祛邪함으로써 두 가지가 相輔相成하여 이것을 돌보다 저것을 놓치는 일에 이르지 않도록 한다. 대표방에는 敗毒散·蔘蘇飮·麻黃細辛附子湯 및 再造散이 있다. 평소 몸에 陰血이 부족한데에 外邪를 感受하면 그 證은 쉽게 熱化하는 경향이 있어서, 頭痛身熱, 微惡風寒, 無汗 혹 有汗 등 일반적인 表證이 생기는 이외에 대부분 舌苔가 薄하면서 乾燥하고 혹은 舌光赤하고 脈細數하는 특징이 있다. 치료는 오로지 發表만 할 수 없는데 그 이유는 陰血의 부족으로 인하여 汗의 자원이 충분하지 않은데 外邪를 感受하더라도 汗法을 써서 邪氣를 내보낼 수 없기 때문이다. 만약 억지로 發汗시키면 더욱 陰血을 소모시키고 심하면 汗多亡陰이라는 좋지 않은 결과를 조성하게 된다. 그러므로 반드시 滋陰養血하여 汗의 자원을 충분히 한 다음에 發汗透邪하여 表證을 풀게 된다. 따라서 이러한 方劑類는 항상 性味가 辛而微溫하고 혹은 辛涼한 解表藥인 葱白·豆豉·薄荷 및 葛根 등과 滋陰養血藥인 玉竹·生地黃 및 麥門冬 등으로 滋陰解表劑와 養血解表劑를 조성한 것이다. 그 방제의 예는 加減葳蕤湯과 葱白七味飮이다.

解表劑를 응용하는데는 반드시 다음의 몇 가지를 주의해야 한다: ① 解表劑를 사용할 때에는 반드시 마땅한지의 여부에 주의해야 한다. 우선은 이것이 사용자체가 마땅한지의 여부이다. 解表劑는 表證을 위하여 설정된 것이다. 만약 表證에 해당되어 당연히 사용해야 하는데 사용하지 않는 자는 病邪를 깊이 들어가게 할 수 있고, 만약 당연히 사용해야 하지 않은데 잘못 사용하는 자는 한갓 그 表를 虛하게 만들고 무익할 뿐만 아니라 도리어 일을 망치게 된다. 그 다음은 이것이 證에 서로 맞는지의 여부이다. 風寒表證에는 당연히 辛溫解表藥을 사용해야 하는데 寒涼藥을 잘못 사용하면 病邪가 얼음처럼 잠복하여 오래도록 낫기 어렵고, 風熱表證에는 당연히 辛涼藥을 사용해야 하는데 잘못 辛溫藥을 투여하면 장작을 안고 불을 끄려는 것과 같아서 熱로써 熱을 조장하는 폐단이 생긴다. 正氣가 虛하면서 外感이 있으면 당연히 扶正을 함께 고려해야 하는데 만약 一味로 表邪를 發散한다면 반드시 氣血陰陽을 더욱 손상시키게 된다. 程國彭이 『醫學心悟』의 머리말에서 "汗得其法, 何病不除! 汗法一差, 夭枉隨之矣. 吁! 汗豈易言哉!"라고 하였다.