② 解表劑는 대부분 辛散輕揚藥을 사용하므로 오래 煎湯해서는 안된다. 그 이유는 오래 煎湯하면 藥性이 소실되고 작용이 감소하기 때문이다. ③ 대략 解表劑를 복용한 후에는 반드시 風寒을 피하고 혹은 의복과 이불을 두텁게 입고 덮으며, 혹은 죽을 먹어 보좌함으로써 땀이 나도록 도와야 한다. 땀을 내는 정도는 온몸에 약간의 땀이 나는 것이 좋은데, 만약 땀이 나는 것이 철저하지 못하면 病邪가 풀리지 않고, 땀이 나는 것이 지나치면 正氣가 소모되고 津液이 손상된다. 땀이 나면서 병이 나으면 곧 복용을 중지하여 나머지 모든 약제를 다 먹을 필요는 없다. 바로 『儒門事親』권2에서 "凡發汗欲周身漐漐然, 不欲如水淋漓, 欲令手足俱周, 遍汗出一二時爲佳. 若汗暴出, 邪氣多不出, 則當重發汗, 則使人亡陽. 凡發汗中病則止, 不必盡劑; 要在劑當, 不欲過也."라고 하였다. ④ 解表劑는 반드시 식사 후에 溫服하고, 복용한 후에는 날 것, 찬 것, 기름지고 느끼한 것(生冷油膩)의 음식물을 禁하는데, 그 이유는 이들 음식물이 약물의 흡수와 藥效의 발휘에 영향을 줄 수 있기 때문이다. ⑤ 남쪽 지방 혹은 여름철에는 氣候가 炎熱하기 때문에 인체의 腠理가 이완되어 쉽게 發汗되므로 약물을 선택함에 있어 너무 세고 용량이 지나치게 많은 것은 적절하지 않다. 북쪽 지방 혹은 겨울철에는 氣候가 寒冷하기 때문에 인체의 腠理가 치밀해져 쉽게 땀이 나지 않아 약물을 사용함에 세지 않으면 안되고 용량도 약간 많은 것이 적당하다. ⑥ 만약 表邪가 다 풀리지 않은 상태에서 또한 裏證이 나타나는 자는 일반적인 원칙으로는 반드시 먼저 解表한 이후에 裏를 치료해야 한다. 表와 裏가 같이 심한 자는 마땅히 表와 裏를 동시에 풀어야 한다. 만약 外邪가 이미 裏로 들어가서 혹은 麻疹이 이미 삐져 나오고 혹은 瘡瘍이 이미 터져버리고 혹은 虛證의 水腫에는 모두 사용해서는 안된다.

第一節 辛溫解表劑

麻黃湯

(『傷寒論』)

【異名】 麻黃解肌湯(『深師方』, 『外台秘要』卷1에 수재됨).

【組成】 麻黃去節 三兩(9 g) 桂枝 二兩(6 g) 杏仁去皮尖 七十個(6 g) 甘草炙 一兩(3 g)

【用法】 위의 4가지 약재에 물 9되를 넣고 煎湯하는데, 먼저 麻黃을 煎湯하여 2되로 줄어들면 위에 뜬 거품을 없애고, 나머지 3가지 약재를 넣고 2되반이 되도록 전탕하고 찌꺼기는 버리고 8홉을 따뜻하게 복용한다. 이불을 덮고 약간 땀이 나게 하며, 반드시 죽을 먹을 필요는 없다. 나머지는 桂枝湯의 복용법에 따라 몸을 조리한다.

【作用】 發汗解表, 宣肺平喘.

【適應症】 風寒束表, 肺氣失宣證. 惡寒發熱, 頭疼身痛, 無汗而喘, 舌苔薄白, 脈浮緊.

【病機分析】 風寒의 邪氣가 肌表에 침습하면 營衛가 맨 먼저 공격을 받는다. 寒邪는 收引하고 凝滯하는데 衛分을 손상시키면 衛陽이 막혀서 그 '溫分肉'의 기능이 조절을 잃게 되고, 肌表는 정상적인 溫煦를 얻지 못하게 되므로 惡寒하고, 衛氣는 바깥을 향하여 邪氣에 대항하는데 正氣와 邪氣가 서로 싸우면 發熱하며, 正氣와 邪氣가 頭部에서 싸우고 經氣의 순행이 불리해지면 頭疼한다. 寒邪가 表部를 묶으면 腠理가 닫히고 막혀서 衛氣의 '司開闔'하는 기능이 조절되지

못하여 汗液이 밖으로 새나가지 못하면 無汗하게 된다. 營分을 손상시키면 營陰이 鬱滯하여 시원하게 뚫리지 못하고 經脈은 不通하게 되며 不通하면 痛하므로 身痛하게 된다. 肺는 氣를 주관하고 衛에 속하며, 밖으로는 皮毛와 合하고 또한 表를 주관한다. 寒邪가 밖으로 表를 묶어서 肺氣의 宣發과 肅降에 의한 下行에 영향을 주게 되면 上逆하여 喘이 된다. 나머지 舌苔薄白과 脈浮緊과 같은 것은 모두 風寒이 表에 침습한 것을 반영한 것이다. 그러므로 본 病證은 邪氣가 實하고 正氣는 虛하지 않은 風寒表實證에 해당된다.

【配伍分析】 본 方劑의 病證은 風寒이 表를 묶고 肺氣가 宣發을 상실하였기 때문이다. 『素問』「陰陽應象大論」에 수재된 "其在皮者, 汗而發之"의 치료원칙에 근거하여 治法은 반드시 發汗解表와 宣肺平喘해야 한다. 방제 중에 있는 麻黃은 性味가 苦辛溫하고 歸經은 肺經과 膀胱經이며 "乃肺經專藥"(『本草綱目』卷15)이라고 하였고, "善行肌表衛分, 爲發汗之主藥."(『成方便讀』 卷1)이라고 하였다. 본 방제에서 이를 사용하여 開腠發汗하고 表에 있는 風寒을 몰아내어 발병의 원인을 없애고, 宣肺平喘하고 閉鬱의 肺氣를 發泄함으로써 肺氣의 宣發을 회복시키니 君藥으로 한 것이다. 본 方劑의 病證은 衛鬱營滯에 해당되어 麻黃만을 써서 發汗시키면 단지 衛氣의 閉鬱을 풀어줄 수 있을 뿐이다. 그렇기 때문에 또한 透營達衛의 桂枝를 써서 臣藥으로 하고 解肌發表하며 "引營分之邪, 達之肌表"(『醫方集解』「發表之劑」)라고 하여 麻黃의 解表逐邪를 도와 發汗작용을 더욱 드러나게 한 것이고, 溫通血脈하고 暢行營陰하여 疼痛證을 풀리게 하였다. 이것은 汪琥가 "今麻黃湯內用桂枝者, 以寒傷營, 桂枝亦營中藥, 能通血脈而發散寒邪, 兼佐麻黃而泄營衛之邪實."(『傷寒論辨證廣注』卷1)라고 지적한 것과 같다. 杏仁은 性味가 苦微溫하여 "主咳逆上氣"(『神農本草經』卷3)라고 하였고, "功專降氣, 氣降則痰消嗽止."(『本草便讀』卷3)라고 하였다. 이것을 써서 降利肺氣하고 麻黃과 配伍하면 一宣一降하여 肺氣의 宣發과 肅降을 회복하고 宣肺平喘의 작용을 강화시키기 때문에 佐藥으로 한 것이다. 炙甘草는 麻黃과 杏仁을 도와서 止咳平喘하고 또한 益氣和中하고 調和藥性하므로 使藥이 되고 佐藥의 쓰임도 兼한다. 네 가지 약물을 配伍하면 寒邪가 흩어지고 營衛가 통하게 되고 肺氣가 宣發되어 모든 증상은 낫게 된다.

본 방제의 配伍 특징은 다음과 같다. 麻黃과 桂枝가 配伍되면 한편으로는 衛氣의 鬱滯를 發散시켜 腠理를 열어주고, 또 한편으로는 營分의 鬱滯를 뚫어서 血滯를 行하게 한다. 이것은 相須를 쓰임으로하여 發汗解表의 작용을 增强시키게 된다.

【臨床應用】

1. 證治要點: 본 方劑는 外感 風寒表實證을 치료하는 대표적인 방제로 임상에서는 惡寒發熱, 無汗而喘, 脈浮緊을 辨證論治의 요점으로 한다.

2. 加減法: 喘急胸悶, 咳嗽痰多하고 表證이 심하지 않은 자는 桂枝를 빼고 蘇子와 半夏를 넣어 化痰止咳平喘한다. 鼻塞流涕가 심한 자는 蒼耳子와 辛夷를 넣어 宣通鼻竅하고, 濕邪를 끼고 骨節酸痛이 兼하여 나타나면 蒼朮과 薏苡仁을 넣어 祛風除濕하고, 裏熱의 煩躁와 口乾을 兼하면 石膏와 黃芩을 넣어 清瀉鬱熱하고, 風寒이 表에 침습하여 생긴 皮膚瘙痒에는 防風·荊芥 및 蟬蛻를 넣어 祛風止痒한다.

3. 본 방제는 현대에서 感冒·發熱·咳喘·水腫·痹證·鼻炎 및 風疹 등의 辨證이 風寒表實證에 해당하는 자에게 常用한다.

【注意事項】 본 방제는 辛溫發汗의 峻劑이다. 그러므로 『傷寒論』에서는 '瘡家'·'淋家'·'衄家'·'亡血家' 및 外感表虛自汗이나 血虛하면서 脈이 '尺中遲'를 겸하는 경우, 그리고 잘못 下法을 써서 '身重心悸'가 나타나는 경우 등에 대해서는 비록 表寒證이 있더라도 모두 사용을 금하였다. 麻黃湯은 藥味가 비록 적을지

라도 發汗力이 강하여 합당하게 사용하면 효과가 제법 신속하다. 사용할 때에 반드시 주의해야 할 것은 병에 적중하면 곧 복용을 그치고 지나치게 복용해서는 안된다. 그렇지 않으면 發汗이 지나쳐 반드시 사람의 正氣를 손상시킨다. 柯琴은 "此乃純陽之劑, 過於發散, 如單刀直入之將, 投之恰當, 一戰成功. 不當則不戢而召禍. 故用之發表, 可一而不可再. 如汗後不解, 便當以桂枝湯代之; 若汗出不透, 邪氣留連於皮毛骨肉之間, 又有麻桂各半與桂枝二麻黃一之妙用."(『傷寒來蘇集』「傷寒附翼」卷上)라고 지적하였다. 이는 체험에서 터득한 말이라고 할 것이다.

【變遷史】 麻黃湯은 發汗解表의 主方이다. 吳謙 등은 "爲仲景開表逐邪發汗第一峻藥."(『醫宗金鑑』「訂正傷寒論注」卷2)이라고 하였다. 風寒束表의 病機 특징은 腠理가 닫혀 막히고 營陰이 鬱滯되고 肺의 宣發과 肅降이 상실된 것이다. 본 방제는 麻黃에 桂枝 및 杏仁을 配伍하여 開腠·暢營·宣肺함으로써 후세 사람들에게 發表散寒의 用藥 사고력 및 방제조합 구조의 기초를 놓았다. 역대 의학자들은 이 방제를 기초로하고 加減하여 재단함으로써 적응증의 범위를 확대하였다. 여기에 해당되는 방제는 주로 다음의 다섯 가지로 나눌 수 있다: ① 清熱의 黃芩 및 知母 등을 配伍하여 解表清裏의 방제를 구성하고 外感風寒에 裏熱을 兼한 자에게 사용한다. 예를 들면 『類證活人書』卷20의 麻黃黃芩湯은 본 방제에서 杏仁을 빼고 黃芩 및 赤芍藥을 넣은 것이고, 『醫學衷中參西錄』上冊의 麻黃加知母湯은 본 방제에서 知母를 넣은 것이다. ② 祛風除濕의 防風·羌活 및 白朮 등을 配伍하여 發汗祛濕의 방제를 조성하고 外感風寒에 濕을 낀 자에게 사용한다. 예를 들면『三因極一病證方論』卷3의 麻黃左經湯은 본 방제에서 杏仁을 빼고 防風·防己·羌活·白朮·茯苓·乾葛·細辛·生薑 및 大棗를 넣은 것이고, 『症因脈治』卷3의 麻桂朮甘湯은 본 방제에서 杏仁을 빼고 白朮을 넣은 것이다. ③ 宣降肺氣하고 止咳化痰의 蘇子·半夏 및 桑白皮 등과 配伍하여 解表宣肺·祛痰止咳의 方劑를 조성하고 外感風寒에 喘咳有痰을 兼하여 나타나는 자에게 사용한다. 예를 들면『博濟方』卷2의 華蓋散은 본 방제에서 桂枝를 빼고 蘇子·桑白皮·茯苓 및 陳皮를 넣은 것이고, 『張氏醫通』卷13의 麻黃定喘湯은 본 방제에서 桂枝를 빼고 厚朴·款冬花·桑皮·蘇子·半夏·黃芩 및 銀杏을 넣은 것이다. ④ 活血化瘀의 桃仁 및 紅花 등을 配伍하여 解表活血通絡의 방제를 조성하고 外傷에 風寒을 感受한 자에게 사용한다. 예를 들어 『傷科補要』卷3의 麻桂溫經湯은 본 방제에서 杏仁을 빼고 紅花·桃仁·細辛·白芷·赤芍藥·生薑 및 葱白을 넣은 것이다. ⑤ 益氣養血의 人蔘·黃芪·當歸 및 地黃 등을 配伍하여 扶正解表의 방제를 구성하고 正虛하면서 外感風寒한 자에게 사용한다. 예를 들어『脾胃論』卷下의 麻黃人蔘芍藥湯은 본 방제에서 杏仁을 빼고 人蔘·黃芪·麥門冬·當歸·白芍藥 및 五味子를 넣은 것이고, 『雲岐子保命集』卷下의 麻黃加生地黃湯은 본 방제에 四物湯(當歸·熟地黃·白芍藥·川芎)을 合하고 生薑 및 大棗를 넣은 것이다.

【難題解說】

1. 麻黃의 炮製法에 관하여: 古方에서 麻黃을 쓴 목적은 發汗平喘에 있고, 節에는 막고 뭉치는 형상이 있기 때문에 옛 사람들은 取類比象의 뜻에 근거하여 대부분 節을 제거함으로써 發汗의 藥力이 비교적 강한 것을 취하였다. 예를 들면『醫學衷中參西錄』中冊에서 "麻黃帶節發汗之力稍弱, 去節則發汗之力較強."이라고 하였다. 근래에는 麻黃을 쓸 때 대부분 節을 제거하지 않는데, 節을 제거할 지의 여부에 의미가 있는가? 현대 한약의 藥理研究에 의하면 '節'과 '節 사이'에는 매우 큰 차이가 있고, 節 사이 부위의 알칼로이드 총 함량은 節의 3.2배라는 것이 입증되었고, 그 밖에 麻黃 부위의 毒性연구에 의하면 節의 毒性은 最大라는 것이 증명되었다. 그러므로 炮製할 때에 節을 제거하여 알칼로이드 함량이 낮은 부분을 제거함으로써 藥材의 품질과 임상 치료효과를 향상시키고 毒副作用을 경감시킬 수 있다.[1)]