
S^n, ~~$S^1 \times S^1$~~, $\mathbb{R}P^n$,



$(n \geq 2)$

↓

$\pi_1 = 0$.


2-dim mfd

$L(p,q)$

$M \# N$. $\wedge$ $\vee$

$S^1 \times S^1 / e^{2\pi i p}, e^{2\pi i q}$

$T^2 = [0,1]^2$



torus.

Klein.



Klein. free product.

$\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

$\langle a, b \mid aba = b \rangle$.

abababb...


$aba^{-1}b^{-1} = e$.

$\langle a, b \mid ab = ba \rangle$


$\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

$ab = ba \to$ group $\to \mathbb{Z}$.





$S^1 \vee S^1$




$S^1 \vee S^2$




$T : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

$T \circ \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$

$K \circ \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$





$\frac{S^1 \vee S^1}{\mathbb{Z} * \mathbb{Z}}$

S^1

$\mathbb{Z}$

theorem

$S^1 \vee S^1$

$\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

$S^3 : 0$.

$\downarrow$

$\mathbb{R}^3 : 0$.

theorem

M : n-dim with $(n \geq 2)$

then $\pi_1(M) \simeq \pi_1(M - 0)$.

$\simeq \pi_1(M - 2\text{pt})$. $\pi_1(S^n) = 0$ $(n \geq 2)$.


$\simeq \pi_1(M - (n-1)$ pt$)$.

$\pi_1(\mathbb{R}P^n) = \mathbb{Z}_2$ $(n \geq 2)$.






tree






$S \vee S^1 \vee \mathbb{R}$.


$\mathbb{Z} * \mathbb{Z}$






$: S^1 \vee S^1 \vee S^1$

$\mathbb{Z} * \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$












Example.




$S^2 / N = S$






$\to \pi_1(\cdots)$





$S^1 \vee S^1$




S^1 : 0-cell 1pt

1-cell 1pt.

S^2 : 0-cell 1pt

2-cell 1pt




$S^1 \vee S^1$

$\mathbb{R}P^2$: 0-cell : 1pt

1-cell : 1pt

2-cell 1pt




$ab^{-1}b^{-1} = a$.

$\langle a, b \mid ab = b^{-1} \rangle$

$\mathbb{Z} * \mathbb{Z} / \alpha$

$\mathbb{R}P^2 : \mathbb{Z}_2$ $\langle a \mid a^2 = 1 \rangle$




$\mathbb{R}P^2$: 0-cell 1pt

1-cell 1pt

2-cell 1pt

$\pi_1(\mathbb{R}P^2) = \pi_1(\mathbb{R}P^2) = \mathbb{Z}_2$.












$\mathbb{R}/\mathbb{Z}$





$z = x + y$

$\downarrow \exp$

$K_1 = \pi x_1$

$K_2 = \pi y_1$

$\int_0^{2\pi} \frac{1}{2} dz$

$\int_0^{2\pi} \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2\pi} d\theta$

$\frac{2\pi \cdot \frac{1}{2\pi}}{1}$