

[Part 1] ㉠ 어휘

1. **폐포(肺泡)**: 폐 속에서 기체 교환이 이루어지는 작은 공기주머니.
예문: 흡연은 폐포를 손상시켜 호흡 기능을 저하시킨다.
2. **탄성력(彈性力)**: 외부 힘에 의해 변형된 물체가 원래 모양으로 되돌아가려는 힘.
유의어: 복원력(復元力)
예문: 고무줄은 탄성력이 커서 잡아당겼다 놓으면 곧바로 원래 길이로 돌아온다.
3. **복원(復元)되다**: 변형되거나 손상된 것이 본래의 상태로 되돌아가다.
유의어: 회복(回復)되다
예문: 스펀지를 눌렀다가 손을 떼면 원래 형태로 복원된다.
4. **수축(收縮)하다**: 부피나 길이가 줄어들어 오그라들다.
유의어: 위축(萎縮)하다
반의어: 팽창(膨脹)하다, 이완(弛緩)하다
예문: 추운 날씨에 금속이 수축하여 틈새가 벌어지는 현상이 나타났다.
5. **인력(引力)**: 물체와 물체, 또는 분자와 분자 사이에서 서로 끌어당기는 힘.
반의어: 척력(斥力)
예문: 지구와 달 사이에 작용하는 인력이 조석 현상을 일으킨다.
6. **오그라들다**: 본래의 크기보다 줄어들거나 쭈그러지다.
유의어: 쪼그라들다, 움츠러들다
반의어: 부풀다
예문: 풍선을 오래 두면 공기가 빠져 오그라든다.
7. **평형(平衡)**: 둘 이상의 힘이나 작용이 서로 맞서 균형을 이룬 상태.
유의어: 균형(均衡)
예문: 시소 양쪽에 같은 무게를 올리면 평형을 이룬다.
8. **정비례(正比例)하다**: 한쪽 양이 늘어나면 다른 쪽 양도 같은 비율로 늘어나다.
반의어: 반비례(反比例)하다
예문: 일한 시간이 늘어나면 받는 임금도 정비례하여 증가한다.
9. **반비례(反比例)하다**: 한쪽 양이 늘어나면 다른 쪽 양은 같은 비율로 줄어든다.
반의어: 정비례(正比例)하다
예문: 속력이 일정할 때, 거리가 멀어질수록 도착 시간은 반비례하여 늘어난다.
10. **계면 활성제(界面活性劑)**: 서로 다른 두 물질의 경계면에서 표면 장력을 낮추는 물질.
예문: 세제에 포함된 계면 활성제가 기름때와 물 사이의 표면 장력을 낮춰 오염을 제거한다.

11. 분비(分泌)하다: 세포나 샘 조직이 특정 물질을 만들어 내보내다.

예문: 위장은 음식물을 소화하기 위해 위산을 분비한다.

12. 촉진(促進)되다: 어떤 일이나 과정이 외부 요인에 의해 더 빨라지다.

유의어: 가속(加速)되다

반의어: 억제(抑制)되다, 지연(遲延)되다

예문: 적절한 온도와 습도가 유지되자 식물의 성장이 촉진되었다.

[Part 2] 문장 독해 — 학생용 (빈칸 버전)

인간의 폐는 포도송이의 포도알과 같은 수많은 작은 폐포들로 이루어져 있다. 폐포는 I 형 폐포 세포와 II 형 폐포 세포가 얇은 세포층을 이루고 있으며, 산소와 이산화탄소의 교환이 효율적으로 이루어지게 한다. 폐포는 탄성력이 있어 부피가 늘어났다가 다시 복원되는 특성을 가진다. 늘어나는 정도를 신전성이라고 하는데, 신전성이 클수록 일정량의 공기를 들이마실 때 사용하는 에너지는 줄어 들고 적은 힘으로도 원활하게 숨을 쉴 수 있다.

1)

중심어(구) _____, _____, _____

문장 독해

- 1 폐포의 구조 : 인간의 폐는 수많은 작은 _____들로 이루어져 있으며, _____와 _____가 얇은 세포층을 이루고 있음.
- 2 폐포의 기능 : _____와 _____의 교환이 효율적으로 이루어지게 함.
- 3 폐포의 특성 : 폐포는 _____이 있어 부피가 늘어났다가 다시 _____되는 특성을 가짐.
- 4 _____의 개념 : 폐포가 늘어나는 정도.
-5 신전성이 _____수록 일정량의 공기를 들이마실 때 사용하는 에너지는 줄어 들고 적은 힘으로도 원활하게 숨을 쉴 수 있음. -(부연)

중심 내용 _____

폐포의 표면은 얇은 액체층으로 싸여 있다. 액체층에는 액체의 표면이 스스로 수축하여 가능한 한 작은 면적을 취하려는 힘인 표면 장력이 작용하는데, 이 힘은 일반적인 분자 간의 인력보다 강한 물 분자 간의 인력 때문에 형성된다. 폐포에 작용하는 표면 장력 때문에 폐포는 오그라들려는 경향을 보이고 폐의 신전성은 줄어들게 된다. 그러나 폐포가 오그라들려는 경향을 보이더라도 폐포의 허탈은 거의 일어나지 않는다. 그 이유는 표면 장력에 의해 발생하는 오그라들려는 힘과 폐포 내부의 공기압이 서로 평형을 이루어 안정된 부피가 유지되기 때문이다.

2)

중심어(구) _____, _____, _____

문장 독해

- 1 폐포 표면의 구조 : 폐포의 표면은 얇은 _____으로 싸여 있음.
- 2 _____의 개념 : 액체의 표면이 스스로 _____하여 가능한 한 작은 면적을 취하려는 힘.
-3 표면 장력의 형성 원인 : 일반적인 분자 간의 인력보다 강한 _____간의 인력 때문에 형성됨. -(원인)
- 4 표면 장력의 영향 : 폐포에 작용하는 표면 장력 때문에 폐포는 _____경향을 보이고 폐의 _____은 줄어들게 됨.
- 5 폐포의 _____은 거의 일어나지 않음. -(대비)
-6 이유 : 표면 장력에 의해 발생하는 오그라들려는 힘과 폐포 내부의 _____이 서로 _____을 이루어 안정된 부피가 유지되기 때문. -(원인)

중심 내용 _____

폐포가 안정된 부피를 유지하기 위해 필요한 공기압은 라플라스 법칙으로 설명할 수 있다. 라플라스 법칙에 따르면 폐포의 안정된 부피를 위해 필요한 내부의 공기압(P)은 표면 장력(T)에 정비례하고, 폐포의 반지름(r)에 반비례한다. 즉 표면 장력이 커질수록 폐포를 유지하기 위해 더 높은 공기압이 필요하고, 폐포의 반지름이 작아질수록 더 높은 내부의 공기압이 요구된다. 즉 폐포는 작을수록 더 쉽게 허탈이 일어날 수 있다.

3)

중심어(구) _____, _____, _____

문장 독해

- 1 _____의 설명 : 폐포가 안정된 부피를 유지하기 위해 필요한 _____은 라플라스 법칙으로 설명할 수 있음.
- 2 라플라스 법칙의 내용 : 폐포의 안정된 부피를 위해 필요한 내부의 공기압(P)은 _____(T)에 _____하고, 폐포의 _____(r)에 _____함.

$P = \frac{2T}{r}$ 라플라스 법칙	-3 표면 장력이 _____수록 폐포를 유지하기 위해 더 높은 공기압이 필요함. -(부연) -4 폐포의 반지름이 _____수록 더 높은 내부의 공기압이 요구됨. -(부연) •5 폐포는 _____수록 더 쉽게 _____이 일어날 수 있음. -(결과) 중심 내용 _____
하지만 작은 폐포라 하더라도 허탈은 쉽게 일어나지 않는다. 폐포를 이루고 있는 II 형 폐포 세포가 계면 활성제를 분비하여 물 분자 사이의 인력을 방해하기 때문이다. 특히 폐포가 작아질수록 계면 활성제의 농도가 더 높아져 표면 장력은 더 많이 줄어든다. 만약 계면 활성제가 부족해지면 작은 폐포의 허탈이 촉진되어 호흡 기능이 떨어지는 문제가 발생한다.	4) 중심어(구) _____, _____, _____ 문장 독해 •1 작은 폐포라 하더라도 _____은 쉽게 일어나지 않음. -(대비) -2 이유 : 폐포를 이루고 있는 _____가 _____를 분비하여 _____ 사이의 인력을 방해하기 때문. -(원인) •3 폐포가 _____수록 계면 활성제의 _____가 더 높아져 표면 장력은 더 많이 _____. •4 계면 활성제가 _____해지면 작은 폐포의 허탈이 _____되어 호흡 기능이 떨어지는 문제가 발생함. -(조건-결과) 중심 내용 _____ ▶글의 주제 : _____

[Part 3] ◎ 독해 포인트(설명서) — 학생용 (빈칸 버전)

인간의 폐는 수많은 작은 _____들로 이루어져 있으며, _____와 _____가 얇은 세포층을 형성하여 가스 교환을 담당한다. 폐포는 _____이 있어 부피가 변할 수 있으며, 이 늘어나는 정도를 _____이라 한다. 폐포의 표면은 얇은 _____으로 싸여 있고, 여기에는 _____이 작용하여 폐포를 _____경향을 나타낸다. 그러나 표면 장력에 의한 오그라들려는 힘과 폐포 내부의 _____이 서로 _____을 이루기 때문에 폐포의 _____은 거의 일어나지 않는다. 폐포의 안정된 부피를 유지하기 위해 필요한 공기압은 _____으로 설명되는데, 내부 공기압은 표면 장력에 _____하고 폐포의 반지름에 _____한다. 따라서 폐포가 _____수록 더 높은 공기압이 필요하여 허탈이 쉽게 일어날 수 있다. 하지만 _____가 _____를 분비하여 _____사이의 인력을 방해함으로써, 작은 폐포에서도 허탈이 쉽게 일어나지 않는다. 특히 폐포가 작아질수록 계면 활성제의 _____가 더 높아져 표면 장력은 더 많이 줄어든다. 만약 계면 활성제가 _____해지면 작은 폐포의 허탈이 _____되어 호흡 기능에 문제가 발생한다.

[Part 4] ◎ 핵심 개념 — 학생용 (빈칸 버전)

포인트 1. _____ 와 _____

폐포는 _____의 포도알과 같은 구조로, _____와 _____의 교환이 이루어지는 장소이다. 폐포벽은 _____와 _____로 구성되어 있다. I 형 폐포 세포는 전체 폐포 표면의 대부분을 차지하며 가스 교환에 관여하고, II 형 폐포 세포는 _____를 분비하는 역할을 한다.

포인트 2. _____ 과 _____

폐포는 _____이 있어 부피가 늘어났다가 다시 복원되는 특성을 가진다. 이러한 늘어나는 정도를 _____이라 하는데, 신전성이 _____수축 적은 에너지로 호흡이 가능하다. 폐포에 작용하는 _____은 폐포를 오그라들게 하여 신전성을 _____시키는 요인이 된다.

포인트 3. _____

_____은 액체의 표면이 스스로 수축하여 가능한 한 작은 면적을 취하려는 힘이다. 이 힘은 일반적인 분자 간의 인력보다 강한 _____간의 인력에 의해 형성된다. 폐포에서 표면 장력은 폐포를 _____경향을 만들지만, 폐포 내부의 _____과 _____을 이루어 안정된 부피를 유지한다.

포인트 4. _____

라플라스 법칙에 따르면 폐포의 안정된 부피를 위해 필요한 내부 공기압(P)은 _____(T)에 _____하고, 폐포의 _____(r)에 _____한다. 공식으로 표현하면 $P = 2T/r$ 이다. 이 법칙에 따르면, 반지름이 _____폐포일수록 더 높은 내부 공기압이 필요하여 _____이 더 쉽게 일어날 수 있다.

포인트 5. _____의 역할

계면 활성제는 _____가 분비하는 물질로, _____사이의 _____을 방해하여 표면 장력을 낮추는 역할을 한다. 폐포가 _____수축 계면 활성제의 농도가 높아져 표면 장력이 더 많이 감소한다. 계면 활성제가 _____해지면 작은 폐포의 _____이 촉진되어 호흡 기능에 문제가 발생한다.

[Part 5] ◎ 내용 구조 — 학생용 (빈칸 버전)

포인트 1. 폐포의 구조와 특성

항목	내용
구조	I 형 폐포 세포와 II 형 폐포 세포가 얇은 _____을 이룸
기능	_____와 _____의 교환
특성	_____이 있어 부피가 늘어났다가 _____됨
신전성	늘어나는 정도 → 클수록 적은 _____로 호흡 가능

포인트 2. 표면 장력과 폐포의 안정성 (과정형)

폐포 표면의 _____ → _____ 작용 → 폐포가 _____ 경향

↓

오그라들려는 힘 + 폐포 내부의 _____ → _____ 유지 → 허탈 방지

포인트 3. 라플라스 법칙 (비교형)

요인	공기압(P)과의 관계	의미
표면 장력(T)	_____	T가 커지면 P도 _____
반지름(r)	_____	r이 작아지면 P는 _____

포인트 4. 계면 활성제의 작용 메커니즘 (과정형)

_____ → 계면 활성제 _____ → _____ 사이의 인력 방해 → _____ 감소

↓

폐포가 작아질수록 → 계면 활성제 _____ 증가 → 표면 장력 _____ 감소 → 허탈 방지

[Part 6] 문장 독해 — 정답 버전 (괄호 해설 포함)

인간의 폐는 포도송이의 포도알과 같은 수많은 작은 폐포들로 이루어져 있다.(폐포의 구조) 폐포는 I 형 폐포 세포와 II 형 폐포 세포가 얇은 세포층을 이루고 있으며, 산소와 이산화탄소의 교환이 효율적으로 이루어지게 한다.(폐포의 기능) 폐포는 탄성력이 있어 부피가 늘어났다가 다시 복원되는 특성을 가진다.(폐포의 탄성력) 늘어나는 정도를 신전성이라고 하는데, 신전성이 클수록 일정량의 공기를 들이마실 때 사용하는 에너지는 줄어 들고 적은 힘으로도 원활하게 숨을 쉴 수 있다.(신전성의 개념과 효과)

1)

중심어(구) 폐포, 신전성, 탄성력

문장 독해

- 1 폐포의 구조 : 인간의 폐는 수많은 작은 폐포들로 이루어져 있으며, I 형 폐포 세포와 II 형 폐포 세포가 얇은 세포층을 이루고 있음.
- 2 폐포의 기능 : 산소와 이산화탄소의 교환이 효율적으로 이루어지게 함.
- 3 폐포의 특성 : 폐포는 탄성력이 있어 부피가 늘어났다가 다시 복원되는 특성을 가짐.
- 4 신전성의 개념 : 폐포가 늘어나는 정도.
-5 신전성이 클수록 일정량의 공기를 들이마실 때 사용하는 에너지는 줄어 들고 적은 힘으로도 원활하게 숨을 쉴 수 있음. -(부연)

중심 내용 폐포의 구조, 기능, 탄성력과 신전성의 개념

폐포의 표면은 얇은 액체층으로 싸여 있다.(폐포 표면의 구조) 액체층에는 액체의 표면이 스스로 수축하여 가능한 한 작은 면적을 취하려는 힘인 표면 장력이 작용하는데,(표면 장력의 개념) 이 힘은 일반적인 분자 간의 인력보다 강한 물 분자 간의 인력 때문에 형성된다.(표면 장력의 형성 원인) 폐포에 작용하는 표면 장력 때문에 폐포는 오그라들려는 경향을 보이고 폐의 신전성은 줄어들게 된다.(표면 장력이 폐포에 미치는 영향) 그러나 폐포가 오그라들려는 경향을 보이더라도 폐포의 허탈은 거의 일어나지 않는다.(허탈이 거의 일어나지 않음) 그 이유는 표면 장력에 의해 발생하는 오그라들려는 힘과 폐포 내부의 공기압이 서로 평형을 이루어 안정된 부피가 유지되기 때문이다.(이유: 오그라들려는 힘과 공기압의 평형)

2)

중심어(구) 표면 장력, 허탈, 평형

문장 독해

- 1 폐포 표면의 구조 : 폐포의 표면은 얇은 액체층으로 싸여 있음.
- 2 표면 장력의 개념 : 액체의 표면이 스스로 수축하여 가능한 한 작은 면적을 취하려는 힘.
-3 표면 장력의 형성 원인 : 일반적인 분자 간의 인력보다 강한 물 분자 간의 인력 때문에 형성됨. -(원인)
- 4 표면 장력의 영향 : 폐포에 작용하는 표면 장력 때문에 폐포는 오그라들려는 경향을 보이고 폐의 신전성은 줄어들게 됨.
- 5 폐포의 허탈은 거의 일어나지 않음. -(대비)
-6 이유 : 표면 장력에 의해 발생하는 오그라들려는 힘과 폐포 내부의 공기압이 서로 평형을 이루어 안정된 부피가 유지되기 때문. -(원인)

중심 내용 표면 장력의 개념과 폐포의 안정성 유지 원리

폐포가 안정된 부피를 유지하기 위해 필요한 공기압은 라플라스 법칙으로 설명할 수 있다.(라플라스 법칙의 소개) 라플라스 법칙에 따르면 폐포의 안정된 부피를 위해 필요한 내부의 공기압(P)은 표면 장력(T)에 정비례하고, 폐포의 반지름(r)에 반비례한다.(라플라스 법칙의 내용: $P=2T/r$) 즉 표면 장력이 커질수록 폐포를 유지하기 위해 더 높은 공기압이 필요하고, 폐포의 반지름이 작아질수록 더 높은 내부의 공기압이 요구된다.(라플라스 법칙의 적용) 즉 폐포는 작을수록 더 쉽게 허탈이 일어날 수 있다.(결론: 작은 폐포의 허탈 가능성)

3)

중심어(구) 라플라스 법칙, 정비례, 반비례

문장 독해

- 1 라플라스 법칙의 설명 : 폐포가 안정된 부피를 유지하기 위해 필요한 공기압은 라플라스 법칙으로 설명할 수 있음.
- 2 라플라스 법칙의 내용 : 폐포의 안정된 부피를 위해 필요한 내부의 공기압(P)은 표면 장력(T)에 정비례하고, 폐포의 반지름(r)에 반비례함.
-3 표면 장력이 커질수록 폐포를 유지하기 위해 더 높은 공기압이 필요함. -(부연)

$P = \frac{2T}{r}$ 라플라스 법칙	-4 폐포의 반지름이 작아질수록 더 높은 내부의 공기압이 요구됨. -(부연) •5 폐포는 작을수록 더 쉽게 허탈이 일어날 수 있음. -(결과) 중심 내용 라플라스 법칙에 따른 폐포의 안정성과 허탈 가능성
하지만 작은 폐포라 하더라도 허탈은 쉽게 일어나지 않는다.(작은 폐포의 허탈 방지) 폐포를 이루고 있는 II 형 폐포 세포가 계면 활성제를 분비하여 물 분자 사이의 인력을 방해하기 때문이다.(이유: II 형 폐포 세포의 계면 활성제 분비) 특히 폐포가 작아질수록 계면 활성제의 농도가 더 높아져 표면 장력은 더 많이 줄어든다.(폐포 크기와 계면 활성제 농도의 관계) 만약 계면 활성제가 부족해지면 작은 폐포의 허탈이 촉진되어 호흡 기능이 떨어지는 문제가 발생한다.(계면 활성제 부족 시 문제점)	4) 중심어(구) 계면 활성제, II 형 폐포 세포, 허탈 문장 독해 •1 작은 폐포라 하더라도 허탈은 쉽게 일어나지 않음. -(대비) -2 이유 : 폐포를 이루고 있는 II 형 폐포 세포가 계면 활성제를 분비하여 물 분자 사이의 인력을 방해하기 때문. -(원인) •3 폐포가 작아질수록 계면 활성제의 농도가 더 높아져 표면 장력은 더 많이 줄어든다. •4 계면 활성제가 부족해지면 작은 폐포의 허탈이 촉진되어 호흡 기능이 떨어지는 문제가 발생함. -(조건-결과) 중심 내용 계면 활성제의 역할과 부족 시 문제점 ▶글의 주제 : 폐포의 표면 장력과 계면 활성제의 역할을 통한 폐포 안정성 유지 원리

[Part 7] ◎ 독해 포인트(설명서) — 정답 버전

인간의 폐는 수많은 작은 폐포들로 이루어져 있으며, I 형 폐포 세포와 II 형 폐포 세포가 얇은 세포층을 형성하여 가스 교환을 담당한다. 폐포는 탄성력이 있어 부피가 변할 수 있으며, 이 늘어나는 정도를 신전성이라 한다. 폐포의 표면은 얇은 액체층으로 싸여 있고, 여기에는 표면 장력이 작용하여 폐포를 오그라들려는 경향을 나타낸다. 그러나 표면 장력에 의한 오그라들려는 힘과 폐포 내부의 공기압이 서로 평형을 이루기 때문에 폐포의 허탈은 거의 일어나지 않는다. 폐포의 안정된 부피를 유지하기 위해 필요한 공기압은 라플라스 법칙으로 설명되는데, 내부 공기압은 표면 장력에 정비례하고 폐포의 반지름에 반비례한다. 따라서 폐포가 작을수록 더 높은 공기압이 필요하여 허탈이 쉽게 일어날 수 있다. 하지만 II 형 폐포 세포가 계면 활성제를 분비하여 물 분자 사이의 인력을 방해함으로써, 작은 폐포에서도 허탈이 쉽게 일어나지 않는다. 특히 폐포가 작아질수록 계면 활성제의 농도가 더 높아져 표면 장력은 더 많이 줄어든다. 만약 계면 활성제가 부족해지면 작은 폐포의 허탈이 촉진되어 호흡 기능에 문제가 발생한다.

[Part 8] ◎ 핵심 개념 — 정답 버전

포인트 1. 폐포와 세포층

폐포는 포도송이의 포도알과 같은 구조로, 산소와 이산화탄소의 교환이 이루어지는 장소이다. 폐포벽은 I 형 폐포 세포와 II 형 폐포 세포로 구성되어 있다. I 형 폐포 세포는 전체 폐포 표면의 대부분을 차지하며 가스 교환에 관여하고, II 형 폐포 세포는 계면 활성제를 분비하는 역할을 한다.

포인트 2. 탄성력과 신전성

폐포는 탄성력이 있어 부피가 늘어났다가 다시 복원되는 특성을 가진다. 이러한 늘어나는 정도를 신전성이라 하는데, 신전성이 클수록 적은 에너지로 호흡이 가능하다. 폐포에 작용하는 표면 장력은 폐포를 오그라들게 하여 신전성을 감소시키는 요인이 된다.

포인트 3. 표면 장력

표면 장력은 액체의 표면이 스스로 수축하여 가능한 한 작은 면적을 취하려는 힘이다. 이 힘은 일반적인 분자 간의 인력보다 강한 물 분자 간의 인력에 의해 형성된다. 폐포에서 표면 장력은 폐포를 오그라들려는 경향을 만들지만, 폐포 내부의 공기압과 평형을 이루어 안정된 부피를 유지한다.

포인트 4. 라플라스 법칙

라플라스 법칙에 따르면 폐포의 안정된 부피를 위해 필요한 내부 공기압(P)은 표면 장력(T)에 정비례하고, 폐포의 반지름(r)에 반비례한다. 공식으로 표현하면 $P = 2T/r$ 이다. 이 법칙에 따르면, 반지름이 작은 폐포일수록 더 높은 내부 공기압이 필요하여 허탈이 더 쉽게 일어날 수 있다.

포인트 5. 계면 활성제의 역할

계면 활성제는 II 형 폐포 세포가 분비하는 물질로, 물 분자 사이의 인력을 방해하여 표면 장력을 낮추는 역할을 한다. 폐포가 작아질수록 계면 활성제의 농도가 높아져 표면 장력이 더 많이 감소한다. 계면 활성제가 부족해지면 작은 폐포의 허탈이 촉진되어 호흡 기능에 문제가 발생한다.

[Part 9] ◎ 내용 구조 — 정답 버전

포인트 1. 폐포의 구조와 특성

항목	내용
구조	I 형 폐포 세포와 II 형 폐포 세포가 얇은 <u>세포층</u> 을 이룸
기능	<u>산소</u> 와 <u>이산화탄소</u> 의 교환
특성	<u>탄성력</u> 이 있어 부피가 늘어났다가 <u>복원</u> 됨
신전성	늘어나는 정도 → 클수록 적은 <u>에너지</u> 로 호흡 가능

포인트 2. 표면 장력과 폐포의 안정성 (과정형)

폐포 표면의 액체층 → 표면 장력 작용 → 폐포가 오그라들려는 경향

↓

오그라들려는 힘 + 폐포 내부의 공기압 → 평형 유지 → 허탈 방지

포인트 3. 라플라스 법칙 (비교형)

요인	공기압(P)과의 관계	의미
표면 장력(T)	<u>정비례</u>	T가 커지면 P도 <u>커짐</u>
반지름(r)	<u>반비례</u>	r이 작아지면 P는 <u>커짐</u>

포인트 4. 계면 활성제의 작용 메커니즘 (과정형)

II 형 폐포 세포 → 계면 활성제 분비 → 물 분자 사이의 인력 방해 → 표면 장력 감소

↓

폐포가 작아질수록 → 계면 활성제 농도 증가 → 표면 장력 더 많이 감소 → 허탈 방지