

1. Пусть  $X_1, \dots, X_n$  – выборка из равномерного распределения на отрезке  $[0, \theta]$ . Найти оценку параметра  $\theta$ , наилучшую в среднеквадратичном смысле в классе оценок вида  $c_n \cdot X_{(n)}$ . Найти ее смещение.

Решение.

$$p_{X_n}(x) = \frac{nx^{n-1}}{\theta^n} \Rightarrow \mathbb{E}X_{(n)} = \int_0^\theta x \cdot \frac{nx^{n-1}}{\theta^n} dx = \frac{nx^{n+1}}{n\theta^n + \theta^n} \Bigg|_0^\theta = \frac{n\theta}{n+1}, \quad \mathbb{E}X_{(n)}^2 = \int_0^\theta x^2 \cdot \frac{nx^{n-1}}{\theta^n} dx = \frac{nx^{n+2}}{n\theta^n + 2\theta^n} \Bigg|_0^\theta = \frac{n\theta^2}{n+2}$$

Найдем среднеквадратическое отклонение:

$$MSE = \mathbb{E}(\hat{\theta} - \theta)^2 = \mathbb{E}(c_n \cdot X_{(n)} - \theta)^2 = c_n^2 \cdot \frac{n\theta^2}{n+2} - 2\theta c_n \cdot \frac{n\theta}{n+1} + \theta^2 = \theta^2 \left( \frac{nc_n^2}{n+2} - \frac{2nc_n}{n+1} + 1 \right)$$

$$\frac{\partial}{\partial c_n} \left( \mathbb{E}(c_n \cdot X_{(n)} - \theta)^2 \right) = \frac{\partial}{\partial c_n} \left( \theta^2 \left( \frac{nc_n^2}{n+2} - \frac{2nc_n}{n+1} + 1 \right) \right) = 0,$$

$$\frac{2c_n n^2 \theta^2 + 2c_n n \theta^2 - 2n^2 \theta^2 - 4n \theta^2}{n^2 + 3n + 2} = 0, \quad \text{отсюда минимум в } \boxed{c_n = \frac{n+2}{n+1}} \text{ — единственный корень.}$$

Тогда отклонение:

$$\mathbb{E}(c_n \cdot X_{(n)} - \theta) = \theta \left( \frac{n+2}{n+1} \cdot \frac{n}{n+1} - 1 \right) = \boxed{\frac{\theta}{(n+1)^2}}$$

2. Пусть  $X_1, \dots, X_n$  – выборка из нормального распределения  $N(\theta, 1)$  с параметром  $\theta \in \mathbb{R}$ . Для какой функции  $\tau(\theta)$  существует эффективная оценка? Вычислите информацию Фишера  $i(\theta)$  одного наблюдения в данной модели.

Решение.

Пользуясь критерием эффективности:

$$\hat{\theta}(X) - \tau(\theta) = c(\theta) \cdot \frac{\partial}{\partial \theta} \sum_{i=1}^n \log p_\theta(X_i) \Rightarrow \frac{\partial}{\partial \theta} \sum_{i=1}^n \log p_\theta(X_i) = \frac{\hat{\theta}(X) - \tau(\theta)}{c(\theta)}$$

Вклад:

$$\frac{\partial}{\partial \theta} \sum_{i=1}^n \log p_\theta(X_i) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial \theta} \log p_\theta(X_i) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial \theta} \log \left( \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \exp \left\{ \frac{-(x - \theta)^2}{2} \right\} \right) = \sum_{i=1}^n (X_i - \theta) = n \cdot (\bar{X} - \theta)$$

Отсюда:

$$\tau(\theta) = n\theta$$

Теперь считаем информацию Фишера:

$$c(\theta) = \frac{\tau'(\theta)}{i_n(\theta)} \Rightarrow i_n(\theta) = \frac{\tau'(\theta)}{c(\theta)} = n \Rightarrow i(\theta) = 1$$

Эффективная оценка существует для линейных преобразований функции  $\theta$ . Оценка с точностью до домножения на константу равняется  $\bar{X}$ .

3. Пусть  $X_1, \dots, X_n$  независимы и имеют биномиальное распределение  $Bi(l, \theta)$ . Доказать, что не существует оптимальной оценки для  $\tau(\theta) = \theta^{n+l}$ .

Решение.

Пусть  $\hat{T}$  – оптимальная оценка для  $\tau(\theta) = \theta^{n+1}$ . Тогда по всем канонам  $\mathbb{E}\hat{T} = \tau(\theta)$ .

$\Rightarrow \mathbb{E}(\hat{T}(X_1, \dots, X_n)) = \mathbb{E}(\theta^{n+1})$ , однако мы знаем, что  $X_1, \dots, X_n$  имеют биномиальное распределение, значит сумма их ожидаемых значений равна  $n\theta$ , поэтому  $\mathbb{E}(\theta^{n+1}) \neq \mathbb{E}(n\theta) = n\theta$ . Значит можно сделать вывод, что любая оценка  $\mathbb{E}\hat{T}$  будет смещенной, так как  $\mathbb{E}(\hat{T}(X_1, \dots, X_n)) \neq \tau(\theta)$ .

Следовательно, действительно не существует несмещенной (оптимальной) оценки для  $\tau(\theta)$  с  $X_1, \dots, X_n$ , имеющими биномиальное распределение  $Bi(1, \theta)$ .