FICHA TÉCNICA









AGRI KTS





INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Thiosulfato de Potasio

Especificaciones

- 1- Formulación líquida que contiene un alto concentrado de potasio y azufre en forma de tiosulfato de potasio.
- 2- Mejora la calidad, el tamaño de la fruta y acelera el proceso de maduración y coloración.
- 3- **AGRI KTS** tiene una reacción ácida en la zona de la raíz que hará que los micronutrientes fijos estén disponibles para la planta.
- 4- Mejora la salud de las plantas y la tolerancia a las enfermedades.
- 5- AGRI KTS puede suministrarse mediante riego por goteo y aplicación foliar.
- 6- No se recomienda mezclarlo con ningún otro fertilizante o Pesticida.

Composición (P/V)



Azufre S



Densidad: 1410 g/L PH : 12 CE: 1,1 mS Solubilidad a 20°C : 100 %

Dosis recomendadas para diferentes especies de cultívos

Cultivo	Dosificación			N°
	Fertirrigación L/ha	Foliar CC/hl	Tiempo de aplicación	Aplicaciones
Paltos	25 – 40	200-400	Realizar varias apl <mark>icaciones</mark> según lo recomiende <mark>el asesor,</mark> hasta 35 días antes de <mark>cosecha</mark>	3-4
Limones, Naranjos, Mandarinos, Pomelos, Tangelos, Clementinas	25 – 40	200-400	Realizar varias ap <mark>licaciones</mark> según lo recomiende e <mark>l asesor,</mark> hasta 35 días antes de cos <mark>echa</mark>	3-4
Cerezos, Ciruelos, Nectarines, Duraznos, Almendros, Avellano, Olivo	25 – 40	200-400	A partir del endurecimiento del carozo, repitiendo cada 10 – 12 días.	3-4
Manzanos, Perales, Membrillos, Nogales	25 – 40	200-400	Desde fruto con desarrollo, cada 7 – 10 días	3-4
Kiwis, Vid de Mesa, Vinifera y pisquera	25 – 40	200-400	Partir de 6 a 8 semanas de caída de pétalos y repetir, si es necesario, con intervalos de 10 - 14 días.	3-4
Arándanos, Frambuesas, Frutillas	25 – 40	200-400	Durante el crecimiento de los frutos, repetir cada 9 – 12 días	3-4
Espárragos	25 – 40	200-400	Inicio de brotación, a inicio del 2º brote y 25 días antes del último riego para chapoda	3-4
Hortalizas y Cucurbitáceas	25 - 40	200-400	Etapa de desarrollo y maduración	3-4

Almacenamiento

Mantener alejado del contacto directo con luz solar. Almacenar en un lugar seco y sin humedad. Evitar variaciones intensas de temperatura.

Es preferible almacenar a una temperatura entre 7-30°C, de otra manera la forma física del producto podría cambiar. Sin embargo, esto no afecta la eficiencia del producto ni sus propiedades químicas.

www.agriventures.cl

Precauciones

Recomendamos utilizar una dosis mínima para una deficiencia leve y una dosis máxima para una deficiencia grave.

Agriventures solo se responsabiliza de las cualidades físicas y químicas del producto, no se hace responsable por mal uso del producto o daños que pueda ocasionar por acciones distintas a las indicadas.



Importador: Agriventures Spa., Santiago – Chile. www.Agriventures.cl Ventas@Agriventures.cl