

Reconstrucción



Dr. Alejandro Veloz

Modelo de degradación

$$g(x, y) = h(x, y) \star f(x, y) + \eta(x, y)$$

$$G(u, v) = H(u, v)F(u, v) + N(u, v)$$


Modelos de ruido






Gaussian

Rayleigh

Gamma



Ruido periodico



Estimación de la función de degradación



$$G(u, v) = H(u, v)F(u, v) + N(u, v)$$



$$H_s(u, v) = \frac{G_s(u, v)}{\hat{F}_s(u, v)}$$

Filtrado inverso



$$\hat{F}(u, v) = \frac{G(u, v)}{H(u, v)}$$

$$\hat{F}(u, v) = F(u, v) + \frac{N(u, v)}{H(u, v)}$$

Filtro de Wiener

$$e^2 = E \left\{ (f - \hat{f})^2 \right\}$$

$$\begin{aligned}\hat{F}(u, v) &= \left[\frac{H^*(u, v) S_f(u, v)}{S_f(u, v) |H(u, v)|^2 + S_\eta(u, v)} \right] G(u, v) \\ &= \left[\frac{H^*(u, v)}{|H(u, v)|^2 + S_\eta(u, v)/S_f(u, v)} \right] G(u, v) \\ &= \left[\frac{1}{H(u, v)} \frac{|H(u, v)|^2}{|H(u, v)|^2 + S_\eta(u, v)/S_f(u, v)} \right] G(u, v)\end{aligned}$$

$H(u, v)$ = función de degradación

$H^*(u, v)$ = complejo conjugado de $H(u, v)$

$$|H(u, v)|^2 = H^*(u, v)H(u, v)$$

$S_\eta(u, v) = |N(u, v)|^2$ = Espectro de potencia del ruido

$S_f(u, v) = |F(u, v)|^2$ = especto de potencia de la imagen no degradada

Medidas de calidad de la reconstrucción

$$\text{SNR} = \frac{\sum_{u=0}^{M-1} \sum_{v=0}^{N-1} |F(u, v)|^2}{\sum_{u=0}^{M-1} \sum_{v=0}^{N-1} |N(u, v)|^2}$$

$$\text{MSE} = \frac{1}{MN} \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} [f(x, y) - \hat{f}(x, y)]^2$$

$$\text{SNR} = \frac{\sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} \hat{f}(x, y)^2}{\sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} [f(x, y) - \hat{f}(x, y)]^2}$$

Cuando el ruido es ruido blanco:

$$\hat{F}(u, v) = \left[\frac{1}{H(u, v)} \frac{|H(u, v)|^2}{|H(u, v)|^2 + K} \right] G(u, v)$$

Mínimos cuadrados con restricciones

$$C = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} \left[\nabla^2 f(x, y) \right]^2$$

Sujeto a

$$\|\mathbf{g} - \mathbf{H}\hat{\mathbf{f}}\|^2 = \|\boldsymbol{\eta}\|^2$$

Ridge regression