

## Recitation #19: Approximating functions with polynomials - Solutions

### Warm up:

For each of the following, write the given polynomial in summation notation starting with  $k = 0$ .

$$(a) \frac{3x}{2} - \frac{5x^2}{3} + \frac{7x^3}{4} - \frac{9x^4}{5} + \frac{11x^5}{6}$$

$$(b) \frac{1}{2}x + \frac{1 \cdot 5}{4 \cdot 2!}x^3 + \frac{1 \cdot 5 \cdot 9}{8 \cdot 3!}x^5 - \frac{1 \cdot 5 \cdot 9 \cdot 13}{16 \cdot 4!}x^7$$

$$(c) (x-1)^3 - \frac{(x-1)^4}{2!} + \frac{(x-1)^5}{4!} - \frac{(x-1)^6}{6!}$$

**Solution:** (a)  $\sum_{k=0}^4 (-1)^k (2k+3) \frac{x^{k+1}}{k+2}.$

$$(b) \sum_{k=0}^3 \frac{1 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (4k+1)}{2^{k+1}(k+1)!} x^{2k+1}.$$

$$(c) \sum_{k=0}^3 \frac{(-1)^k}{(2k)!} (x-1)^{k+3}.$$

### Group work:

**Problem 1** Assuming that the function  $f(x)$  is infinitely differentiable, and given that

$$f(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a)^1 + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \frac{f'''(a)}{3!}(x-a)^3 + c_4(x-a)^4 + \frac{f^{(5)}(a)}{5!}(x-a)^5$$

show that the coefficient  $c_4$  of the  $(x-a)^4$  term in the Taylor polynomial is  $\frac{f^{(4)}(a)}{4!}.$

---

Learning outcomes:

Recitation #19: Approximating functions with polynomials - Solutions

**Solution:** Notice that we have the following:

$$f'(x) = f'(a) + f''(a)(x-a) + \frac{f^{(3)}(a)}{2}(x-a)^2 + 4c_4(x-a)^3 + \frac{f^{(5)}(a)}{4!}(x-a)^4$$

$$f''(x) = f''(a) + f^{(3)}(a)(x-a) + 4 \cdot 3c_4(x-a)^2 + \frac{f^{(5)}(a)}{3!}(x-a)^3$$

$$f^{(3)}(x) = f^{(3)}(a) + 4 \cdot 3 \cdot 2c_4(x-a) + \frac{f^{(5)}(a)}{2}(x-a)^2$$

$$f^{(4)}(x) = 4! \cdot c_4 + f^{(5)}(a)(x-a)$$

$$f^{(4)}(a) = 4! \cdot c_4 + 0$$

$$\Rightarrow \boxed{c_4 = \frac{f^{(4)}(a)}{4!}}.$$

**Problem 2** Let  $f(x) = \sin(2x)$ . Find  $p_3(x)$  about the point  $a = \frac{\pi}{8}$ .

**Solution:** First, note that around  $a$

$$p_3(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2}(x-a)^2 + \frac{f^{(3)}(a)}{3!}(x-a)^3.$$

So we compute

$$f'(x) = 2 \cos(2x) \quad \Rightarrow \quad f'\left(\frac{\pi}{8}\right) = \sqrt{2}$$

$$f''(x) = -4 \sin(2x) \quad \Rightarrow \quad f''\left(\frac{\pi}{8}\right) = -2\sqrt{2}$$

$$f^{(3)}(x) = -8 \cos(2x) \quad \Rightarrow \quad f^{(3)}\left(\frac{\pi}{8}\right) = -4\sqrt{2}.$$

Therefore

$$\boxed{p_3(x) = \frac{\sqrt{2}}{2} + \sqrt{2}\left(x - \frac{\pi}{8}\right) - \sqrt{2}\left(x - \frac{\pi}{8}\right)^2 - \frac{2\sqrt{2}}{3}\left(x - \frac{\pi}{8}\right)^3}.$$

**Problem 3** Let  $f(x) = xe^{-x}$  on the interval  $[-2, 8]$ .

(a) Write the Taylor polynomial  $p_4(x)$  around  $a = 3$ .

$$\text{Fun facts: } f'(x) = -e^{-x}(x-1)$$

$$f''(x) = e^{-x}(x-2)$$

$$f^{(3)}(x) = -e^{-x}(x-3)$$

$$f^{(4)}(x) = e^{-x}(x-4)$$

Recitation #19: Approximating functions with polynomials - Solutions

- (b) Write  $p_4(x)$  about  $a = 3$  in summation notation. Also, write the remainder term  $R_4(x)$ .
- (c) Calculate  $p_4(4.5)$  and, using  $R_4(4.5)$ , estimate how close  $p_4(4.5)$  is to  $f(4.5)$ . Do the same for  $p_4(1.5)$ .
- (d) Use the remainder term  $R_4(x)$  to estimate the maximum error for  $p_4(x)$  on  $[-2, 8]$ .
- (e) How large must  $n$  be to assure that the  $n^{\text{th}}$  degree Taylor polynomial for  $f(x) = xe^{-x}$  about  $a = 3$  approximates  $2e^{-2}$  within  $10^{-5}$ ?

**Solution:** (a)

$$\begin{aligned} p_4(x) &= f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \frac{f^{(3)}(a)}{3!}(x-a)^3 + \frac{f^{(4)}(a)}{4!}(x-a)^4 \\ &= 3e^{-3} - 2e^{-3}(x-3) + \frac{e^{-3}}{2}(x-3)^2 - \frac{e^{-3}}{4!}(x-3)^4. \end{aligned}$$

(b)

$$p_4(x) = \sum_{k=0}^4 \frac{(-1)^k e^{-3} (3-k)}{k!} (x-3)^k.$$

$$R_4(x) = f(x) - p_4(x) = \frac{f^{(5)}(c)}{5!} (x-3)^5 = \frac{-e^{-c}(c-5)}{5!} (x-3)^5$$

for some  $c$  between  $x$  and  $3$ .

(c)

(d)

(e)