	No trend class (ligands)	Lanthanides measured (median of 14)	Conditions per ligand (median)	Class kept in < 90% of σ draws (fitted ligands)	Adjacent SF within 2σ of 1
DGA (73)	38/73	1	3	5/35	58%
Phosphine oxide (18)	3/18	6	1	11/15	80%
DAPhen (13)	4/13	13	1	2/9	41%
Malonamide (11)	2/11	9	1	5/9	81%
Bipydiamide (8)	1/8	13	1	3/7	67%
Multidentate N-donor (8)	4/8	7	1	1/4	58%
MAPhen (6)	1/6	14	2.5	2/5	57%
Pyridinediamide (6)	1/6	14	6	1/5	58%
BLPhen (4)	0/4	14	2	1/4	30%
Crown ether (4)	1/4	4.5	1	0/3	40%
Phosphonate (4)	2/4	4.5	3	2/2	76%
Tripodal-DGA (3)	3/3	1	15	–	–
Amide (2)	1/2	3.5	6	0/1	17%
Nitrilotriacetamide (2)	1/2	7.5	11.5	0/1	80%
Polyether diamide (2)	0/2	14	8.5	0/2	78%
Butanediamide (1)	0/1	4	1	1/1	100%
Phosphate (1)	0/1	13	6	0/1	73%
Phosphoric acid (1)	0/1	10	1	0/1	50%
Phthalamic acid (1)	1/1	2	1	–	–
Polyphenol (1)	1/1	3	1	–	–