

# Traces écrites Sec11

## Janvier 2026

**6 janvier 2026**

CHAPITRE : Repérage

## 1 Notion de Repère

Pour se repérer dans le plan, on utilise trois points non alignés  $O$ ,  $I$  et  $J$  qui forment un **repère**, noté  $(O; I, J)$ .


**Définition 1.1 :**

- L'**origine** est le point  $O$ .
- L'**axe des abscisses** est la droite  $(OI)$  (axe horizontal).
- L'**axe des ordonnées** est la droite  $(OJ)$  (axe vertical).
- La distance  $OI$  donne l'unité sur l'axe des abscisses.
- La distance  $OJ$  donne l'unité sur l'axe des ordonnées.

### 1.1 Les différents types de repères

Il est crucial de savoir distinguer les types de repères car certaines formules (comme la distance) ne fonctionnent que dans un cas précis.

Type de Repère	Caractéristique
<b>Quelconque</b>	Les droites $(OI)$ et $(OJ)$ sont sécantes, les unités sont quelconques.
<b>Orthogonal</b>	Les droites $(OI)$ et $(OJ)$ sont <b>perpendiculaires</b> .
<b>Orthonormé</b>	Les droites $(OI)$ et $(OJ)$ sont <b>perpendiculaires</b> ET les unités sont égales ( $OI = OJ = 1$ ).



**1. Quelconque**  
 $(OI)$  et  $(OJ)$  sécantes  
 $OI \neq OJ$

**2. Orthogonal**  
 $(OI) \perp (OJ)$   
 $OI \neq OJ$

**3. Orthonormé**  
 $(OI) \perp (OJ)$   
 $OI = OJ$

**Remarque 1 :**

Sauf mention contraire, on travaille généralement dans un **repère orthonormé** pour simplifier les calculs de distances.

## 2 Coordonnées d'un point

**Définition 2.1 :**

Dans un repère  $(O; I, J)$ , tout point  $M$  est repéré par un unique couple de nombres réels  $(x_M; y_M)$ .


- $x_M$  est l'**abscisse** de  $M$ .
- $y_M$  est l'**ordonnée** de  $M$ .

On note le point :  $M(x_M; y_M)$ .

**Exemple 1 :**

Sur la figure ci-dessous :

- Le point  $A$  a pour abscisse 2 et pour ordonnée 3. On note  $A(2; 3)$ .
- Le point  $B$  a pour abscisse  $-1$  et pour ordonnée  $-2$ . On note  $B(-1; -2)$ .



## 3 Coordonnées du milieu d'un segment

Cette formule est valable dans **tous** les types de repères.

**Propriété 3.1 :**

Soient deux points  $A(x_A; y_A)$  et  $B(x_B; y_B)$ . Les coordonnées du milieu  $K$  du segment  $[AB]$  sont :

$$x_K = \frac{x_A + x_B}{2} \quad \text{et} \quad y_K = \frac{y_A + y_B}{2}$$

*Moyen mnémotechnique : C'est la "moyenne" des coordonnées.*

**Exemple 2 :**

Soit  $A(2; 4)$  et  $B(-4; 6)$ . Calculons les coordonnées de  $K$ , milieu de  $[AB]$  :

$$x_K = \frac{2 + (-4)}{2} = \frac{-2}{2} = -1$$

$$y_K = \frac{4 + 6}{2} = \frac{10}{2} = 5$$

Le milieu est  $K(-1; 5)$ .

**13 janvier**