Javoblar — aralash namuna

Manbalar: Samarqand 2-variant (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 36, 38, 39, 42) va Tongotarov 4-variant (qolganlari). Hamma raqamli javoblar qo‘lda qayta hisoblab tekshirildi va mos keldi.

1–40

1 C	**2** D	**3** A	**4** A	**5** D	**6** C	**7** C	**8** B	**9** C	**10** D
11 C	**12** C	**13** C	**14** B	**15** C	**16** B	**17** B	**18** D	**19** C	**20** D
21 D	**22** C	**23** D	**24** B	**25** A	**26** A	**27** B	**28** A	**29** D	**30** A
31 A	**32** A	**33** F	**34** C	**35** B	**36** 23	**37** 72	**38** 56	**39** 0,3	**40** 46

41 (yozma)

1) 66,2 g; 2) 1,8 mol; 3) 189 g; 4) 3,2 mol; 5) 2,2 mol

Izoh: 41-5 da kalit uglerodning suyultirilgan HNO_3 bilan oksidlanishini hisobga oladi (darslikda yo‘q), band munozarali. 41-3 da rux kaliy tetragidroksozinkat sifatida hisoblangan.

42

A – C_4H_{10} (butan), B – C_3H_6 (propen), C – C_2H_2 (atsetilen), D – CH_3CHO (sirka aldegid), E – CH_3COOH (sirka kislota), F – $CH_2(OH)–CH(OH)–CH_3$ (propandiol-1,2), G – $HCOOH$ (chumoli kislota), H – $CH_2Cl–COOH$ (xlorsirka kislota), I – $H_2N–CH_2–COOH$ (glitsin).
Samarqand kaliti reaksiya tenglamalarini bermaydi, faqat moddalarni.

43

A – NH_3, B – N_2H_4, C – HNO_2, D – HN_3, E – N_2, F – H_2, G – Br_2/H_2O, H – NH_4Br
1) $2NH_3 + KClO \rightarrow N_2H_4 + KCl + H_2O$
2) $N_2H_4 + HNO_2 \rightarrow HN_3 + 2H_2O$
3) $2HN_3 \rightarrow H_2 + 3N_2$
4) $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$
5) $8NH_3 + 3Br_2 \rightarrow N_2 + 6NH_4Br$