

化學藥物治療引起的副作用—口腔黏膜炎

化學藥物治療會傷害病人的口腔黏膜，造成潰瘍與發炎，於治療後4~7天出現，7~14天達高峰；在化學藥物治療期間，會使病人白血球下降，間接使得黏膜容易受到口腔內細菌或黴菌等微生物的侵犯與感染。此外，病人會因為疼痛而影響進食及吞嚥，嚴重時會導致營養不良或脫水，所以預防口腔黏膜炎的發生是非常重要的。

一、口腔黏膜炎症狀：

- (一)口乾。
- (二)味覺及嗅覺改變。
- (三)牙齦、牙齒、舌頭感染。
- (四)對食物冷或熱的敏感度增加。
- (五)黏膜疼痛。
- (六)吞嚥困難。



二、口腔黏膜炎的自我照顧：

- (一)檢查口腔：每日一次，利用鏡子及手電筒（筆燈）進行口腔自我檢查，檢查口腔黏膜是否有紅腫及潰瘍。
- (二)用物準備：軟毛牙刷、含氟但不含顆粒之中性牙膏、不含酒精成分之漱口水、生理食鹽水、水溶性或蘆薈潤唇膏及牙線（視情況）。
- (三)維持口腔清潔：養成於餐後30分鐘清潔口腔的習慣。
 - 1.刷牙：一天2-4次，一次至少90秒，若刷牙後發生牙齦疼痛或持續出血超過2分鐘，則不建議使用牙刷，可改使用指頭包裹紗布或使用海綿棒沾漱口水清潔牙齒，每次使用牙刷後，應充分清潔後自然乾燥，並至少一個月更換一次。若有活動性假牙，建議吃完飯後取下假牙並清洗。此外建議一天可使用一次牙線清潔牙齒；但若血小板低於50,000/ul時，則不建議使用。
 - 2.漱口：可以維持口腔濕潤，並將食物殘渣移除，保持口腔清潔。建議使

用醫師開立之漱口水或中性漱口水，如生理食鹽水（N/S），請勿自行購買市販的漱口藥水，其可能含有酒精，容易刺激口腔黏膜，造成口腔敏感疼痛，漱口的頻率為刷牙後，一天4次、每次30秒，每次15c.c.，保持口腔濕潤，除了漱口外，也可利用咀嚼無糖口香糖的方式刺激唾液分泌。

3. 嘴唇護理：在每次口腔護理後或需要時，可使用含水或蘆薈潤唇膏保持嘴唇濕潤。

（四）飲食注意事項：

1. 避免抽菸、喝酒及辛辣、太燙、具酸性等刺激性或是質地堅硬、粗糙的食物，如雞爪、油炸物品、咖啡、辣椒、柑橘等，減少對口腔黏膜的刺激與損傷。
2. 可選擇溫度較低、質地軟易咀嚼的食物，如馬鈴薯泥、蒸蛋、加蛋的燕麥粥、冰淇淋、濃湯、牛奶、布丁、白木耳湯等。
3. 每日喝8~12杯水（250 mL/杯），維持口腔黏膜的濕潤。

三、預防與治療

- （一）化學藥物治療前30分鐘口含碎冰塊，可使口腔的血管收縮，減少隨著血液到口腔細胞的化學藥物劑量，降低化學藥物對口腔黏膜的破壞，並可減輕疼痛或口乾情形。
- （二）在醫師或營養師的建議下，可購買市售高熱量、高蛋白的營養品使用，如麩醯胺基酸，可促進口腔黏膜修復。
- （三）如果您有嚴重的口乾、口腔黏膜炎、潰瘍或持續出血情形，請告訴醫護人員，必要時提供您止痛藥物、口腔局部用藥或暫時停止化學藥物治療。

參考資料

Nagaoka, H., Momo, K., Hamano, J., Miyaji, T., Oyamada, S., Kawaguchi, T., Homma, M., Yamaguchi, T., Morita, T., & Kizawa, Y. (2021). Effects of an Indomethacin oral spray on pain due to oral mucositis in cancer patients treated with radiotherapy and chemotherapy: A double-blind,

randomized, placebo-controlled trial (JORTC-PAL04). *Journal of Pain and Symptom Management*, 62(3), 537-544.

<https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2021.01.123>

Gündogdu, F., & Sayar, S. (2022). Oncology nursing practices in the management of chemotherapy-related oral mucositis in accordance with evidence-based guidelines: A descriptive and cross-sectional study.

Supportive Care in Cancer, 30(11), 9549-9557.

<https://doi.org/10.1007/s00520-022-07361-3>

護理指導評值

◎是非題

1. () 化學治療其間較容易造成口腔黏膜發炎或破損，是因為人體白血球減少。
2. () 口腔黏膜症狀為口乾、味覺及嗅覺改變、牙齦、牙齒、舌頭感染、對食物冷或熱的敏感度增加、黏膜疼痛、吞嚥困難。
3. () 化學藥物治療前 30 分鐘口含碎冰塊，可使口腔的血管收縮，局部血流減少隨著血液到口腔細胞的化學藥物劑量也跟著減少，可降低化學藥物對口腔黏膜的破壞。

◎選擇題

4. () 攝取何種營養品可增進口腔黏膜的修復？
(1)高蛋白及高熱量；(2)高脂肪；(3)高纖維；(4)高鈉
 5. () 口腔黏膜炎自我照護的方法有哪些？
(1)口腔檢查；(2)口腔清潔；(3)飲食；(4)以上皆是
 6. () 飲食建議選擇溫度較低、質地軟易咀嚼的食物，以下何者為是？
(1)馬鈴薯泥；(2)蒸蛋；(3)麥粥；(4)以上皆是
- (答對 5-6 題⇒完全了解；答對 3-4 題⇒部分了解；答對 1-2 題⇒完全不瞭解)

1.(O) 2.(O) 3.(O) 4.(1) 5.(4) 6.(4)