



血小板減少症居家照顧注意事項

一、何謂血小板減少症？

血液中的血小板具有凝血及止血的功能，正常血小板數目為 15 萬~40 萬個/mm³，當血小板凝血功能受到抑制、數量製造過少或是消耗增加，血小板數值低於 15 萬個/mm³時，便可稱為血小板減少症，雖然部分的病人在臨床上沒有相關的症狀，但大部分血小板減少症的病人容易有出血現象，例如：皮膚出現點狀出血、瘀青或是瘀斑、解黑便或血便，嚴重者甚至導致自發性腦出血造成死亡。

二、血小板減少可能原因？

- (一) 血小板的製造功能降低：可能是受到放射治療、化學治療、感染、藥物或骨髓本身的疾病，如白血病、再生不良性貧血等因素，導致血小板的製造減少。
- (二) 血小板的破壞增加：自體免疫疾病、血管栓塞、感染或疾病，如肝硬化會造成脾臟腫大導致血小板的破壞增加。

三、血小板減少時常見的症狀

- (一) 流鼻血頻率增加或出血時間延長。
- (二) 皮膚容易出現皮下出血點、瘀青或紫斑，若有傷口時較不容易止血。
- (三) 痰液中帶有血絲或出現咳血的情形。
- (四) 口腔、黏膜或牙齦容易出血，口腔內易有帶血的水泡。
- (五) 可能會有血尿情形，若是女性可能會有月經量過多或經血不止的情形。
- (六) 嚴重時會有腦出血（病人可能會有頭痛、嘔吐、煩躁不安及意識改變等症狀）、解黑便或血便的情形發生。

四、血小板減少的注意事項

- (一) 請輕輕擤鼻涕，不要用手指頭挖鼻孔，以避免鼻腔出血。
- (二) 抽血或打針後，穿刺部位處以手指加壓止血至少 5~10 分鐘，直到無出血後再放開，若仍有持續出血的情形，請立即告知醫護人員。
- (三) 宜攝取溫和、軟質及無刺激性食物，避免食用過熱或過硬的食物，如堅果類等，以避免造成口腔黏膜與牙齦出血。

- (四) 若牙齦出血，建議用棉花直接加壓出血處直到止血；若鼻出血，建議壓住出血側的鼻樑上方（如圖一），並採坐姿、身體微向前傾（如圖二），以避免吞入血液或嗆到，針對患部亦可進行冰敷，以促進血管收縮，延緩出血症狀，若出血情形持續不止，請立即就醫處理。



圖一、以手壓住鼻樑上方



圖二、坐姿、身體微向前傾

- (五) 為避免口腔黏膜或牙齦出血的發生，請使用軟毛牙刷或海棉潔牙棒刷牙，並避免使用牙線或牙籤。男性請使用電動刮鬍刀，避免使用剃刀，以預防刮傷出血（鬍子若太長可先用剪刀修短）。
- (六) 在無水份攝取限制的情形下，每日應喝水約 2,000~3,000 mL，以避免大便過硬造成解便時肛門出血，並注意不可自行灌腸或使用肛門塞劑，避免造成直腸黏膜損傷。
- (七) 女性避免陰道灌洗及使用陰道塞劑或衛生棉條，症狀發生期間，避免有性行為。
- (八) 日常生活活動不需特別限制，但應避免從事會肢體碰撞的運動或從事可能造成受傷之活動，如按摩、打籃球、躲避球、橄欖球等；當改變姿勢時應緩慢，採漸進式活動，如由躺→坐→站，不要一瞬間彈跳而起。
- (九) 維持居家生活環境安全，鼓勵行動不便者使用輔助器具（如拐杖或助行器），預防跌倒，以防碰撞產生出血。
- (十) 了解目前服用藥物，避免自行購買成藥或服用會影響凝血功能的食物或藥物，例如阿斯匹靈、非類固醇類抗發炎藥物或是銀杏等。
- (十一) 出血的急性治療包含注射免疫球蛋白、皮質類固醇和輸注血小板。醫師會評估您的狀況，定期監測血小板數量，必要時予以輸注血小板。
- (十二) 如有持續劇烈頭痛、嘔吐情形或出現血流不止時，請立即就醫治療。



參考資料

- Arnold, D. M., Cuker, A., & Kunins, L. (2024). Diagnostic approach to the adult with unexplained thrombocytopenia. *UpToDate*. Retrieved May 01, 2024, from <https://reurl.cc/RjaQrn>
- Mithoowani, S., Cervi, A., Shah, N., Ejaz, R., Sirotich, E., Barty, R., & Arnold, D. M. (2020). Management of major bleeds in patients with immune thrombocytopenia. *Journal of Thrombosis and Haemostasis*, 18(7), 1783-1790. <https://doi.org/10.1111/jth.14809>

護理指導評值

◎是非題

1. () 當血小板減少時，宜攝取溫和、軟質、無刺激性食物，避免食用熱或過硬的食物，如堅果類等。
2. () 當血小板減少時，避免大便過硬造成解便時肛門出血，可自行灌腸或使用肛門塞劑。
3. () 當血小板減少時，改變姿勢不需緩慢及採漸進式活動，可一瞬間彈跳而起。

◎選擇題

4. () 當血小板減少時，須避免做下列哪些活動，以避免受傷？
(1)按摩；(2)打籃球；(3)躲避球；(4)以上皆是。
 5. () 當血小板減少時，應避免使用何種日常生活用品，以降低口腔黏膜或牙齦出血機會？
(1)軟毛牙刷；(2)海棉潔牙棒刷牙；(3)電動刮鬍刀；(4)牙線或牙籤。
 6. () 下列何者為血小板減少時常見的症狀？
(1)流鼻血頻率增加或出血時間延長；(2)皮膚容易出現皮下出血點、瘀青或紫斑；(3)痰液中帶有血絲或出現咳血；(4)以上皆是。
- (答對 5-6 題⇒完全了解；答對 3-4 題⇒部分了解；答對 1-2 題⇒完全不瞭解)

1.(O) 2.(X) 3.(X) 4.(4) 5.(4) 6.(4)