

白血球低下之自我照護

一、白血球低下之定義

白血球生成於骨髓組織，而骨髓對放射線治療和化學治療藥物最敏感，因此接受這類治療的病人，血液中白血球數目容易減少。化學治療所使用的藥物，對於生長較快的細胞影響會較大，除了腫瘤細胞外，白血球的生長也易受到抑制，而引起白血球降低的副作用；白血球下降的程度與時間，會因藥物的種類、劑量以及病人自身骨髓功能、造血細胞對藥物的敏感度不同而有很大差異。

白血球數目正常範圍是 4,000~10,000 個/立方毫米，主要功能為吞噬及消滅細菌與病毒，一旦白血球下降，人體抵抗力即會降低，可能會出現感染。白血球種類分為嗜中性白血球、嗜酸性白血球、嗜鹼性白血球、淋巴球、單核球等，其中嗜中性白血球是身體第一道防線，也是判斷身體是否處於感染的重要指標；當嗜中性白血球數值小於 1,500 個/立方毫米時，稱為嗜中性白血球低下症，當嗜中性白血球數值小於 500 個/立方毫米時，則需採取保護性隔離之措施，以降低感染的機會。

二、照顧注意事項

（一）照護環境

1. 生活環境應保持整齊清潔，避免堆積物品，並以濕拖的方式代替乾打掃，以避免病菌及灰塵飛揚。
2. 室內勿放置盆栽、鮮花、乾燥花及飼養寵物，以免滋生蚊蟲與細菌，而增加感染的機會。
3. 避免出入人群眾多的公共場所或接觸生病的人，以降低受感染的機會。
4. 儘量選擇單人房，限制訪客。

（二）會客原則

醫護人員、家人及訪客皆需戴口罩，當口罩潮濕時應立即更換，並限制有傳染病之訪客，如細菌感染、皰疹、感冒、流行性感冒、水痘、麻疹等，避免與剛接受活性或減毒疫苗者、6 週內接受活菌疫苗注射者接觸。

（三）飲食與營養

1. 飲食以熟食為主，水果須有完整的果皮，剝皮後應立即食用，勿買已切好之水果。避免食用未妥善處理之生菜、泡菜、醬菜、生魚片、生蛋、含酵母菌類奶製品（如優酪乳、優格、養樂多等）、生奶製品（如生食起司、乳酪、奶油）等食物。
2. 建議飲用蒸餾水或煮開的水，避免食用市售冰塊、冰品或礦泉水。

3. 準備食物前後須先以溫水及肥皂洗手。處理生食與熟食之砧板、菜刀等器具須分開使用，每次使用後須以溫水及清潔劑清洗。
4. 均衡飲食，多攝取高蛋白質、高熱量、含豐富維生素 C 及礦物質食物，並維持規律生活習慣以增強抵抗力。
5. 使用個人專用餐具，不要分食；食物勿置放太久，建議開封後最好馬上食用。

(四) 個人衛生

1. 保持口腔清潔：每日以軟毛牙刷刷牙至少 2 次，並於每次進食後 30 分鐘內以生理食鹽水或蒸餾水清潔口腔，視情況使用牙線，但應避免受傷。
2. 每日以溫和肥皂身體清潔，建議以淋浴為優先，蓮蓬頭使用前後須加強清潔，若採盆浴或擦澡，器皿須以熱水及肥皂清洗並保持乾燥。
3. 保持肛門黏膜的完整性：避免用力擦拭，避免灌腸、塞劑、忌量肛溫，以保持肛門口的皮膚完整性。
4. 女性則避免使用陰道沖洗器及衛生棉條等，月經來臨時，應常更換衛生棉，以避免感染發生。
5. 女性每次如廁後以溫水清潔肛門及會陰部，擦拭方式須由前往後，以預防大便污染尿道造成尿道感染。
6. 使用肥皂水或酒精乾洗手液正確手部清潔，尤其是吃飯前或如廁後，且不可戴人工指甲，避免刮傷造成感染。

(五) 觀察感染症狀

如發燒、身上有不明原因之紅、腫、熱、痛情形、管路或穿刺部位有異常分泌物或紅、腫、熱、痛情形，應立即告知護理師。返家後若有發燒情形不可自行吃退燒藥，必須就醫檢查。

(六) 居家寵物照護注意事項

避免接觸寵物，尤其是寵物的唾液、排泄物，若有接觸須穿戴手套，並接觸後徹底洗手，皮膚如被抓傷或咬傷須緊急清潔消毒。

參考資料

洪敏瑛、邱文姿、戴仕卿、陳淑娟、蕭逸美、楊琇玲 (2022)・癌症病人嗜中性白血球低下臨床照護指引第三版・腫瘤護理雜誌，22，59-91。

https://doi.org/10.6880/TJON.202210/SP_22.02

Coates, T. D. (2022). Overview of neutropenia in children and adolescents.



UpToDate. Retrieved January 10, 2025, from

<https://www.uptodate.com/contents/Overview-of-neutropenia-in-children-andadolescents>

Wingard, J. R. (2024). Risk assessment of adults with chemotherapy-induced neutropenia. UpToDate. Retrieved January 10, 2025, from

<https://www.uptodate.com/contents/Risk-assessment-of-adults-with-chemotherapy-induced-neutropenia>

護理指導評值

◎是非題

1. () 化學治療造成食慾不好，可以買清爽的生菜沙拉吃。
2. () 接受化學治療期間，外出都要戴上口罩。
3. () 回家時，若有發燒情形可以自行吃退燒藥。

◎選擇題

4. () 如何增強免疫力？
 - (1)均衡飲食。
 - (2)多攝取高蛋白質、高熱量及含豐富維生素 C 及礦物質食物。
 - (3)維持規律生活習慣。
 - (4)以上皆是。
5. () 下列敘述何者正確？
 - (1)建議飲用蒸餾水或煮開的水。
 - (2)避免食用市售冰塊、冰品。
 - (3)以上皆是。
6. () 化學治療後白血球會一直低下嗎？
 - (1)會，藥物殺死細胞後不會再長出來了。
 - (2)不會，身體會自行自造新的白血球。

(答對 5-6 題⇒完全了解；答對 3-4 題⇒部分了解；答對 1-2 題⇒完全不瞭解)

1.(X) 2.(O) 3.(X) 4.(4) 5.(3) 6.(2)

三軍總醫院 護理部 編印
血液腫瘤科
諮詢電話：(02) 87927056