

化學治療引起噁心、嘔吐之穴位按摩


化學治療引起的噁心、嘔吐是化學治療過程中最難忍受的症狀，近年來許多國內外研究指出，穴位按摩可有效改善或延遲噁心的嚴重程度，最常按摩的穴位是內關穴。穴位按摩是一種不具侵入性且簡單的自我照顧方法，可由病人自行或照顧者協助執行以促進病人舒適。

一、評估是否適合穴位按摩，當有以下狀況不可穴位按摩


- (一) 按摩側有管路、傷口。
- (二) 骨折、骨髓炎、化膿性關節炎病人。
- (三) 慢性傳染病，如肝炎、肺炎。
- (四) 患有心臟病、高血壓、中風等心血管疾病。
- (五) 患有血液疾病且有出血傾向者，如血小板異常。
- (六) 懷孕。

二、尋找內關穴

- (一) 手掌朝上，在手腕位置上尋找最靠近手掌的橫紋(基準線)(如圖 A)。



- (二) 以自己的手指，由最靠近手掌的橫紋為基準線(如圖 B 所示)，往手臂的方向取 3 指幅，在此位置的中間點(如圖 B 打○處)，輕壓可觸摸到兩條筋的中間，按壓時手掌會有脹麻的感覺。



三軍總醫院 護理部 編印
血液腫瘤科

諮詢電話：(02) 87927056

三、按摩方式

以拇指指腹按壓內關穴（如圖 C）按壓至覺得有酸、脹、麻感覺，持續時間約 3~5 秒鐘，休息 10 秒鐘，一次按摩療程共約 15 分鐘，不得超過 15 分鐘。



圖 C

四、注意事項

按壓避免太用力，當感覺疼痛請停止操作，若體力較虛弱可由照顧者協助操作。

參考資料

施美玲、寇蕙蓀、許麗玉、陳孟君(2022). 穴位按壓對緩解接受化學治療乳癌病人急性與延遲性噁心嘔吐影響之系統性文獻回顧與臨床應用. *腫瘤護理雜誌*, 22(2), 21-33. [https://doi.org/10.6880/TJON.202212_22\(2\).02](https://doi.org/10.6880/TJON.202212_22(2).02)

Chen, L., Wu, X., Chen, X., & Zhou, C. (2021). Efficacy of auricular acupressure in prevention and treatment of chemotherapy-induced nausea and vomiting in patients with cancer: A systematic review and meta-analysis. *Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine : eCAM*, 2021, 8868720. <https://doi.org/10.1155/2021/8868720>

Schumann, M. L., Buhse, M., Maloney, M., & Ugolini, H. (2021). implementing p6 acupressure in conjunction with pharmacotherapy to decrease chemotherapy-induced nausea and vomiting: A nurse-led ebp initiative to improve care and quality of life. *Worldviews on Evidence-Based Nursing*, 18(3), 234-236. <https://doi.org/10.1111/wvn.12491>



護理指導評值

◎是非題

1. () 穴位按摩可改善或延遲化學治療引起的噁心程度。
2. () 穴位按摩過程中如感到疼痛難耐應立即停止。
3. () 穴位按摩是一種不具侵入性且簡單的自我照顧方法，可由病人自行或照顧者協助執行以促進病人舒適。

◎選擇題

4. () 什麼樣的情況下不適合執行穴位按摩？
(1)按壓處有傷口；(2)血小板異常，有出血傾向者；(3)骨折；(4)以上皆是。
5. () 內關穴距離手掌橫紋幾指幅？
(1) 1 指；(2) 2 指；(3) 3 指；(4) 4 指。
6. () 下列關於穴位按摩的注意事項何者正確？
(1)按壓避免太用力；(2)當感覺疼痛時立即停止操作；(3)若體力較虛弱可由家屬協助；(4)以上皆是。

(答對 5-6 題⇒完全了解；答對 3-4 題⇒部分了解；答對 1-2 題⇒完全不瞭解)

1.(0) 2.(0) 3.(0) 4.(4) 5.(3) 6.(4)

三軍總醫院 護理部 編 印
血液腫瘤科

諮詢電話：(02) 87927056