

癌症病人紅血球減少之自我照顧

一、紅血球作用

血液中大部分的成分為紅血球，紅血球具有將氧氣運送到全身的作用。紅血球減少是指血液中的紅血球細胞濃度減少、血色素降低或血液稀薄的狀態。當紅血球數量減少時，氧氣的攜帶能力會降低，會出現缺氧狀態，而產生頭暈、心跳快、活動耐力變差或步行時有呼吸喘的情形；嚴重時會有胸悶或胸痛，甚至有生命危險。

二、癌症病人紅血球減少的原因

貧血是癌症疲勞的常見原因，而疲勞是影響癌症病人日常活動中最常見症狀，因此識別貧血及其原因可改善癌症病人生活質量是非常重要的。大部分癌症病人在接受化學治療期間都會出現貧血情形，原因可能是紅血球生成不足、紅血球破壞增加及失血過多。紅血球生成不足的原因包括：營養素缺乏（如葉酸、維他命B12、鐵等）、骨髓疾病、骨髓抑制（如藥物、放療、化療影響骨髓造血機能等）、荷爾蒙不足（如紅血球生成素、甲狀腺素、雄性素等）及惡性腫瘤。紅血球破壞增加可能是因為先天性或後天性溶血。失血過多的原因包括月經、腸胃道出血、吐血、血尿等，另外接受過胃腸道外科手術的癌症病人也可能出現鐵吸收不良狀況，使得癌症病人更容易發生貧血。

三、自我照顧注意事項

（一）飲食方面：

1. 貧血的日常保健可多攝取含鐵、葉酸及蛋白質的食物，如紅肉（牛肉、瘦肉）、綠色蔬菜（紅莧菜、甜碗豆、茼蒿、菠菜）、豆類、堅果類、穀類、蛋及魚。
2. 含鐵質食物，建議以動物性食物為優先，因其吸收與利用為植物性鐵質的3倍，維生素C亦能促進身體對植物性食物的鐵質吸收。
3. 素食者由於蔬菜內鐵質較不易吸收，建議可多食用蘋果、葡萄、深色蔬菜及穀物類，以改善貧血的情形。
4. 避免進餐時與餐後喝茶或咖啡，因為茶與咖啡裡的單寧酸會與鐵結合，妨礙鐵質吸收，建議間隔2小時後再行飲用。

5. 牛奶或起司裡的鈣與磷酸鹽，也會妨礙鐵的吸收，如果想多攝取鈣和鐵，最好錯開食用。

- (二) 藥物方面：在使用任何藥物均應經醫師或藥師評估，因部份藥物會影響骨髓造血機能，如止痛藥、抗癲癇藥及磺胺類藥等，如有需要使用藥物，可在醫師指示下注射紅血球生成素，服用鐵劑、葉酸及維生素B12。另服用鐵劑時須特別注意，勿與乳製品、茶或咖啡及其他藥物併服，以免影響鐵質吸收。
- (三) 運動：採取適當的有氧運動（如快走），每次至少 30 分鐘、每週至少 3~5 天，運動前後各暖身 5 分鐘，但應避免劇烈運動、熬夜及過度勞累，應有充分的休息，以避免大量體力與養分的消耗，若貧血太嚴重則不適合進行運動。在改變姿勢應緩慢，如從椅子上起身或起床時，應採漸進式活動，可先在床緣坐 5~10 分鐘，且最好有人陪伴，以避免因頭暈及昏厥，而發生跌倒。
- (四) 減少過度社交活動：儘量減少過多的社交活動或進出公共場所。
- (五) 注意口腔、皮膚、肛門黏膜完整性：避免用手挖鼻孔，應使用軟質牙刷刷牙，保持排便順暢，以避免造成鼻腔、牙齦、肛門處出血，影響病情變化。
- (六) 若有嚴重心悸、胸悶、暈眩或步行時有呼吸喘等情形，應立即就醫求治。

參考資料

- Michael, A., Robert, T. M., & Jennifer, S. T. (2024). Treatment of iron deficiency anemia in adults. *UpToDate*. Retrieved June 21, 2024, from https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-iron-deficiency-anemia-in-adults?search=treatment%20of%20anemia%20in%20adults&source=search_result&selectedTitle=1%7E150&usage_type=default&display_rank=1
- Reed, E. D., Robert, T. M., & Jennifer, S. T. (2024). Causes of anemia in patients with cancer. *UpToDate*. Retrieved November 03, 2024, from



https://www.uptodate.com/contents/causes-of-anemia-in-patients-with-cancer?search=treatment%20of%20anemia%20in%20adults%20with%20chemotherapy&source=search_result&selectedTitle=2%7E150&usage_type=default&display_rank=2

護理指導評值

◎是非題

1. () 貧血的日常保健可多攝取含鐵、葉酸及蛋白質的食物。
2. () 當有貧血症狀時，不應使用牙線或牙籤清潔口腔。
3. () 當有貧血症狀時，可以從椅子上直接起身。

◎選擇題

4. () 下列關於紅血球減少時運動注意事項之敘述，何者正確？
(1)每次至少30分鐘；(2)每週至少3-5天；(3)避免劇烈運動；
(4)以上皆是。
5. () 當服用鐵劑時應避免與下列何者食物併服，以免影響鐵質吸收？
(1)乳製品；(2)茶；(3)咖啡；(4)以上皆是。
6. () 下列何者為紅血球減少的症狀？
(1)步行時呼吸喘；(2)心悸；(3)暈眩；(4)以上皆是。

(答對 5-6 題⇒完全了解；答對 3-4 題⇒部分了解；答對 1-2 題⇒完全不瞭解)

1.(O) 2.(O) 3.(X) 4.(4) 5.(4) 6.(4)

三軍總醫院 護理部 編印
血液腫瘤科

諮詢電話：(02)87927056