

## 化學治療引起之副作用—噁心、嘔吐、食慾不振

### 一、化療造成噁心、嘔吐、食慾不振的機轉

人體腸胃道細胞有快速分裂的特性，因此易受化學藥物影響而產生噁心、嘔吐的症狀；此外，腫瘤細胞受到破壞後的代謝產物，也會抑制腦中的饑餓中樞，進而影響食慾。



### 二、噁心、嘔吐、食慾不振的注意事項

- (一) 若出現噁心、嘔吐情形，請記錄時間、量、性質與次數，以提供醫師進行醫療處置之參考。
- (二) 可依個人喜好選擇食物，不要勉強進食，一旦出現嘔吐情形，可用開水、茶葉水或檸檬水漱口及口含冰塊，使口腔舒適清新，減緩噁心嘔吐不適感。
- (三) 採少量多餐、選擇高熱量食物，如冰淇淋、蛋糕及起司，增加熱量攝取。
- (四) 化療結束後選擇清淡易消化的食物，如蘇打餅乾、白吐司等，以減緩不適感。
- (五) 嚴重嘔吐容易造成電解質不平衡，可給等滲透的運動飲料補充水分及電解質，並攝取含鉀成分高的食物，如香蕉、葡萄乾、柳橙汁等。若為洗腎病人則需與醫師討論。
- (六) 可使用酸性口感的水果、飲料或調味料，如檸檬、奇異果、柑橘類等水果、酸梅汁或烏醋等，以減輕噁心嘔吐情形，亦可促進食慾。
- (七) 若持續食慾不振，可與營養師討論飲食選擇的方向，或依醫師建議採用其他營養供給方式，如鼻胃管灌食或靜脈營養製劑。
- (八) 如您曾在化學治療期間有噁心或嘔吐，請避免在治療前、後1小時內進食，並於嘔吐時協助病人頭轉一側或採側臥，避免吸入性肺炎。
- (九) 保持室內空氣流通，避免異味引發噁心、嘔吐感。
- (十) 可按壓相關穴位以降低噁心感，如內關穴（手腕橫紋下三指幅處）、足三里（外膝下四指、旁開脛骨一吋），按壓5秒放1秒，至症狀緩解。
- (十一) 化學治療期間，可下床活動，有助於改善噁心、嘔吐、食慾不振之症狀。
- (十二) 化學治療前進行按摩、肌肉放鬆、冥想、看電視或聆聽喜歡的音樂，

三軍總醫院 護理部 編印  
血液腫瘤科

諮詢電話：(02) 87927056

以達到放鬆及轉移注意力之目的，進而降低噁心、嘔吐的感覺。

(十三) 若前次化學治療後或此次化學治療注射期間噁心、嘔吐感無法獲得改善，請告知醫護人員，以提供或調整您止吐劑的用法，以改善您的不適。

### 參考資料

林美良、林佳靜、張鶴齡、羅琦、馮清淳、鄭春秋 (2021)・贅生性疾病之護理・於劉雪娥總校閱，*成人內外科護理上冊* (八版，641-713 頁)・華杏。

Hesketh, P. J. (2024). Prevention and treatment of chemotherapy-induced nausea and vomiting in adults. *UpToDate*. Retrieved May, 2024, from [https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-chemotherapy-induced-nausea-and-vomiting-in-adults?search=Prevention%20and%20treatment%20of%20chemotherapy-induced%20nausea%20and%20vomiting%20in%20adults&source=search\\_result&selectedTitle=1%7E89&usage\\_type=default&display\\_rank=1](https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-chemotherapy-induced-nausea-and-vomiting-in-adults?search=Prevention%20and%20treatment%20of%20chemotherapy-induced%20nausea%20and%20vomiting%20in%20adults&source=search_result&selectedTitle=1%7E89&usage_type=default&display_rank=1)

### 護理指導評值

#### ◎是非題

1. ( ) 在化學治療注射期間有噁心或嘔吐，請避免在治療前、後 1 小時內進食。
2. ( ) 化學治療期間，儘量避免下床活動，有助於改善噁心、嘔吐、食慾不振之症狀。
3. ( ) 採少量多餐、選擇高熱量食物以增加熱量攝取，如冰淇淋、蛋糕及起司。

#### ◎選擇題

4. ( ) 化療期間食物選擇宜採何種，較能促進食慾？  
(1)重口味；(2)辛辣食物；(3)酸性食物或調味料，如檸檬、奇異果、柑橘類等；(4)以上皆是。
5. ( ) 於化學治療前可以做些甚麼，以達到放鬆目的，降低噁心、嘔吐的感覺？  
(1)按摩、肌肉放鬆；(2)冥想；(3)聽喜歡的音樂、看電視；(4)以上皆是。
6. ( ) 若前次化學治療後或此次化學治療注射期間噁心、嘔吐感無法獲得改善應告知醫護人員，提供或調整您的止吐劑，以改善您的不適？  
(1)是；(2)否，自行吃點胃藥即可。

三軍總醫院 護理部 編 印  
血液腫瘤科

諮詢電話：(02) 87927056



(答對 5-6 題⇒完全了解；答對 3-4 題⇒部分了解；答對 1-2 題⇒完全不瞭解)

1. (O) 2. (X) 3. (O) 1. (3) 2. (4) 3. (1)

三軍總醫院 護理部 編 印  
血液腫瘤科

諮詢電話：(02) 87927056