

化學治療引起之副作用—腹瀉

一、腹瀉的原因

化學治療藥物刺激腸胃道黏膜細胞或造成腸道吸收分泌功能失調而導致腹瀉，其症狀為排便次數增加、糞便質地變稀，並伴隨過度脹氣、腸痙攣。嚴重腹瀉可能導致急性腎損傷和電解質不平衡；而腸黏膜破裂可導致感染，在化療引起的免疫抑制情況下，容易發生危及生命的敗血症，進而導致化學治療延遲或停止。

二、預防及注意事項

- (一) 急性腹瀉時，進食方式儘量採清流質飲食或補充運動飲料，避免腹瀉造成脫水與電解質不平衡，當腹瀉情形改善後，可以慢慢地增加一些低纖維、蛋白的食物，如稀飯、香蕉、蘋果、白土司、無皮馬鈴薯或去皮雞肉、魚類等食物。
- (二) 化療引起的腹瀉應避免的食物，如高纖維和高脂肪食物、黑棗汁、柳橙汁。避免食用刺激性或易產氣的食物，如含咖啡因的產品、碳酸飲料、豆類、油炸或辛辣的食物等，以免刺激胃腸道造成蠕動加劇。
- (三) 應當避免酒精，因為易引起脫水情形。
- (四) 乳糖難以消化易加重腹瀉現象，腹瀉期間應避免食用含乳糖製品，如牛奶、乳酪、冰淇淋、蛋糕、起司等。
- (五) 若嚴重腹瀉，可請營養師評估，調整適當飲食或補充營養品。
- (六) 停用可能引起腹瀉的藥物和補品，如大便軟化劑、瀉藥、蘆薈、西伯利亞參、車前子、輔酶 Q10 及高劑量的維生素 C 和綠茶。
- (七) 化療期間出現急性腹瀉也可能為器質性腹瀉，如細菌過度生長、脂肪或膽汁吸收不良、攝入過量乳糖不耐症，以及炎症和感染性原因，若有出現腹瀉現象持續超過一天、頭暈不適、發燒超過 38°C 含以上、腹部絞痛、噁心或嘔吐、血便，影響日常活動，請立即就醫並告知看診醫師，目前化學治療進度。

參考資料

Kamath, S., & Nair, K. G. (2024). Clinical presentation and risk factors for chemotherapy-associated diarrhea, constipation, and intestinal perforation. *UpToDate*. Retrieved April 18, 2024, from <https://www-uptodate-com>.



mhdla.flysheet.com.tw:8443/contents/clinical-presentation-and-risk-factors-for-chemotherapy-associated-diarrhea-constipation-and-intestinal-perforation

Macaron, C. (2022). Management of acute chemotherapy-related diarrhea. *UpToDate*. Retrieved April 18, 2024, from <https://www-uptodate-com.mhdla.flysheet.com.tw:8443/contents/management-of-acute-chemotherapy-related-diarrhea>

護理指導評值

◎是非題

1. () 急性腹瀉時不能吃東西，但可以喝安素，增加一天熱量攝取。
2. () 避免食用刺激性或易產氣的食物，如咖啡因、碳酸飲料、豆類、油炸或辛辣的食物。
3. () 腹瀉時可以吃高纖維質及高脂肪的食物。

◎選擇題

4. () 腹瀉後護理應注意？
(1)避免乳製品；(2)清流質；(3)避免高脂肪的食物；(4)以上皆是
 5. () 當您有下列哪些症狀發生時，必須來院就診？
(1)發燒；(2)腹絞痛；(3)水瀉不止；(4)以上皆是
 6. () 當急性腹瀉時，您必須避免哪些食物？
(1)蛋糕；(2)牛奶；(3)高纖餅乾；(4)以上皆是
- (答對 5-6 題⇒完全了解；答對 3-4 題⇒部分了解；答對 1-2 題⇒完全不瞭解)

1.(X) 2.(O) 3.(X) 4.(4) 5.(4) 6.(4)

三軍總醫院 護理部 編印
血液腫瘤科

諮詢電話：(02)87927056