

化學治療引起的周邊神經病變照顧

化學治療引起的周邊神經病變是一種癌症治療的常見副作用，某些化療藥物會直接破壞周邊神經軸突的代謝，使感覺和運動神經元受到傷害而產生感覺和運動異常，當發生周邊神經病變時，往往得將化療藥物劑量調降甚至停藥，導致療程必須延遲或中斷，在化療完成後可能持續數月甚至數年，嚴重降低病人的生活品質。

一、周邊神經病變的發生率

整體來說發生率約 19~85% 不等，但在使用某些化療藥物發生率會較高，如鉑類藥物（70~100%）、紫杉醇類（11~87%）、免疫抑制劑（20~60%）和長春花生物鹼類的藥物。

二、周邊神經病變會有的症狀

周邊神經病變常見於手和腳，其特徵是皮膚感覺異常之症狀，並且通常表現為典型“手套和長襪”神經病變，四肢最遠端部分表現出最大的缺陷。症狀包括麻木、刺痛、神經性疼痛、觸覺改變、灼熱感、手腳對溫度或疼痛的感覺變遲鈍或喪失，容易燙傷或凍傷。此外，亦會產生疼痛感，包括自發性灼燒或電擊樣疼痛以及機械或熱異常性疼痛或痛覺過敏等，在嚴重的情況下，這些症狀會發展為感覺知覺喪失，運動時常發現手腳力量下降、步態和平衡障礙以及運動障礙。因為持續未緩解的症狀會干擾日常生活活動，並可能影響病人的情緒健康和生活品質。

三、周邊神經病變症狀處理

當您出現這些症狀時，應告知醫護人員，醫師會評估您的症狀調整化療藥物的劑量，若調整劑量後症狀未改善，可能需停止使用並更換其它類的化療藥物。醫師亦會依您的症狀給予類固醇、抗痙攣、抗憂鬱或其它症狀治療的藥物。

四、周邊神經病變症狀的保健

由於無法預防這些症狀的出現，但可採取一些措施減緩症狀，說明如下：

三軍總醫院 護理部 編 印
血液腫瘤科

諮詢電話：(02) 87927056

- (一) 化學治療前後多補充富含維他命 B、E、鈣及鎂的食物，如蔬菜水果等。
- (二) 施打容易造成周邊神經病變症狀的藥物前，使用冰手套及冰腳套，讓血管收縮減少化療藥物對局部的作用。
- (三) 避免喝酒以減少對神經細胞的傷害。
- (四) 如您有糖尿病，必須控制血糖。
- (五) 綜合研究指出於化療開始時或化療後 24 小時，每天補充 30 克麩醯胺酸可用來預防或改善，但可能會影響果糖代謝，使得氨值提高，因此如有使用需要，應先與醫師討論。
- (六) 由於周邊神經病變會影響到您的感覺，因此需注意末梢肢體保暖、避免燙傷及活動安全，若手指變得麻木，應避免拿尖銳、過燙或其它危險物品。
- (七) 由於周邊神經病變可能會影響到您的活動、平衡感或肌肉力量，若受到影響時，務必要有人在旁陪伴，穿著防滑鞋子，使用扶手或助行器，並在浴室地板鋪設防滑墊，以預防傷害。

參考資料

Bae, E. H., Greenwald, M. K., & Schwartz, A. G. (2021).

Chemotherapy-Induced Peripheral Neuropathy: Mechanisms and Therapeutic Avenues. *Neurotherapeutics : The Journal of the American Society for Experimental NeuroTherapeutics*, 18(4), 2384–2396.

<https://doi.org/10.1007/s13311-021-01142-2>.

Chen, X., Gan, Y., Au, N. P. B., & Ma, C. H. E. (2024). Current understanding of the molecular mechanisms of chemotherapy-induced peripheral neuropathy. *Frontiers in Molecular Neuroscience*, 17, 1345811.

<https://doi.org/10.3389/fnmol.2024.1345811>

Van Haren, F. G. A. M., Steegers, M. A. H., Vissers, K. C. P., & Van Den Heuvel, S. A. S. (2024). A qualitative evaluation of the oncologists',

neurologists', and pain specialists' views on the management and care of chemotherapy-induced peripheral neuropathy in The Netherlands.

Supportive Care in Cancer, 32(5), 301-301.

<https://doi.org/10.1007/s00520-024-08493-4>

護理指導評值

◎是非題

1. () 手腳麻木、刺痛感是化療後的周邊神經病變的症狀？
2. () 周邊神經病變可能會影響到您的活動，應注意避免跌倒？
3. () 周邊神經病變可能會影響到您的肢體感覺，應注意避免燙傷？

◎選擇題

4. () 當我出現化療後周邊神經病變時，我該怎麼辦？
(1)不要理會；(2)主動跟醫師討論；(3)民俗療法。
5. () 化學治療前後可多補充的食物有哪些？
(1)富含維他命 B、E 等蔬菜水果；(2)含鈣及鎂的食物；(3)以上皆是。
6. () 周邊神經病變易造成跌倒，下列何者可預防跌倒？
(1)穿著防滑鞋子；(2)在浴室地板鋪防滑墊；(3)以上皆是。

(答對 5-6 題⇒完全了解；答對 3-4 題⇒部分了解；答對 1-2 題⇒完全不瞭解)

1.(0) 2.(0) 3.(0) 4.(2) 5.(3) 6.(3)

三軍總醫院 護理部 編 印
血液腫瘤科

諮詢電話：(02) 87927056