

化學治療引起的過敏症狀照顧

一、藥物過敏反應簡介

發生全身性過敏反應以抗生素為最多（42.4%），其次為中樞神經用藥（19.7%）及抗腫瘤藥物（12.1%）。藥物過敏的反應可能影響多種器官，因而臨床上具有不同表現。皮膚症狀是藥物過敏最常見之臨床表現，同時也是藥物過敏診斷最強的線索之一。局部給藥、靜脈注射或肌肉注射造成過敏率皆大於口服給藥途徑，且靜脈注射給藥較易造成相對嚴重之過敏。

二、化學治療引起的過敏的症狀

過敏反應可能發生在施打化學藥物數分或數秒後，輕則皮膚突然出現蕁麻疹、臉潮紅、發熱、紅疹、皮膚搔癢、皮疹，嚴重時有可能胸部疼痛、呼吸困難、心跳加速、意識改變、躁動不安、發燒、頭暈、嘔吐、支氣管痙攣、眼瞼水腫及低血壓等，嚴重者甚至會危及生命安全。

三、化學治療引起的過敏症狀處置及照護

於化學治療期間出現過敏症狀請立即通知醫護人員處理，醫護人員會立即停止藥物的注射，並依醫囑給予藥物治療。除此之外，請您在每次就醫時告知醫護人員，您曾經有施打化療藥品過敏的狀況，以及藥名和症狀出現的特徵與時間，由醫師決定是否該繼續使用藥物或停止使用，以避免打同類的藥物造成更嚴重的副作用，保障您的用藥安全。

參考資料

于博芮、胡文郁、胡月娟、周守民、黃翠媛、吳韻淑、羅筱芬、簡淑慧、鄭春秋、柳秋芳、陳麗糸、劉向援、郭素娥、劉桂芬、鄭麗珠、王雪娥、涂秀妮、陳怡如、林金絲、……李惠玲（2020）。贅生性疾病之護理。於胡月娟總校閱。《內外科護理學上冊》（八版，641-713頁）。華杏。

林慧娟、陳佳南、陳俊銘、賴輝雄（2019）。藥物過敏與潛在危險因子之分析與探討。《臺灣臨床藥學雜誌》，27（4），281-288。<https://doi.org/10.6168/>

三軍總醫院 護理部 編印
血液腫瘤科

諮詢電話：（02）87927056

FJCP.201910_27(4).0004

Mariana, C., C., Ursula, A., M., & Terzah, M., H. (2024). Infusion reactions to systemic chemotherapy. *UpToDate*. Retrieved April 30, 2024, from https://www.uptodate.com/contents/infusion-reactions-to-systemic-chemotherapy?search=Infusion%20reactions%20to%20systemic%20chemotherapy&source=search_result&selectedTitle=1%7E150&usage_type=default&display_rank=1

護理指導評值

◎是非題

1. () 皮膚症狀是化學治療過敏症狀最常見之臨床表現？
2. () 施打化療藥品時曾有過敏的狀況，之後施打同類的藥物仍可能有過敏反應？
3. () 過敏反應會出現在施打化學藥物數分或數秒出現？

◎選擇題

4. () 下列何者是過敏症狀？
1.發燒；2.紅疹；3.皮膚搔癢；4.以上皆是
5. () 於化學治療期間出現哪些疑似過敏反應需立即告知醫護人員？
1.心跳加速；2.呼吸困難；3.皮膚搔癢；4.以上皆是
6. () 執行化療藥物治療前為預防過敏反應發生，須請配合如何處理？
1.配合化療前抗過敏藥物使用；2.主動告知曾有施打化療藥物過敏情形；3.以上皆非；4.以上皆是

(答對 5-6 題⇒完全了解；答對 3-4 題⇒部分了解；答對 1-2 題⇒完全不瞭解)

1. (O) 2. (O) 3. (O) 4. (4) 5. (4) 6. (4)

三軍總醫院 護理部 編印
血液腫瘤科

諮詢電話：(02) 87927056