

化學治療引起的紅疹症狀照顧

一、發生紅疹的原因

化療引起紅疹的原因尚不明確，有兩個可能的因素，一個是病人本身的過敏反應，另一個是化療藥品本身的毒性，導致皮膚上產生異常反應。而有些疾病，如肝病、腎臟疾病、紅斑性狼瘡等，病人在打化療藥品時特別容易發生皮膚紅疹的症狀。

二、發生紅疹皮膚的變化

施打化學治療後，常在開始治療一週內出現紅疹，最晚可能延至6週才出現。皮膚會出現丘疹（一粒粒小小的紅色凸起，像痱子）、膿皰（像青春痘）、發紅隆起的皮疹（像蕁麻疹）或一整片的發紅。而發生紅疹的部位對於冷熱感覺會變得較為敏感，常發生在頭部、臉部、頸部、胸部、背部和四肢，有時會伴隨著乾燥、搔癢及疼痛等症狀，其嚴重程度與化療劑量有關。

三、可能引起皮膚紅疹的化療藥物

Azacitidine（委丹扎）、Bendamustine（普癌汰）、Busulfan（補束剋）、Cetuximab（爾必得舒）、Cytarabine（賽德薩）、Fludarabine（福達樂）、Fluorouracil（5-Fu，好復）、Gemcitabine（健擇）、Liposomal doxorubicin（立得微脂體）、Methotrexate(MTX)（滅殺除癌）、Panitumumab（維必施）、Pemetrexed（愛寧達）、Pertuzumab（賀疾妥）、Trastuzumab Emtansine（賀癌寧）。

四、發生紅疹時的照顧

（一）穿寬鬆、柔軟棉質及吸汗材質的衣服，以增加皮膚舒適性。

（二）洗澡的建議

1. 可使用溫水洗澡，避免浸泡於過熱的水（溫泉、泡湯），因為過熱的水會使皮膚油脂流失。若是您屬於乾燥皮膚，建議洗澡後可使用不含香料及酒精的保濕乳液適量塗抹全身。
2. 使用中性，無添加香精或香料的肥皂或沐浴乳清洗身體，但對於乾燥、脫屑及敏感性的部位不要使用清潔用品，建議只用溫水清洗，清洗後請用輕輕拍拭的方式，勿用力來回搓揉，以免造成皮膚傷害。
3. 沐浴後乾燥皮膚可使用不含香料、酒精，低敏性的保濕乳液適量塗抹。



- (三) 採取適當的防曬措施，避免陽光直接暴曬，可戴帽子、穿著長袖衣褲或使用 SPF ≥ 30 之防曬乳液保護皮膚，因為紫外線照射可能會加重症狀。
- (四) 若發生紅疹情況，勿自行塗抹藥膏。一般而言，紅疹會在停止化學治療後痊癒。若發生嚴重膿皰疹，可在就診時告知醫師部位與狀況，醫師依據狀況開立外用藥膏（含有類固醇或抗生素成分）及口服抗生素短期使用，避免自行使用一般痤瘡常見用藥，如酸類或含酒精成份產品，造成皮膚的刺激。
- (五) 若正在執行化療療程，而紅疹及膿胞在用藥後仍未改善，或是症狀持續惡化，醫師將會適當調整化學藥物的劑量或改用其他化療藥物。

參考資料

- Maheshwari, A., Shankar, A., Tyagi, K., & Verma, R. (2022). Dermatological aspects of nursing oncology: Meaningful observations ensuring better quality of life. *Indian Journal of Palliative Care*, 28(2), 216-220. https://doi.org/10.25259/IJPC_2021
- Yuan, C., & Wang, B. (2023). Acneiform eruption induced by molecularly targeted agents in antineoplastic therapy: A review. *Journal of Cosmetic Dermatology*, 22(8), 2150-2157. <https://doi.org/10.1111/jocd.15704>

護理指導評值

◎是非題

1. () 化療藥物本身的毒性可能引發紅疹。
2. () 發生紅疹時需穿緊身、柔軟的服裝。
3. () 紅疹發生時可能伴隨搔癢症狀。

◎選擇題

4. () 發生紅疹時，應如何照護？(1)避免陽光直接暴曬；(2)穿著長袖衣褲保護皮膚；(3)擦防曬乳液；(4)以上皆是。
 5. () 清洗乾燥或有脫屑的皮膚，以下何者為「非」？(1)用溫水清洗；(2)脫屑的皮膚要使用肥皂清洗才乾淨；(3)用輕輕拍拭的方式。
 6. () 有關處理化療引起紅疹的敘述，下列何者為是？(1)停止化學治療後可能會痊癒；(2)若是持續惡化務必告知醫師以評估是否需調整化學藥物的劑量；(3)勿使用太熱或太冷的水洗澡；(4)以上皆是。
- (答對 5-6 題⇒完全了解；答對 3-4 題⇒部分了解；答對 1-2 題⇒完全不瞭解)

1.(O) 2.(X) 3.(O) 4.(4) 5.(2) 6.(4)