

## Chapter 10: 独立随机变量

Latest Update: 2025 年 1 月 1 日

**Exercise #10. 1.** 设  $f = (f_1, f_2) : \Omega \rightarrow E \times F$ . 证明  $f : (\Omega, \mathcal{A}) \rightarrow (E \times F, \mathcal{E} \otimes \mathcal{F})$  是可测的, 当且仅当,  $f_1 : (\Omega, \mathcal{A}) \rightarrow (E, \mathcal{E})$  是可测的, 以及  $f_2 : (\Omega, \mathcal{A}) \rightarrow (F, \mathcal{F})$  是可测的.

证明.  $\Rightarrow$ : 设  $f : (\Omega, \mathcal{A}) \rightarrow (E \times F, \mathcal{E} \otimes \mathcal{F})$  是可测的, 则  $\forall A \times B \in \mathcal{E} \otimes \mathcal{F}$ , 有  $f^{-1}(A \times B) \in \mathcal{A}$ . 记  $\pi_E, \pi_F$  分别是向  $E, F$  的投影算子, 即  $\pi_E : E \times F \rightarrow E, \pi_F : E \times F \rightarrow F$ , 则有  $f_1 = \pi_E \circ f, f_2 = \pi_F \circ f$ , 则

$$\begin{aligned} f_1^{-1}(A) &= f^{-1} \circ \pi_E^{-1}(A) = f^{-1}(A \times \mathcal{F}) \in \mathcal{A}, \\ f_2^{-1}(B) &= f^{-1} \circ \pi_F^{-1}(B) = f^{-1}(\mathcal{E} \times B) \in \mathcal{A}, \end{aligned}$$

从而  $f_1, f_2$  是可测的.

$\Leftarrow$ : 设  $f_1 : (\Omega, \mathcal{A}) \rightarrow (E, \mathcal{E})$  是可测的, 以及  $f_2 : (\Omega, \mathcal{A}) \rightarrow (F, \mathcal{F})$  是可测的, 则  $\forall A \in \mathcal{E}, B \in \mathcal{F}$ , 有  $f_1^{-1}(A) \in \mathcal{A}, f_2^{-1}(B) \in \mathcal{A}$ . 于是对  $A \times B$ , 有  $f^{-1}(A \times B) = f_1^{-1}(A) \cap f_2^{-1}(B) \in \mathcal{A}$ , 从而  $f$  是可测的.  $\square$

**Exercise #10. 2.** 设  $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ , 设  $\mathcal{B}^2$  表示  $\mathbb{R}^2$  上的 Borel 集合族.  $\mathcal{B}$  表示  $\mathbb{R}$  上的 Borel 集合族. 证明:  $\mathcal{B}^2 = \mathcal{B} \otimes \mathcal{B}$ .

证明. 根据定义, 以及  $\mathbb{R}^n$  有可数拓扑基, 有

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma\{A \times B : A, B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})\}, \quad \mathcal{B}(\mathbb{R}^2) = \sigma\{(a, b) \times (a, d), a, b, c, d \in \mathbb{R}\}.$$

显然,  $(a, b) \times (a, d) \subset \mathcal{B}(\mathbb{R}) \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R})$ , 根据定义,  $\mathcal{B}(\mathbb{R}^2) \subset \mathcal{B}(\mathbb{R}) \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R})$ .

设

$$\mathcal{F} = \{A \mid A \times \mathbb{R} \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^2)\},$$

可见所有开区间落在  $\mathcal{F}$  中, 且  $\mathcal{F}$  是  $\sigma$  代数, 因此  $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subset \mathcal{F}$ . 于是  $\forall A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}), A \times \mathbb{R} \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$ . 同样的方法可以说明:  $\forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}), \mathbb{R} \times B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$ . 于是

$$A \times B = (A \times \mathbb{R}) \cap (\mathbb{R} \times B) \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^2).$$

这表明  $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R}) \subset \mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$ .  $\square$

**Exercise #10. 3.** 设  $\Omega = [0, 1]$ ,  $\mathcal{A}$  是  $[0, 1]$  上的 Borel 集,  $P(A) = \int \mathbb{I}_A(x) dx, A \in \mathcal{A}$ . 设  $X(x) = x$ , 证明  $X$  服从均匀分布.

证明. 定理 7.1 和 7.2 保证了分布函数和概率测度之间的一一对应关系. 下面求  $X$  的分布函数  $F(x)$ .

$$\begin{aligned} F(x) &= P\{X^{-1}((-\infty, x])\} \quad (\text{定义}) \\ &= P((-\infty, x] \cap [0, 1]) \quad (\text{随机变量 } X \text{ 的定义}) \\ &= \begin{cases} 0, & x < 0, \\ x, & 0 \leq x \leq 1, \\ 1, & x > 1. \end{cases} \end{aligned}$$

$F(x)$  是  $X$  的分布函数, 从而  $X$  服从均匀分布  $Unif[0, 1]$ . □

**Exercise #10. 4.** 设  $\Omega = \mathbb{R}, \mathcal{A} = \mathcal{B}$ . 设  $P(A) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int \mathbb{I}_A(x) e^{-\frac{x^2}{2}} dx$ . 令  $X(x) = x$ . 证明:  $X$  服从标准正态分布.

证明.  $X : (\mathbb{R}, \mathcal{B}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B})$ .  $X$  诱导的分布函数是

$$F(x) = P\{X^{-1}((-\infty, x])\} = P((-\infty, x]) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt.$$

是标准正态分布的分布函数, 因此  $X$  服从标准正态分布. □

**Exercise #10. 5.** 构造一个例子证明  $\mathbb{E}\{XY\} = \mathbb{E}\{X\}\mathbb{E}\{Y\}$  一般来说不能推出  $X, Y$  是独立的. (不妨假设  $X, Y, XY \in L^1$ .)

证明. 考虑离散型随机变量  $X$  满足  $P(X = 0) = P(X = 1) = P(X = -1) = \frac{1}{3}, Y = X^2$ .

表 1:  $X$  和  $Y$  的联合分布列

$Y \backslash X$	-1	0	1	
0	0	$\frac{1}{3}$	0	$\frac{1}{3}$
1	$\frac{1}{3}$	0	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$
	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	

有  $E(X) = 0, EY = \frac{2}{3}, EXY = 0 = EXEY$ , 但是  $X, Y$  不独立, 比如

$$0 = P(X = -1, Y = 0) \neq P(X = -1)P(Y = 0) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{9}.$$

□

**Exercise #10. 6.** 设  $X, Y$  是独立的随机变量, 它们在  $\mathbb{N}$  中取值, 满足

$$P(X = i) = P(Y = i) = \frac{1}{2^i} \quad (i = 1, 2, \dots).$$

求出以下的概率:

a)  $P(\min(X, Y) \leq i)$

b)  $P(X = Y)$

c)  $P(Y > X)$

d)  $P(X \text{ 整除 } Y)$

e)  $P(X \geq kY)$

证明.  $X, Y$  独立同分布.

$$P(X > i) = \sum_{k=i+1}^{\infty} P(X = k) = \sum_{k=i+1}^{\infty} \frac{1}{2^k} = \frac{1}{2^i}.$$

a)  $P(\min(X, Y) \leq i) = 1 - P(\min(X, Y) > i) = 1 - P(X > i, Y > i) = 1 - P(X > i)P(Y > i) = 1 - \frac{1}{2^i} \cdot \frac{1}{2^i} = 1 - \frac{1}{4^i}.$

b)  $P(X = Y) = \sum_{i=1}^{\infty} P(X = i, Y = i) = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{2^i} \cdot \frac{1}{2^i} = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{4^i} = \frac{1}{3}.$

c)  $P(Y > X) = \sum_{i=1}^{\infty} P(Y > i)P(X = i) = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{2^i} \cdot \frac{1}{2^i} = \frac{1}{3}.$

d)  $P(X \text{ 整除 } Y) = \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} P(X = i, Y = ni) = \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^i} \cdot \frac{1}{2^{in}} = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{2^i(2^i - 1)}.$

e)  $P(X \geq kY) = \sum_{i=1}^{\infty} P(X \geq ki, Y = i) = \sum_{i=1}^{\infty} P(X > ki - 1)P(Y = i) = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{2^{ki-1}} \cdot \frac{1}{2^i} = 2 \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{2^{(k+1)i}} = \frac{2}{2^{k+1} - 1}.$

□

**Exercise #10. 7.** 设  $X, Y$  是独立的几何随机变量, 参数分别是  $\lambda$  和  $\mu$ . 设  $Z = \min(X, Y)$ . 证明  $Z$  服从几何分布随机变量, 求出它的参数.

证明. 由于  $X \sim \text{Geom}(\lambda), Y \sim \text{Geom}(\mu)$ , 从而  $X$  和  $Y$  的 pmf 分别是

$$p_X(x) = \lambda(1-\lambda)^{x-1}, \quad p_Y(y) = \mu(1-\mu)^{y-1}.$$

几何分布的尾概率是 ( $x-1$  次没有成功的概率):

$$P(X \geq x) = \sum_{k=x}^{\infty} p_X(k) = \lambda \sum_{k=x}^{\infty} (1-\lambda)^{k-1} = \lambda \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{(1-\lambda)^{x-1}(1-(1-\lambda)^k)}{1-(1-\lambda)} = (1-\lambda)^{x-1}.$$

考察  $Z = \min(X, Y)$  的分布:

$$\begin{aligned} P(Z \geq z) &= P(\min(X, Y) \geq z) \\ &= P(X \geq z, Y \geq z) \\ &= P(X \geq z)P(Y \geq z) \quad (\text{独立性}) \\ &= (1-\lambda-\mu+\lambda\mu)^{z-1}. \end{aligned}$$

于是,  $P(Z = z) = P(Z \geq z) - P(Z \geq z+1) = (1-\lambda-\mu+\lambda\mu)^{z-1}(\lambda+\mu-\lambda\mu)$ . 因此, 服从参数为  $\lambda+\mu-\lambda\mu$  的几何分布.

若按照教材 P31, 4) 参数化的方法得到的参数是  $\mu\lambda$ . □

**Exercise #10. 8.** 设  $X, Y \in L^2$ . 定义  $X$  和  $Y$  的协方差是

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}\{(X - \mu)(Y - \nu)\}$$

其中  $\mathbb{E}X = \mu, \mathbb{E}Y = \nu$ . 证明:

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}\{XY\} - \mu\nu$$

并证明: 若  $X$  和  $Y$  独立,  $\text{Cov}(X, Y) = 0$ .

证明.

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X, Y) &= \mathbb{E}\{(X - \mu)(Y - \nu)\} \\ &= \mathbb{E}\{XY - X\nu - Y\mu + \mu\nu\} \\ &= \mathbb{E}\{XY\} - \nu\mathbb{E}X - \mu\mathbb{E}Y + \mu\nu \\ &= \mathbb{E}\{XY\} - \mu\nu. \end{aligned}$$

若  $X$  和  $Y$  独立, 则在定理 10.1 中, 取  $f = g = id$ , 有  $\mathbb{E}\{XY\} = \mathbb{E}X\mathbb{E}Y$ , 从而  $\text{Cov}(X, Y) = 0$ . □

**Exercise #10. 9.** 设  $X, Y \in L^1$ . 若  $X$  和  $Y$  是独立的, 证明:  $XY \in L^1$ . 给出例子说明当  $X$  和  $Y$  不独立时,  $XY \notin L^1$ .

证明.  $X, Y$  独立, 根据  $\mathbb{E}\{|X|\}, \mathbb{E}\{|Y|\} < \infty$ , 有  $\mathbb{E}\{|XY|\} = \mathbb{E}\{|X||Y|\} = \mathbb{E}\{|X|\}\mathbb{E}\{|Y|\} < \infty$ , 从而  $XY \in L^1$ .

为构造反例, 考察  $\Omega = (0, 1], \mathcal{A} = \mathcal{B}((0, 1]), P = \lambda|_{(0, 1]}$ , 其中  $\lambda$  是 Lebesgue 测度. 设  $X(\omega) = \omega^{-\frac{1}{2}}, Y = X$ , 有

$$\mathbb{E}X = \int X dP = \int_0^1 \omega^{-\frac{1}{2}} d\omega = 2 < \infty.$$

则  $X, Y \in L^1$ , 但是  $XY(w) = w^{-1}$  在  $(0, 1]$  上不可积. □

注. 为证明  $f(x) = \frac{1}{x}$  在  $(0, 1]$  上不可积, 考察  $\left(\frac{1}{k+1}, \frac{1}{k}\right)$ ,  $s_n := \sum_{k=1}^n k \chi_{I_k}$ , 有  $s_n \uparrow f$ . 由于,

$$\int_{(0,1]} s_n d\lambda = \sum_{k=1}^n \frac{k}{k} - \frac{k}{k+1} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k+1}.$$

于是,

$$\int_{(0,1]} s_{2n} d\lambda - \int_{(0,1]} s_n d\lambda = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k+1} \geq \frac{n}{2n+1} \geq \frac{1}{3}.$$

序列  $\{\int_{(0,1]} s_n d\lambda\}$  是严格增的, 这表明

$$\sup \left\{ \int_{(0,1]} s d\lambda, 0 \leq s \leq f, s \text{ 是简单函数} \right\} = \infty$$

即  $f$  不可积.

**Exercise #10.** 10. 设  $n$  是大于 2 的素数; 设  $X, Y$  是独立的  $\{0, 1, \dots, n-1\}$  上的 (离散) 均匀分布, 即  $P(X = i) = P(Y = i) = \frac{1}{n}, i = 0, 1, \dots, n-1$ . 对于  $0 \leq r \leq n-1$ , 定义  $Z_r = X + rY \pmod n$ .

a) 证明:  $Z_0, Z_1, \dots, Z_{n-1}$  是两两独立的.

b) 若  $n$  不再是素数, 结果是否正确?

注. 使用以下初等数论的结论. 设  $a, b$  是整数, 且  $a \not\equiv 0 \pmod m$ , 则称方程  $ax \equiv b \pmod m$  为 (一次) 同余方程.

1. 设  $a, b$  是整数, 且  $a \not\equiv 0 \pmod m$ , 则同余方程有解当且仅当  $(a, m) | b$ .

2. 进一步, 上述同余方程在模  $m$  下有  $(a, m)$  个不同的解.

证明. a) 当  $n$  是素数时, 往证  $Z_s \perp Z_t, s \neq t, s, t \in \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$ . 由于  $Z_s, Z_t$  可能的取值均为  $\{0, 1, 2, \dots, n-1\}$ , 先计算  $Z_s, Z_t$  的边缘分布, 当  $k \in \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$  时,

$$\begin{aligned} P(Z_s = k) &= P(X + sY = k \pmod n) \\ &= \sum_{i=0}^{n-1} P(Y = i) P(X = (k - is) \pmod n) \quad (X, Y \text{ 独立}) \\ &= \sum_{i=0}^{n-1} \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n} = \frac{1}{n}. \end{aligned}$$

同理,  $P(Z_t = k) = \frac{1}{n}, k \in \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$ .

接下来计算  $P(Z_s = k, Z_t = l)$ , 当  $k, l \in \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$  时,

$$\begin{aligned} P(Z_s = k, Z_t = l) &= P(X + sY = k \pmod n, X + tY = l \pmod n) \\ &= \sum_{i=0}^{n-1} P(Y = i) P(X = (k - is) \pmod n, X = (l - it) \pmod n). \end{aligned}$$

考察一次同余方程  $k - is = l - it \pmod n$ , 有  $(s - t)i = k - l \pmod n$ , 由于  $(s - t, n) = 1$ , 从而该方程有唯一解  $i_0 \in \{0, 1, 2, \dots, n - 1\}$ . 从而

$$P(Z_s = k, Z_t = l) = P(Y = i_0)P(X = k - i_0 s \pmod n) = \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n} = \frac{1}{n^2}.$$

于是  $Z_s, Z_t$  是独立的 ( $\forall k, l \in \{0, 1, 2, \dots, n - 1\}$ ).

b) 当  $n$  不再是素数时, 令  $n = 4$ ,  $X, Y$  是独立的  $\{0, 1, 2, 3\}$  上的均匀分布,

$$P(Z_0 = 0, Z_1 = 2) = P(X = 0, Y = 2) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{16},$$

但是

$$P(Z_0 = 0) = P(X = 0 \pmod 4) = P(X = 0) = \frac{1}{4},$$

$$P(Z_1 = 2) = P(X + Y = 2 \pmod 4) = P(X = 0, Y = 2) + P(X = 1, Y = 1) + P(X = 2, Y = 0) = \frac{3}{16}.$$

从而  $Z_0, Z_1$  不独立.

□

**Exercise #10. 11.** 设  $X$  和  $Y$  是独立的随机变量, 服从分布  $P(X = 1) = P(Y = 1) = \frac{1}{2}$ ,  $P(X = -1) = P(Y = -1) = \frac{1}{2}$ . 设  $Z = XY$ , 证明:  $X, Y, Z$  两两独立, 但不相互独立.

注. 这给出了一个两两独立但不相互独立的例子.

证明.  $Z$  的可能取值为  $\{-1, 1\}$ , 有

$$P(Z = 1) = P(X = 1, Y = 1) + P(X = -1, Y = -1) = \frac{1}{2},$$

$$P(Z = -1) = P(X = 1, Y = -1) + P(X = -1, Y = 1) = \frac{1}{2}.$$

已经知道了  $X, Y$  独立, 下面证明  $X, Z$  独立,  $Y, Z$  独立.

$$P(X = 1, Z = 1) = P(X = 1, Y = 1) = P(X = 1)P(Y = 1) = \frac{1}{4},$$

$$P(X = 1, Z = -1) = P(X = 1, Y = -1) = P(X = 1)P(Y = -1) = \frac{1}{4},$$

$$P(X = -1, Z = 1) = P(X = -1, Y = -1) = P(X = -1)P(Y = -1) = \frac{1}{4},$$

$$P(X = -1, Z = -1) = P(X = -1, Y = 1) = P(X = -1)P(Y = 1) = \frac{1}{4}.$$

$X, Z$  独立,  $Y, Z$  独立, 但是  $X, Y, Z$  不独立, 比如

$$P(X = 1, Y = 1, Z = 1) = P(X = 1, Y = 1) = \frac{1}{4} \neq P(X = 1)P(Y = 1)P(Z = 1) = \frac{1}{8}.$$

□

**Exercise #10. 12.** 设  $A_n$  是一列事件. 证明:

$$P(A_n \text{ i.o.}) \geq \limsup_{n \rightarrow \infty} P(A_n).$$

证明.

$$\begin{aligned} P(A_n \text{ i.o.}) &= P(\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n) \\ &= P\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k\right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\bigcup_{k=n}^{\infty} A_k\right) \\ &\geq \limsup_{n \rightarrow \infty} P(A_n). \end{aligned}$$

因为  $\bigcup_{k=n}^{\infty} A_k \supset A_n$ , 从而  $P(\bigcup_{k=n}^{\infty} A_k) \geq P(A_n)$ , 而  $P(A_n)$  的极限未必存在, 为得到非平凡的结论, 取上极限. □

**Exercise #10. 13.** 称一列随机变量  $X_1, X_2, \dots$  是完全收敛于  $X$  (*completely convergent to  $X$* ), 是指

$$\sum_{n=1}^{\infty} P(|X_n - X| > \varepsilon) < \infty \text{ for each } \varepsilon > 0$$

证明: 若序列  $X_n$  是独立的, 那么完全收敛和以概率 1 收敛是等价的.

证明.  $\Leftarrow$ :

随机变量  $X_n$  几乎处处收敛于  $X$  是指

$$P(\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = X) = 1.$$

根据 Kolmogorov 零壹律, 若  $X_n$  几乎处处收敛于  $X$ , 则  $X = \lim_{n \rightarrow \infty} X_n$  几乎处处是常数.

对于固定的随机变量  $X$ , 记  $A_n(\varepsilon) = \{|X_n - X| > \varepsilon\}$ , 由于

$$\{|X_n - X| > \varepsilon\} = \{X_n > X + \varepsilon\} \cup \{X_n < X - \varepsilon\},$$

由于  $\{X_n\}$  相互独立, 于是  $\{A_n(\varepsilon)\}$  相互独立.

由于

$$\left\{ \omega : \lim_{n \rightarrow \infty} X_n(\omega) = X(\omega) \right\} = \left\{ \omega : \bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{n=k}^{\infty} \left( |X_n(\omega) - X(\omega)| < \frac{1}{m} \right) \right\}$$

于是几乎处处收敛的等价表述是

$$P(\limsup_{n \rightarrow \infty} \{|X_n - X| > \varepsilon\}) = 0, \quad \forall \varepsilon > 0.$$

根据 Borel-Cantelli 零壹律,  $\forall \varepsilon > 0$ , 当  $\{A_n(\varepsilon)\}$  独立时,

$$\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n(\varepsilon)) < \infty \iff P(\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n(\varepsilon)) = 0,$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n(\varepsilon)) = \infty \iff P(\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n(\varepsilon)) = 1.$$

于是根据 Borel-Cantelli 零壹律,  $X_n$  完全收敛于  $X$ .

$\Rightarrow$ :

若

$$\sum_{n=1}^{\infty} P(|X_n - X| > \varepsilon) < \infty \text{ for each } \varepsilon > 0$$

根据 Borel-Cantelli 零壹律, 有

$$P(\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n(\varepsilon)) = 0, \quad \forall \varepsilon > 0.$$

从而  $X_n$  几乎处处收敛于  $X$ . (这里证明没有用到独立性, 是一个一般的结论.) □

**Exercise #10. 14.** 设  $\mu, \nu$  分别是  $(E, \mathcal{E}), (F, \mathcal{F})$  上的两个有限测度. 即满足概率公理, 出来正规化条件  $\mu(E), \nu(F)$  未必等于 1. 令乘积测度  $\lambda = \mu \otimes \nu$  定义在乘积可测空间  $(E \times F, \mathcal{E} \otimes \mathcal{F})$ , 它的定义是对于 Cartesian 积  $A \times B, A \in \mathcal{E}, B \in \mathcal{F}, \lambda(A \times B) = \mu(A)\nu(B)$ .

a) 证明  $\lambda$  可以延拓到  $\mathcal{E} \otimes \mathcal{F}$  上的一个有限测度;

b) 设  $f : E \times F \rightarrow \mathbb{R}$  是可测的. 证明 Fubini 定理: 若  $f$  是  $\lambda$ -可测的, 则  $x \rightarrow \int f(x, y)\nu(dy), y \rightarrow \int f(x, y)\mu(dx)$  分别相对  $\mathcal{E}, \mathcal{F}$  可测, 进一步地,

$$\int f d\lambda = \iint f(x, y)\mu(dx)\nu(dy) = \iint f(x, y)\nu(dy)\mu(dx)$$

证明. a) 设  $C \in \mathcal{E} \otimes \mathcal{F}$  是乘积 Borel  $\sigma$  代数上的元素. 记  $C(x) = \{y : (x, y) \in C\}$  是给定  $x$  后的一个截面. 先证明:  $C(x) \in \mathcal{F}$ .

这个结论是一般的, 即可对可测函数  $f : (E \times F, \mathcal{E} \otimes \mathcal{F}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ , 截面是可测的. 设  $f(x, y) = \mathbb{I}_C(x, y), C \in \mathcal{E} \otimes \mathcal{F}, g_x(y) = f(x, y)$ . 令

$$\mathcal{H} = \{C \in \mathcal{E} \otimes \mathcal{F} : \mathbb{I}_C(x, y) \text{ 可测}, \forall x \in E\}.$$

$\mathcal{H}$  是一个  $\sigma$ -代数, 因为

(a)  $\mathbb{I}_{\emptyset}(x, y) = 0, \mathbb{I}_{E \times F}(x, y) = 1$ , 从而  $\emptyset, E \times F \in \mathcal{H}$ ;

(b) 若  $S \in \mathcal{H}$ , 则对于任意  $x \in E, \mathbb{I}_S(x, y)$  可测, 从而  $\mathbb{I}_{S^c}(x, y) = 1 - \mathbb{I}_S(x, y)$  可测;

(c) 若  $\{S_n\}$  是  $\mathcal{H}$  中的序列, 则对于任意  $x \in E, \mathbb{I}_{\cup S_n}(x, y) = \max \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{I}_{S_n}(x, y), 1 \right\}$  可测.

从而  $\sigma(\mathcal{E} \times \mathcal{F}) \subset \mathcal{H}$ . 另一方面, 根据定义,  $\mathcal{H} \subset \sigma(\mathcal{E} \times \mathcal{F})$ , 从而  $\mathcal{H} = \sigma(\mathcal{E} \times \mathcal{F})$ . 这就已经证明  $C(x) \in \mathcal{F}$ .



此外, 根据经典操作, 示性函数可测, 根据线性性, 简单函数截口可测. 若  $f$  是正的, 令  $f_n$  是向上趋于  $f$  的简单函数, 于是  $g_n(y) = f_n(x, y)$  对于固定的  $x$  是  $\mathcal{F}$  可测的,  $\forall n$ . 根据可测函数的极限还是可测函数, 从而  $g(y) = f(x, y)$  对于固定的  $x$  是  $\mathcal{F}$  可测的. 最后, 若  $f$  是任意可测函数, 则只需要考虑  $f = f^+ - f^-$ , 从而固定  $x$ ,  $f$  是  $\mathcal{F}$  可测的.

以下, 尝试定义  $\lambda(C) = \int \nu\{C(x)\} d\mu(x)$ .

若  $C = A \times B$ , 则截面函数

$$C(x) = \begin{cases} B, & x \in A, \\ \emptyset, & x \notin A. \end{cases}$$

此时, 根据定义,

$$\lambda(C) = \mu \otimes \nu(C) = \mu(A)\nu(B) = \int \mathbb{I}_A(x)\nu(B) d\mu = \int \nu\{C(x)\} d\mu(x).$$

定义

$$\mathcal{H} = \{C \in \mathcal{E} \otimes \mathcal{F} : x \mapsto \nu(C(x)) \text{ 可测}\}$$

- 集合系  $\mathcal{E} \times \mathcal{F}$  包含全集  $E \times F$ , 并且关于有限交封闭:  $(\Lambda_1 \times \Gamma_1) \cap (\Lambda_2 \times \Gamma_2) = (\Lambda_1 \cap \Lambda_2) \times (\Gamma_1 \cap \Gamma_2)$ .
- $\mathcal{E} \times \mathcal{F} \subset \mathcal{H}$ , 因为当  $\forall C = A \times B \in \mathcal{E} \times \mathcal{F}$ ,  $A$  可测, 从而  $\nu(C(x)) = \nu(B)\mathbb{I}_A(x)$  可测, 于是  $C \in \mathcal{H}$ .
- $\mathcal{H}$  关于单增封闭. 设  $C_i \uparrow C, C_i \in \mathcal{H}$ , 于是, 集合关系也有  $C_i(x) \uparrow C(x)$ , 从而根据测度连续性,  $\nu(C_i(x)) \uparrow \nu(C(x))$ , 从而  $\nu(C(x)) = \lim_{n \rightarrow \infty} \nu(C_n(x))$  可测, 从而  $C \in \mathcal{H}$ .
- $\mathcal{H}$  关于差封闭. 设  $C_1 \subset C_2 \in \mathcal{H}$ , 于是对于任意的  $x$ ,  $C_1(x) \subset C_2(x)$ , 从而  $\nu((C_2 - C_1)(x)) = \nu(C_2(x) - C_1(x)) = \nu(C_2(x)) - \nu(C_1(x))$  可测, 从而  $C_1 - C_2 \in \mathcal{H}$ .

综上 4 点, 根据单调类定理,  $\mathcal{H} \supset \mathcal{E} \otimes \mathcal{F} = \sigma(\mathcal{E} \times \mathcal{F})$ . 另一方面, 根据定义,  $\mathcal{H} \subset \mathcal{E} \otimes \mathcal{F}$ . 于是  $\mathcal{H} = \mathcal{E} \otimes \mathcal{F}$ .

于是对  $\mathcal{E} \otimes \mathcal{F}$  中的元素  $C$ , 可以证明  $\lambda(C) = \int \nu\{C(x)\} d\mu(x)$  是良定的有限测度. 只需证明分离可列可加性:

$$\lambda\left(\sum_{k=1}^{\infty} C_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} \lambda(C_k).$$

事实上, 由于  $C_n \in \mathcal{E} \otimes \mathcal{F}$  两两不交, 从而  $\forall x, \{C_n(x)\}$  两两不交. 由于  $\nu$  是一个测度, 具有分离可列可加性, 于是

$$\nu\left[\sum_{k=1}^{\infty} C_k(x)\right] = \sum_{k=1}^{\infty} \nu(C_k(x)).$$

已经证明  $f_n(x) = \nu(C_k(x))$  是非负的可测函数, 从而根据单调收敛定理即可证明  $\lambda$  的分离可加性, 且

$$\lambda(E \times F) = \mu(E)\nu(F) < \infty,$$

因此  $\lambda$  是一个有限测度.

由单调类定理的推论,  $\lambda$  是唯一的延拓.

b) 已经证明, 当  $f = \mathbb{I}_C(x, y), C \in \mathcal{E} \otimes \mathcal{F}$  中时,

$$\begin{aligned} \int_{E \times F} f d\lambda &= \int_{E \times F} \mathbb{I}_C(x, y) d\lambda \\ &= (\mu \otimes \nu)(C) \\ &= \int \nu\{C(x)\} d\mu(x) \\ &= \iint \mathbb{I}_{C(x)}(y) d\nu(y) d\mu(x) \end{aligned}$$

从而可测性和积分交换顺序对示性函数成立, 根据线性性, 对简单函数也成立.

对于一般的非负函数  $f$ , 从而存在一个递增的简单函数列  $f_n \uparrow f$ , 从而

$$\begin{aligned} \int f d\lambda &= \int \lim_{n \rightarrow \infty} f_n d\lambda \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\lambda \quad (\text{单调收敛定理}) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \iint f_n(x, y) d\nu(y) d\mu(x) \quad (\text{已经证明的简单函数的 Fubini}) \\ &= \int \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n(x, y) d\nu(y) d\mu(x) \quad (\text{单调收敛定理}) \\ &= \int \left\{ \int \lim_{n \rightarrow \infty} f_n d\nu(y) \right\} d\mu(x) \\ &= \int \left\{ \int f d\nu(y) \right\} d\mu(x). \end{aligned}$$

其中,  $x \mapsto \int f(x, y) d\nu(y) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n(x, y) d\nu(y)$  可测. 因此可测性和积分交换次序对非负函数成立.

对于一般的函数  $f$ , 可以分解为  $f = f^+ - f^-$ , 从而可测性和积分交换顺序对一般可测函数成立. □

**Exercise #10. 15.** 称测度  $\tau$  在  $(G, \mathcal{G})$  上是  $\sigma$ -有限的, 若存在一系列集合  $\{G_j\}_{j \geq 1} \subset \mathcal{G}$ , 使得  $\cup_{j=1}^{\infty} G_j = G, \tau(G_j) < \infty, \forall j$ . 证明: 若  $\mu, \nu$  是  $\sigma$ -有限的,  $\lambda = \mu \otimes \nu$  存在, 那么

a)  $\lambda = \mu \otimes \nu$  是  $\sigma$ -有限的;

b) (Fubini 定理): 若  $f : E \times F \rightarrow \mathbb{R}$  是可测的, 且是  $\lambda$ -可积的, 则  $x \mapsto \int f(x, y) \nu(dy), y \mapsto \int f(x, y) \mu(dx)$  分别相对  $\mathcal{E}, \mathcal{F}$  可测, 进一步地,

$$\int f d\lambda = \iint f(x, y) \mu(dx) \nu(dy) = \iint f(x, y) \nu(dy) \mu(dx)$$

证明. 按照之前的证明流程, 只需证: 若  $\mu, \nu$  是  $\sigma$ -有限的, 那么延拓后的  $\lambda$  是  $\sigma$ -有限的.

由于  $\mu$  是  $\sigma$ -有限的, 从而存在一系列集合  $\{E_j\}_{j \geq 1} \subset \mathcal{E}$ , 使得  $\cup_{j=1}^{\infty} E_j = E, \mu(E_j) < \infty, \forall j$ . 同理根据  $\nu$  的  $\sigma$ -有限, 存在一系列集合  $\{F_k\}_{k \geq 1} \subset \mathcal{F}$ , 使得  $\cup_{k=1}^{\infty} F_k = F, \nu(F_k) < \infty, \forall k$ . 于是, 定义

$$G_{j,k} = E_j \times F_k, \quad \{G_{j,k}\}_{j,k \geq 1} \subset \mathcal{E} \otimes \mathcal{F}, \quad \cup_{j,k=1}^{\infty} G_{j,k} = E \times F.$$

根据  $\lambda$  的定义,  $\lambda(G_{j,k}) = \mu(E_j)\nu(F_k) < \infty$ , 从而  $\lambda$  是  $\sigma$ -有限的. □

**Exercise #10. 16.** 重复投一枚满足  $P(\text{正面朝上}) = p$  的硬币. 设  $A_k$  表示有在  $2^k, 2^k + 1, \dots, 2^{k+1} - 1$  次投掷中, 有  $k$  或更多次接连不断的正面朝上的事件. 证明: 当  $p \geq 1/2$  时,  $P(A_k \text{ i.o. }) = 1$ , 当  $p < 1/2$  时,  $P(A_k \text{ i.o. }) = 0$ .

证明. 由于当  $i \neq j$  时,  $\{2^i, \dots, 2^{i+1} - 1\} \cap \{2^j, \dots, 2^{j+1} - 1\} = \emptyset$ , 根据投硬币实验的独立性, 事件  $\{A_k\}$  相互独立.

接下来, 我们要找出  $P(A_k)$  的上下界.

在事件  $A_k$  中, 考虑的投掷是:  $2^k, 2^k + 1, \dots, 2^{k+1} - 1$ , 共  $2^k$  次投掷.

对于上界, 我们可以考虑: 有  $k$  次连续向上的事件中, 第一个元素可能出现的位置. 在整个序列中有  $2^k - k + 1$  个位置, 由于这种选法包含了长度为  $k$  及以上的序列 (因为没有指定后面的投掷), 以及存在数重的情况, 从而  $P(A_k) \leq (2^k - k + 1)p^k$ .

对于下界, 在这  $2^k$  次投掷中, 有  $\lfloor \frac{2^k}{k} \rfloor$  个互不相交的、长度为  $k$  的块. 对于这种特殊的划分, 有一个块全部正面向上的概率是  $1 - (1 - p^k)^{\lfloor \frac{2^k}{k} \rfloor}$ , 从而  $P(A_k) \geq 1 - (1 - p^k)^{\lfloor \frac{2^k}{k} \rfloor}$ .

- 当  $p < \frac{1}{2}$  时,  $P(A_k) \leq (2^k - k + 1)p^k < (2p)^k$ , 从而  $\sum_{k=1}^{\infty} P(A_k) \leq \sum_{k=1}^{\infty} (2p)^k = \frac{2p}{1-2p} < \infty$ , 根据 Borel-Cantelli 引理,  $P(A_k \text{ i.o. }) = 0$ .

- 当  $p > \frac{1}{2}$  时, 考察  $\ln(1 - P(A_k)) \leq \lfloor \frac{2^k}{k} \rfloor \ln(1 - p^k) \leq -\frac{2^k}{k} p^k = -\frac{(2p)^k}{k} \rightarrow -\infty (k \rightarrow \infty)$ . 于是  $1 - P(A_k) \rightarrow 0$ , 从而  $P(A_k) \rightarrow 1 (k \rightarrow \infty)$ . 因此  $\sum_{k=1}^{\infty} P(A_k) = \infty$ , 根据独立条件下的 Borel-Cantelli 引理,  $P(A_k \text{ i.o. }) = 1$ .

□

**Exercise #10. 17.** 设  $X_0, X_1, X_2, \dots$  是独立随机变量, 满足  $P(X_n = 1) = P(X_n = -1) = \frac{1}{2}, \forall n$ . 令  $Z_n = \prod_{i=1}^n X_i$ . 证明:  $Z_1, Z_2, \dots$  是独立的.

证明. 由于  $Z_n$  是二值取值的随机变量, 因此只需考虑一个事件即可. 因为若  $P(Z_i = 1, Z_j = 1) = P(Z_i = 1)P(Z_j = 1)$ , 则  $P(Z_i = 1, Z_j = -1) = P(Z_i = 1) - P(Z_i = 1, Z_j = 1) = P(Z_i = 1)P(Z_j = -1)$ .

用数学归纳法完成证明. 先考察  $Z_1, Z_2$ .

$$\begin{aligned} P(Z_1 = 1, Z_2 = -1) &= P(X_1 = 1, X_1 X_2 = -1) \\ &= P(X_1 = 1, X_2 = -1) \\ &= \frac{1}{4} \end{aligned}$$

而边际概率

$$P(Z_1 = 1) = P(X_1 = 1) = \frac{1}{2}, \quad P(Z_2 = -1) = P(X_1 = 1, X_2 = -1) + P(X_1 = -1, X_2 = 1) = \frac{1}{2}.$$

于是  $Z_1 \perp Z_2$ .

考虑  $Z_1, Z_2, Z_3$ ,

$$\begin{aligned} P(Z_1 = 1, Z_2 = -1, Z_3 = 1) &= P(X_1 = 1, X_1 X_2 = -1, X_1 X_2 X_3 = 1) \\ &= P(X_1 = 1, X_2 = -1, X_3 = 1) \\ &= \frac{1}{8}. \end{aligned}$$

边际概率

$$P(Z_3 = 1) = \frac{1}{2^3} \times \sum_{k=0}^1 \binom{3}{2k} = \frac{1}{2}.$$

重复上述流程, 即可证明  $Z_1, Z_2, \dots$  是独立的. □

注. 以下是一个严格的写法. 往证

$$P(Z_n = 1) = P(Z_n = -1) = \frac{1}{2}.$$

由于

$$\begin{aligned} P(Z_1 = z_1, \dots, Z_n = z_n) &= P\left(X_1 = z_1, X_2 = \frac{z_2}{z_1}, \dots, X_n = \frac{z_n}{z_{n-1}}\right) \\ &= P(X_1 = z_1)P\left(X_2 = \frac{z_2}{z_1}\right) \cdots P\left(X_n = \frac{z_n}{z_{n-1}}\right) \\ &= \frac{1}{2^n}. \end{aligned}$$

从而,  $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$  的联合分布是均匀分布,  $\forall n$ . 由于

$$P(Z_1 = z_1, \dots, Z_n = z_n) = P(Z_1 = z_1)P(Z_2 = z_2|Z_1 = z_1) \cdots P(Z_n = z_n|Z_1 = z_1, \dots, Z_{n-1} = z_{n-1}).$$

若有

$$P(Z_n = z_n) = P(Z_n = z_n|Z_1 = z_1, \dots, Z_{n-1} = z_{n-1}), \quad \forall n.$$

则独立性得证.

于是, 只需证明  $P(Z_n = 1) = P(Z_n = -1) = \frac{1}{2}$ , 即  $Z_n$  是均匀分布. 由于  $\{Z_n = 1\} = \{\text{偶数个 } X_n = -1\}$ , 只需证明,  $\#\{\text{偶数个 } X_n = -1\} = 2^{n-1}$ .

当  $n = 2m$  为偶数时, 要计算求和  $\sum_{k=0}^m \binom{2m}{2k}$ , 我们可以使用二项式系数的性质. 二项式系数  $\binom{2m}{2k}$  表示从  $2m$  个元素中选择  $2k$  个元素的方式数量.

首先, 考虑  $(1+x)^{2m}$  的二项式展开:

$$(1+x)^{2m} = \sum_{j=0}^{2m} \binom{2m}{j} x^j$$

接下来, 考虑  $(1-x)^{2m}$  的二项式展开:

$$(1-x)^{2m} = \sum_{j=0}^{2m} \binom{2m}{j} (-x)^j$$

将这两个展开式相加, 我们得到:

$$(1+x)^{2m} + (1-x)^{2m} = \sum_{j=0}^{2m} \binom{2m}{j} x^j + \sum_{j=0}^{2m} \binom{2m}{j} (-x)^j$$

注意到当  $j$  为奇数时,  $x^j$  和  $(-x)^j$  会相互抵消, 而当  $j$  为偶数时, 它们会相加. 因此, 我们有:

$$(1+x)^{2m} + (1-x)^{2m} = 2 \sum_{k=0}^m \binom{2m}{2k} x^{2k}$$

为了找到求和  $\sum_{k=0}^m \binom{2m}{2k}$ , 我们设  $x = 1$ :

$$(1+1)^{2m} + (1-1)^{2m} = 2 \sum_{k=0}^m \binom{2m}{2k}$$

简化左边:

$$2^{2m} + 0 = 2 \sum_{k=0}^m \binom{2m}{2k}$$

因此:

$$2^{2m} = 2 \sum_{k=0}^m \binom{2m}{2k}$$

两边同时除以 2:

$$\sum_{k=0}^m \binom{2m}{2k} = \frac{2^{2m}}{2} = 2^{2m-1}$$

因此, 最终答案是:

$$\boxed{2^{2m-1}} = 2^{n-1}.$$

当  $n = 2m + 1$  为奇数时, 要计算求和  $\sum_{k=0}^m \binom{2m+1}{2k}$ , 我们可以使用二项式系数的性质和生成函数. 二项式系数  $\binom{2m+1}{2k}$  表示从  $2m+1$  个元素中选择  $2k$  个元素的方式数量. 首先, 考虑  $(1+x)^{2m+1}$  的二项式展开:

$$(1+x)^{2m+1} = \sum_{j=0}^{2m+1} \binom{2m+1}{j} x^j$$

接下来, 考虑  $(1-x)^{2m+1}$  的二项式展开:

$$(1-x)^{2m+1} = \sum_{j=0}^{2m+1} \binom{2m+1}{j} (-x)^j$$

将这两个展开式相加, 我们得到:

$$(1+x)^{2m+1} + (1-x)^{2m+1} = \sum_{j=0}^{2m+1} \binom{2m+1}{j} x^j + \sum_{j=0}^{2m+1} \binom{2m+1}{j} (-x)^j$$

注意到当  $j$  为奇数时,  $x^j$  和  $(-x)^j$  会相互抵消, 而当  $j$  为偶数时, 它们会相加. 因此, 我们有:

$$(1+x)^{2m+1} + (1-x)^{2m+1} = 2 \sum_{k=0}^m \binom{2m+1}{2k} x^{2k}$$

为了找到求和  $\sum_{k=0}^m \binom{2m+1}{2k}$ , 我们设  $x = 1$ :

$$(1+1)^{2m+1} + (1-1)^{2m+1} = 2 \sum_{k=0}^m \binom{2m+1}{2k}$$

简化左边:

$$2^{2m+1} + 0 = 2 \sum_{k=0}^m \binom{2m+1}{2k}$$

因此:

$$2^{2m+1} = 2 \sum_{k=0}^m \binom{2m+1}{2k}$$

两边同时除以 2:

$$\sum_{k=0}^m \binom{2m+1}{2k} = \frac{2^{2m+1}}{2} = 2^{2m}$$

因此, 最终答案是:

$$\boxed{2^{2m}} = 2^{n-1}.$$

综上所述, 我们得到  $\#\{\text{偶数个 } X_n = -1\} = 2^{n-1}$ .

**Exercise #10. 18.** 设  $X, Y$  是独立的, 假设  $P(X + Y = \alpha) = 1$ , 其中  $\alpha$  是常数. 证明:  $X, Y$  是常数随机变量.

证明. 由于  $X = \alpha - Y$ , a.s.  $P$ . 因此, 若  $X$  与  $Y$  独立, 则  $X$  与  $\alpha - X$  独立, 因为  $f(x) = \alpha - x$  是一个可测函数 (函数在一个零测集处的取值不会改变其可测性). 从而  $X$  与自身独立. 从而

$$F(x) = P((-\infty, x]) = 0 \text{ 或 } 1.$$

于是  $X$  服从退化分布, 即  $X$  是常数随机变量, 根据  $X$  和  $Y$  的对称性,  $Y$  也是常数随机变量. □