

## TENONTOSAURUS

Tenontosaurus tilletti

Loài ăn cỏ đa năng, nổi bật với thể lực bền bỉ và khả năng tự vệ bằng những cú đá và quật đuôi mạnh mẽ.

NGUỒN: [evrimaquickguide.com/playables/quick-facts-herbivores/tenontosaurus](#)HỒ SƠ INGEN  
M H08-TEN

## Tổng Quan Về Loài

Tenontosaurus là "loài ăn cỏ đa năng, nổi bật với thể lực bền bỉ và khả năng tự vệ bằng những cú đá và quật đuôi mạnh mẽ."

## Dữ Liệu Tăng Trưởng

| GIẢI ĐOẠN        | TUỔI      | CÂN NẶNG       | TỐC ĐỘ         | LỰC CÁN  | T.LƯỢNG  |
|------------------|-----------|----------------|----------------|----------|----------|
| Con mới nở       | 0%        | 1.03 kg        | 5.7 km/h       | 0.04     | 20 phút  |
| Con non          | 25%       | 520 kg         | 41.7 km/h      | 10.7     | 90 phút  |
| Bán trưởng thành | 50–75%    | 988–1,600 kg   | 44.1–40.7 km/h | 20.1–35  | 110 phút |
| Già yếu          | 87.5–100% | 1,600 kg       | 40.7–31.9 km/h | 35–24.5  | 120 phút |
| Già sung mãn     | 75–100%   | 1,600–1,830 kg | 40.7–43.2 km/h | 35–40.25 | 120 phút |

🕒 TỔNG THỜI GIAN PHÁT TRIỂN: 5 GIỜ 40 PHÚT

## Bầy Đàn &amp; Sinh Sản

## THÔNG TIN BẦY ĐÀN

- Giới hạn bầy:** 8 thành viên

## THÔNG TIN SINH SẢN

- Loại tổ:** Ụ đất (Mound)
- Số trứng tối đa:** 6 trứng

## Nhu Cầu Dinh Dưỡng

## PROTEIN (β)

- Rong biển Dulse
- Cỏ lửa (Fireweed)
- Cây thùa (Agave)
- Hoa Sunchoke
- Đọt dương xỉ non
- Hoa Trillium

## CARBOHYDRATE (α)

- Dừa
- Xoài
- Cam sọc
- Cúc vạn thọ
- Chuối
- Mít

## LIPID (γ)

- Nấm Russula
- Hạt điều
- Bí ngô
- Đu đủ
- Hạt Brazil

Dạ dày cạn từ đầy đến rỗng: **60 phút** | Nước cạn từ đầy đến rỗng: **30 phút**

## Kỹ Năng Chiến Đấu

## CẮN

CHUỘT TRÁI

Đòn tấn công tiêu chuẩn.

## QUẬT ĐUÔI THEO HƯỚNG

ALT + CHUỘT PHẢI

Gây choáng/ngã; sát thương gốc 150, vào đầu 225. Hiệu quả với loài ăn cỏ nhỏ hơn trong bầy.

## ĐÁ HẬU

CHUỘT PHẢI

Gây choáng/ngã; sát thương gốc 275, vào đầu 412.5; chảy máu tương đương 2.7 lần vồ tap của omnivore (thân) hoặc 4 lần (đầu).

## VUỐT THEO HƯỚNG

ALT + CHUỘT TRÁI

Thực hiện được khi đi chậm, đi bộ hoặc đứng yên (không phải khi chạy); sát thương gốc 125, vào đầu 187.

## Chiến Thuật Phòng Thủ

Chảy máu làm giảm khả năng di chuyển **tương tự Stegosaurus**. Hệ số chảy máu tăng theo tốc độ: đi chậm (x1.4), đi nhanh (x1.8), chạy nước rút (x2.2). Cẩn thay vì tấn công khác giúp giảm hệ số xuống còn x0.9. Tốc độ đi nhanh tối đa 21.6 km/h kèm khả năng bẻ hướng — chỉ Deinonychus chậm hơn, Ceratosaurus có tốc độ tương đương. Sở hữu sát thương chảy máu cao, sánh ngang các loài săn mồi đỉnh cao khi trúng đầu.