

Гамма-функция

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Гамма-функция — математическая функция, обычно обозначается **Γ
(
z
)

{\displaystyle \Gamma (z)}**. Была введена Леонардом Эйлером, а своим обозначением гамма-функция обязана Лежандру^[1].

Гамма-функция чрезвычайно широко применяется в науке. Среди основных областей её применения — математический анализ, теория вероятностей, комбинаторика, статистика, атомная физика, астрофизика, гидродинамика, сейсмология и экономика. В частности, гамма-функция используется для обобщения понятия факториала на множества действительных и комплексных значений аргумента.

Содержание
Определения
<ul style="list-style-type: none"><u>Интегральное определение</u> <u>Определение по Гауссу</u> <u>Определение по Эйлеру</u> <u>Определение по Вейерштрассу</u>
Свойства
<u>Логарифм гамма-функции</u>
<u>Частные значения</u>
<u>Обобщения</u>
<u>См. также</u>
<u>Примечания</u>
<u>Литература и ссылки</u>

Определения

Интегральное определение

Если вещественная часть комплексного числа *z* положительна, то гамма-функция определяется через абсолютно сходящийся интеграл

$$\Gamma (z)=\int _{0}^{\infty }t^{z-1}e^{-t}\,dt,\quad z\in \mathbb {C} ,\quad \mathrm {Re} (z)>0$$




График гамма-функции действительной переменной

Это определение было получено Лежандром из оригинального определения Эйлера (1730 г.)

$$\Gamma(z) = \int_0^1 (-\ln x)^{z-1} dx$$

через замену переменной $x = e^{-t}$, и на сегодняшний день именно определение Лежандра известно как классическое определение гамма-функции. Интегрируя по частям классическое определение, легко видеть, что $\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$.

Для приближённого вычисления значений гамма-функции удобнее третья формула, также полученная из определения Эйлера путём применения равенства $\Gamma(z) = \Gamma(z+1)/z$ и замены переменной $x = y^2$:

$$\Gamma(z) = \frac{2^{z+1}}{z} \int_0^1 y(-\ln y)^z dy.$$

Интеграл в этой формуле сходится при $\operatorname{Re}(z) > -1$, хотя она обычно используется для положительных вещественных значений аргумента (предпочтительные значения — вблизи 1). В случае вещественного аргумента $z > 0$ подынтегральная функция имеет единственную особую точку — устранимый разрыв при $y = 0$, и если доопределить её в этой точке значением 0, она станет непрерывной на всём отрезке $[0; 1]$. Таким образом, интеграл является собственным, что упрощает численное интегрирование.

Существует непосредственное аналитическое продолжение исходной формулы на всю комплексную плоскость, кроме целых чисел, называемое интегралом Римана — Ханкеля:

$$\Gamma(z) = \frac{1}{e^{i2\pi z} - 1} \int_L t^{z-1} e^{-t} dt, \quad z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}.$$

Здесь контур L — любой контур на комплексной плоскости, обходящий точку $t = 0$ против часовой стрелки, концы которого уходят на бесконечность вдоль положительной вещественной оси.

Последующие выражения служат альтернативными определениями гамма-функции.

Определение по Гауссу

Оно верно для всех комплексных z , за исключением 0 и отрицательных целых чисел

$$\Gamma(z) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n-1)! n^z}{z(z+1)(z+2) \cdots (z+n-1)}, \quad z \in \mathbb{C} \setminus \{0, -1, -2, \dots\}.$$

Определение по Эйлеру

$$\Gamma(z) = \frac{1}{z} \prod_{n=1}^{\infty} \frac{(1 + \frac{1}{n})^z}{1 + \frac{z}{n}}, \quad z \in \mathbb{C} \setminus \{0, -1, -2, \dots\}.$$

Определение по Вейерштрассу

$$\Gamma(z) = \frac{e^{-\gamma z}}{z} \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{z}{n}\right)^{-1} e^{z/n}, \quad z \in \mathbb{C} \setminus \{0, -1, -2, \dots\}.$$

где $\gamma = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n \right) \approx 0,57722$ — постоянная Эйлера — Маскерони^[1].

Примечание: иногда используется альтернативная, так называемая *пи-функция*, которая является обобщением факториала и связана с гамма-функцией соотношением $\Pi(z) = \Gamma(z + 1)$. Именно этой функцией (а не Г-функцией) пользовались Гаусс, Риман, и многие другие немецкие математики XIX века.

Свойства

Если z — целое неотрицательное число,

$$\Gamma(z + 1) = z!.$$

Основное свойство гамма-функции — это её рекуррентное уравнение

$$\Gamma(z + 1) = z\Gamma(z),$$

которое при фиксированном начальном условии единственным образом определяет логарифмически выпуклое решение, то есть саму гамма-функцию (теорема о единственности)^[2].

Для гамма-функции справедлива формула дополнения Эйлера:

$$\Gamma(1 - z)\Gamma(z) = \frac{\pi}{\sin \pi z}.$$

Также справедлива и формула умножения Гаусса:





График модуля гамма-функции на комплексной плоскости.



Амплитуда и фаза факториала комплексного аргумента.

$$\Gamma(z)\Gamma\left(z + \frac{1}{n}\right) \cdots \Gamma\left(z + \frac{n-1}{n}\right) = n^{\frac{1}{2} - nz} \cdot (2\pi)^{\frac{n-1}{2}} \Gamma(nz),$$

Частный случай этой формулы при $n=2$ был получен Лежандром:

$$\Gamma(z) \Gamma\left(z + \frac{1}{2}\right) = 2^{1-2z} \sqrt{\pi} \Gamma(2z).$$

Гамма-функция не имеет нулей на всей комплексной плоскости. $\Gamma(z)$ является мероморфной на комплексной плоскости и имеющей простые полюсы в точках $z = 0, -1, -2, -3, \dots$ ^[1]

Гамма-функция имеет полюс первого порядка в $z = -n$ для любого натурального n и нуля; вычет в этой точке задаётся так:

$$\operatorname{Res}_{z=-n} \Gamma(z) = \frac{(-1)^n}{n!}.$$

Полезное свойство, которое может быть получено из предельного определения:

$$\overline{\Gamma(z)} = \Gamma(\bar{z}).$$

Гамма-функция дифференцируема бесконечное число раз, и $\Gamma'(x) = \psi(x)\Gamma(x)$, где $\psi(x)$, часто называют «пси-функцией» или дигамма-функцией. Гамма-функция и бета-функция связаны следующим соотношением:

$$B(x, y) = \frac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)}.$$

Логарифм гамма-функции

По целому ряду причин наряду с гамма-функцией часто рассматривают и логарифм гамма-функции — первообразную дигамма-функции. Для него справедливы следующие интегральные представления:

$$\ln \Gamma(z) = \left(z - \frac{1}{2}\right) \ln z - z + \frac{1}{2} \ln 2\pi + \int_0^\infty \left[\frac{1}{e^x - 1} - \frac{1}{x} + \frac{1}{2} \right] \frac{e^{-xz}}{x} dx, \quad \operatorname{Re} z > 0$$

и

$$\ln \Gamma(z) = \left(z - \frac{1}{2}\right) \ln z - z + \frac{1}{2} \ln 2\pi + 2 \int_0^\infty \frac{\operatorname{arctg}(x/z)}{e^{2\pi x} - 1} dx, \quad \operatorname{Re} z > 0$$

данные Жаком Бине в 1839-м году (эти формулы ещё часто называют первой и второй формулой Бине соответственно для логарифма гамма-функции)^[3]. Несколько отличные интегральные формулы для логарифма гамма-функции также появлялись в работах Мальмстена, Лерха и некоторых других. Так, Мальмстен получил формулу, схожую с первой формулой Бине^[3]

$$\ln \Gamma(z) = \int_0^\infty \left[z - 1 - \frac{1 - e^{-(z-1)x}}{1 - e^{-x}} \right] \frac{e^{-x}}{x} dx, \quad \operatorname{Re} z > 0$$

а Лерх показывает, что все интегралы вида

$$\int_0^\infty \frac{e^{2\pi x} \cos \varphi - 1}{e^{4\pi x} - 2e^{2\pi x} \cos \varphi + 1} \operatorname{arctg} \frac{u}{x} dx, \quad 0 < u \leq 1, \quad 0 < \varphi < 2\pi u$$

также сводятся к логарифмам гамма-функции. В частности, формула, аналогичная второй формуле Бине с «сопряжённым» знаменателем, имеет следующий вид:

$$\ln \Gamma(z) = -\left(z - \frac{1}{2}\right) \cdot \left\{1 - \ln\left(z - \frac{1}{2}\right)\right\} + \frac{1}{2} \ln 2\pi - 2 \int_0^{\infty} \frac{\operatorname{arctg}\left[x/\left(z - \frac{1}{2}\right)\right]}{e^{2\pi x} + 1} dx, \quad \operatorname{Re} z > \frac{1}{2}$$

(см. упр. 40 в^[4])

Кроме того, Мальмстен также получил ряд интегральных формул для логарифма гамма-функции, содержащих гиперболические функции с логарифмом в подынтегральном выражении (или, что то же, логарифм логарифма с полиномами). В частности,

$$\ln \Gamma(z) = \frac{1}{2} \ln \pi - \frac{1}{2} \ln \sin \pi z - \frac{2z-1}{2} \ln 2\pi - \frac{\sin 2\pi z}{2\pi} \int_0^{\infty} \frac{\ln x}{\operatorname{ch} x - \cos 2\pi z} dx, \quad 0 < \operatorname{Re} z < 1$$

(см. упр. 2, 29-h, 30 в^[4])

Ярослав Благушин показал, что при рациональном аргументе $z = k/n$, где k и n целые положительные числа, такие, что k не превосходит n , справедливо следующее представление:

$$\begin{aligned} \ln \Gamma\left(\frac{k}{n}\right) &= \frac{(n-2k) \ln 2\pi}{2n} + \frac{1}{2} \left\{ \ln \pi - \ln \sin \frac{\pi k}{n} \right\} + \\ &+ \frac{1}{\pi} \sum_{r=1}^{n-1} \frac{\gamma + \ln r}{r} \cdot \sin \frac{2\pi r k}{n} - \frac{1}{2\pi} \sin \frac{2\pi k}{n} \cdot \int_0^{\infty} \frac{e^{-nx} \cdot \ln x}{\operatorname{ch} x - \cos \frac{2\pi k}{n}} dx, \quad k \neq \frac{n}{2} \end{aligned}$$

(см. приложение C^[5], а также упр. 60 и 58^[4])

Более того, и в более общих случаях интегралы, содержащие гиперболические функции с логарифмом (или арктангенсом) в подынтегральном выражении, часто сводятся к логарифмам гамма-функции и её производным, в том числе и комплексного аргумента, см. напр. упр. 4-b, 7-a и 13-b в^[4].

Логарифм гамма-функции также тесно связан с аналитическим продолжением обобщённой дзета-функции

$$\ln \Gamma(z) = \zeta'(0, z) - \zeta'(0) = \zeta'(0, z) + \frac{1}{2} \ln 2\pi$$

Это важнейшее взаимоотношение, выведенное Лерхом, позволяет получить большое количество интегральных представлений для логарифма гамма-функции через известные формулы для обобщённой дзета-функции.

Ряд Фурье для логарифма гамма-функции имеет следующий вид

$$\ln \Gamma(x) = \left(\frac{1}{2} - x\right) (\gamma + \ln 2) + (1-x) \ln \pi - \frac{1}{2} \ln \sin \pi x + \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin 2\pi n x \cdot \ln n}{n}, \quad 0 < x < 1$$

Эта формула обычно приписывается Эрнсту Куммеру, который её вывел в 1847 г. (в авторитетной литературе^{[3][6][7]} этот ряд даже называется рядом Куммера для логарифма гамма-функции). Однако недавно было открыто, что эта формула была получена ещё в 1842 г. Карлом Мальмстеном (см. Ярослав Благушин^{[4][8]}).

Помимо разложения в ряд Фурье, существуют и другие разложения в ряды. Одно из самых известных это ряд Стирлинга

$$\ln \Gamma(z) = \left(z - \frac{1}{2}\right) \ln z - z + \frac{1}{2} \ln 2\pi + \sum_{n=1}^N \frac{B_{2n}}{2n(2n-1)z^{2n-1}} + O(z^{-2N-1}), \quad |\arg z| < \frac{\pi}{2}$$

В его стандартной вариации

$$\ln \Gamma(z) = z \ln z + O(z)$$

где коэффициенты B_{2n} означают числа Бернулли.

Из определения гамма-функции по Вейерштрассу следует ещё одно важное представление рядом^[9]

$$\ln \Gamma(z) = -\gamma z - \ln z + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{z}{n} - \ln \left(1 + \frac{z}{n} \right) \right].$$

Частные значения

Гамма-функция целого и полуцелого аргументов выражается через элементарные функции. В частности

$$\Gamma(1) = 0! = 1$$

$$\Gamma(2) = 1! = 1$$

$$\Gamma(3) = 2! = 2$$

$$\Gamma(4) = 3! = 6$$

$$\Gamma(5) = 4! = 24$$

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}.$$

$$\Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{1}{2}\sqrt{\pi}.$$

$$\Gamma\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{3}{4}\sqrt{\pi}.$$

$$\Gamma\left(\frac{7}{2}\right) = \frac{15}{8}\sqrt{\pi}.$$

$$\Gamma\left(-\frac{1}{2}\right) = -2\sqrt{\pi}.$$

$$\Gamma\left(-\frac{3}{2}\right) = \frac{4}{3}\sqrt{\pi}.$$

$$\Gamma\left(\frac{1}{2} + n\right) = \frac{(2n)!}{4^n n!} \sqrt{\pi} = \frac{(2n-1)!!}{2^n} \sqrt{\pi} = \sqrt{\pi} \cdot \left[\binom{n - \frac{1}{2}}{n} n! \right]$$

$$\Gamma\left(\frac{1}{2} - n\right) = \frac{(-4)^n n!}{(2n)!} \sqrt{\pi} = \frac{(-2)^n}{(2n-1)!!} \sqrt{\pi} = \sqrt{\pi} / \left[\binom{-\frac{1}{2}}{n} n! \right]$$

Поиск значения гамма-функции в точках 1/4 и 1/3 являлся объектом подробных изысканий Эйлера, Гаусса и Лежандра, однако им не удалось подсчитать эти значения в замкнутом виде^[1].

Существуют следующие представления в незамкнутом виде для $\Gamma(1/4)$

$$\Gamma\left(\frac{1}{4}\right) = \sqrt{\frac{(2\pi)^{\frac{3}{2}}}{\text{AGM}(\sqrt{2}, 1)}}$$

$$\Gamma\left(\frac{1}{4}\right) = (2\pi)^{\frac{3}{4}} \prod_{k=1}^{\infty} \text{th} \left(\frac{\pi k}{2} \right)$$

$$\Gamma\left(\frac{1}{4}\right) = A^3 e^{-\frac{G}{\pi}} \sqrt{\pi} 2^{\frac{1}{6}} \prod_{k=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{2k}\right)^{k(-1)^k}$$

где AGM — функция арифметико-геометрического среднего, G — постоянная Каталана и A — постоянная Глейшера—Кинкелина.

Обобщения

В классическом интегральном определении гамма-функции пределы интегрирования фиксированы. Рассматривают также неполную гамма-функцию, определяемую аналогичным интегралом с переменным верхним либо нижним пределом интегрирования. Различают верхнюю неполную гамма-функцию, часто обозначаемую как гамма-функцию от двух аргументов:

$$\Gamma(a, z) = \int_z^{\infty} e^{-t} t^{a-1} dt$$

и нижнюю неполную гамма-функцию, аналогично обозначаемую строчной буквой «гамма»:

$$\gamma(a, z) = \int_0^z e^{-t} t^{a-1} dt.$$

Иногда неполную гамма функцию определяют как^[10]:

$$I(z, a) = \frac{1}{\Gamma(a)} \int_0^z e^{-t} t^{a-1} dt.$$

См. также

- Список объектов, названных в честь Леонарда Эйлера
- K-функция
- G-функция Барнса
- Бета-функция
- Гамма-распределение
- Неполная гамма-функция

Примечания

- ↑ *Davis, P. J.* Leonhard Euler's Integral: A Historical Profile of the Gamma Function (<http://mathdl.maa.org/mathDL/22/?pa=content&sa=viewDocument&nodeId=3104>) (англ.) // American Mathematical Monthly : journal. — 1959. — Vol. 66, no. 10. — P. 849—869. — doi:[10.2307/2309786](https://doi.org/10.2307/2309786) (<https://dx.doi.org/10.2307/2309786>).
- ↑ *Kingman, J. F. C.* A Convexity Property of Positive Matrices (англ.) // The Quarterly Journal of Mathematics : journal. — 1961. — Vol. 12, no. 1. — P. 283—284. — doi:[10.1093/qmath/12.1.283](https://doi.org/10.1093/qmath/12.1.283) (<https://dx.doi.org/10.1093/qmath/12.1.283>). — .
- ↑ Harry Bateman and Arthur Erdélyi *Higher Transcendental Functions [in 3 volumes]*. Mc Graw-Hill Book Company, 1955.
- ↑ Iaroslav V. Blagouchine *Rediscovery of Malmsten’s integrals, their evaluation by contour integration methods and some related results*. The Ramanujan Journal, vol. 35, no. 1, pp. 21-110, 2014. (<https://link.springer.com/article/10.1007/s11139-013-9528-5>) PDF (<https://www.researchgate.net/publication/257381156>

5. Iaroslav V. Blagouchine *A theorem for the closed-form evaluation of the first generalized Stieltjes constant at rational arguments and some related summations* Journal of Number Theory (Elsevier), vol. 148, pp. 537—592, 2015. (<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022314X14002820>)
6. E.T. Whittaker and G. N. Watson *A course of modern analysis. An introduction to the general theory of infinite processes and of analytic functions, with an account of the principal transcendental functions (third edition)*. Cambridge at the University Press, 1920.
7. H.M. Srivastava and J. Choi *Series Associated with the Zeta and Related Functions*. Kluwer Academic Publishers. The Netherlands, 2001
8. *Blagouchine, Iaroslav V.* Erratum and Addendum to "Rediscovery of Malmsten's integrals, their evaluation by contour integration methods and some related results" (англ.) // Ramanujan J. : journal. — 2016. — Vol. 42, no. 3. — P. 777—781. — doi:10.1007/s11139-015-9763-z (<https://dx.doi.org/10.1007/s11139-015-9763-z>).
9. Д. С. Кузнецов. *Специальные функции* (2-е изд.). Высшая Школа, Москва, 1965.
10. *Неполная гамма-функция* — статья из [Математической энциклопедии](#)

Литература и ссылки

- В. Я. Арсенин. *Математическая физика: основные уравнения и специальные функции*, глава X, сс. 225—233. Наука, Москва, 1966.
 - М. А. Евграфов. *Аналитические функции*, глава VI, сс. 267—273. Наука, Москва, 1968.
 - М. А. Евграфов и др. *Сборник задач по теории аналитических функций*, сс. 307—316. Наука, Москва, 1969.
 - Г. М. Фихтенгольц. *Курс дифференциального и интегрального исчисления* (7-е изд.), глава XIV, сс. 750—794. Наука, Москва, 1969.
 - А. И. Маркушевич. *Теория аналитических функций* (2-е изд.), том 2, сс. 303—324. Наука, Москва, 1968.
 - Н. Н. Лебедев. *Специальные функции и их приложения* (2-е изд.), глава I, сс. 11—27. ФМ, Москва, 1963.
 - А. Ф. Никифоров и В. Б. Уваров. *Специальные функции математической физики*, сс. 263—268. Наука, Москва, 1978.
 - R. Campbell. *Les intégrales eulériennes et leurs applications*, Dunod, Paris, 1966.
 - M. Godefroy. *La fonction Gamma; Théorie, Histoire, Bibliographie*, Gauthier-Villars, Paris, 1901.
 - E. Artin. *Einführung in die Theorie der Gammafunktion*, Teubner, Leipzig, 1931.
 - N. Nielson. *Handbuch der Theorie der Gammafunktion*, Teubner, Leipzig, 1906.
-

Источник — <https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Гамма-функция&oldid=107638864>

Эта страница в последний раз была отредактирована 13 июня 2020 в 11:21.

Текст доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.

Wikipedia® — зарегистрированный товарный знак некоммерческой организации Wikimedia Foundation, Inc.