

Вариант 1

1. Определить длину диагоналей параллелограмма, построенного на векторах $\vec{a} = \vec{p} - 3\vec{q}$, $\vec{b} = 5\vec{p} + 2\vec{q}$, если известно, что $|\vec{p}| = 2\sqrt{2}$, $|\vec{q}| = 3$ и $(\widehat{\vec{p}, \vec{q}}) = \pi/4$
2. Вектора $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ образуют левую тройку, $|\vec{a}| = 1$, $|\vec{b}| = 2$, $|\vec{c}| = 3$, $\vec{c} \perp \vec{a}$, $\vec{c} \perp \vec{b}$, $(\widehat{\vec{a}, \vec{b}}) = 30^\circ$. Найти $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$
3. Найти взаимное расположение прямых $l_1: \frac{x-1}{-2} = \frac{y}{1}$ и $l_2: \frac{x+2}{1} = \frac{y}{0}$. При этом, если $l_1 \parallel l_2$ найти расстояние $\rho(l_1, l_2)$ между прямыми, а если прямые пересекаются, то найти косинус угла между ними и точку M_0 пересечения прямых.
4. Исследуйте взаимное расположение плоскостей $P_1: -x + 2y - z + 1 = 0$ и $P_2: y + 3z - 1 = 0$. При этом, если $P_1 \parallel P_2$, найти расстояние $\rho(P_1, P_2)$ между плоскостями, а если плоскости пересекаются, то найти косинус угла между ними.
5. Записать каноническое уравнение эллипса, если эксцентриситет $e = 1/2$ и расстояние между директрисами равняется 32.

Вариант 2

1. Задан вектор $\vec{a} = (-1, 2, 0)$. Вычислите $|\vec{a}|$ и координаты орта $(\vec{a})_0$ вектора \vec{a}
2. Найти вектор \vec{x} , коллинеарный вектору $\vec{a} = \vec{i} - 2\vec{j} - 2\vec{k}$ и такой, который образует с ортом \vec{j} острый угол и имеет длину $|\vec{x}| = 15$
3. Прямая l задана точкой $M_0(-1, 2) \in l$ и вектором нормали $\vec{n} = (2, 2)$. Написать уравнение прямой, свести его к общему виду, построить график прямой, найти расстояние от начала координат до прямой.
4. Вычислите объем пирамиды, ограниченной плоскостью $P: 2x - 3y + 6z - 12 = 0$ и координатными плоскостями.
5. Постройте гиперболу $16x^2 - 9y^2 = -144$. Найдите полуоси, координаты фокусов, эксцентриситет, уравнения директрис.

Вариант 3

1. Задан вектор $\vec{a} = (-1, 2, 0)$. Вычислите $\cos(\widehat{\vec{a}, \vec{j}})$
2. Найти вектор \vec{x} , который образует с ортом \vec{j} угол 60° , с ортом \vec{k} - 120° , при условии, что $|\vec{x}| = 5\sqrt{2}$
3. Прямая l задана точкой $M_0(2, 1) \in l$ и вектором нормали $\vec{n} = (2, 0)$. Написать уравнение прямой, свести его к общему виду, построить график прямой, найти расстояние от начала координат до прямой.
4. Исследуйте взаимное расположение плоскостей $P_1: 2x - y + z - 1 = 0$ и $P_2: -4x + 2y - 2z - 1 = 0$. При этом, если $P_1 \parallel P_2$, найти расстояние $\rho(P_1, P_2)$ между плоскостями, а если плоскости пересекаются, то найти косинус угла между ними.
5. Напишите каноническое уравнение гиперболы, если $c=10$ и уравнения асимптот $y = \pm \frac{4}{3}x$.

Вариант 4

1. Заданы вектора $\vec{a}_1 = (-1, 2, 0)$, $\vec{a}_2 = (3, 1, 1)$, $\vec{a}_3 = (2, 0, 1)$. Вычислите координату x вектора \vec{a} , если $\vec{a} = \vec{a}_1 - 2\vec{a}_2 + \frac{1}{3}\vec{a}_3$.
2. При каких значениях α и β вектора $\vec{a} = -2\vec{i} + 3\vec{j} + \alpha\vec{k}$ и $\vec{b} = \beta\vec{i} - 6\vec{j} + 2\vec{k}$ коллинеарные
3. Прямая l задана точкой $M_0(1, 1) \in l$ и вектором нормали $\vec{n} = (2, -1)$. Написать уравнение прямой, свести его к общему виду, построить график прямой, найти расстояние от начала координат до прямой.
4. Составить уравнение плоскости P , которая проходит через точку $A(1, 1, -1)$ и перпендикулярна к плоскостям $P_1: 2x - y + 5z + 3 = 0$ и $P_2: x + 3y - z - 7 = 0$.
5. Напишите каноническое уравнение гиперболы, если эксцентриситет равен $\frac{3}{2}$ и расстояние между директрисами равно $\frac{8}{3}$.

Вариант 5

1. Заданы вектора $\vec{a}_1 = (-1, 2, 0)$, $\vec{a}_2 = (3, 1, 1)$, $\vec{a}_3 = (2, 0, 1)$. Вычислите $\text{pr}_{\vec{j}} \vec{a}$, если $\vec{a} = \vec{a}_1 - 2\vec{a}_2 + \frac{1}{3}\vec{a}_3$.
2. Заданы три вершины $A(3, -4, 7)$, $B(-5, 3, -2)$ и $C(1, 2, -3)$ параллелограмма ABCD. Найти его четвертую вершину D, противолежащую B.
3. Прямая l задана точкой $M_0(-1, 2) \in l$ и направляющим вектором $\vec{s} = (3, -1)$. Написать уравнение прямой, свести его к общему виду, построить график прямой, найти расстояние от начала координат до прямой.
4. Прямая L задана общими уравнениями. Написать для этой прямой каноническое уравнение и уравнение в отрезках. $L: \begin{cases} 2x - y + 2z - 3 = 0 \\ x + 2y - z - 1 = 0 \end{cases}$
5. Докажите, что $16x^2 - 9y^2 - 64x - 54y - 161 = 0$ эллипс. Для него найти полуоси, эксцентриситет, уравнения директрис.

Вариант 6

1. Заданы вектора $\vec{a} = 2\vec{i} + 3\vec{j}$. Найти координаты орта \vec{a}_0
2. Заданы две смежные вершины параллелограмма $A(-2, 6)$, $B(2, 8)$ и точка пересечения их диагоналей $M(2, 2)$. Найти две другие вершины.
3. Прямая l задана точкой $M_0(1, 1) \in l$ и направляющим вектором $\vec{s} = (0, -1)$. Написать уравнение прямой, свести его к общему виду, построить график прямой, найти расстояние от начала координат до прямой.
4. Прямая L задана общими уравнениями. Написать для этой прямой каноническое уравнение и уравнение в отрезках. $L: \begin{cases} x + 2y - 3z - 5 = 0 \\ 2x - y + z + 2 = 0 \end{cases}$
5. Докажите, что $16x^2 - 9y^2 - 64x - 54y - 161 = 0$ эллипс. Для него найти полуоси, эксцентриситет, уравнения директрис.

Вариант 7

1. Заданы вектора $\vec{a} = 2\vec{i} + 3\vec{j}$, $\vec{b} = -3\vec{i} - 2\vec{k}$, $\vec{c} = \vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$. Найти координаты вектора $\vec{d} = \vec{a} - \frac{1}{2}\vec{b} + \vec{c}$
2. Определите координаты вершин треугольника, если известны середины его сторон: $K(2, -4)$, $M(6, 1)$, $N(-2, 3)$
3. Прямая l задана точкой $M_0(-1, 1) \in l$ и направляющим вектором $\vec{s} = (2, 0)$. Написать уравнение прямой, свести его к общему виду, построить график прямой, найти расстояние от начала координат до прямой.
4. Написать каноническое уравнение прямой L , которая проходит через точку $M_0(2, 0, -3)$ параллельно прямой L_1 :
$$\begin{cases} 3x - y + 2z - 7 = 0 \\ x + 3y - 2z - 3 = 0 \end{cases}$$
5. Докажите, что $16x^2 - 9y^2 - 64x - 54y - 161 = 0$ эллипс. Для него найти полуоси, эксцентриситет, уравнения директрис.

Вариант 8

1. Заданы вектора $\vec{a} = 2\vec{i} + 3\vec{j}$, $\vec{b} = -3\vec{i} - 2\vec{k}$. Найти $\text{pr}_{\vec{j}}(\vec{a} - \vec{b})$
2. На оси абсцисс найти точку M , расстояние от которой до точки $A(3, 3)$ равно 5.
3. Найти взаимное расположение прямых $l_1: x + y - 1 = 0$ и $l_2: \frac{x}{2} = \frac{y+1}{-2}$. При этом, если $l_1 \parallel l_2$ найти расстояние $\rho(l_1, l_2)$ между прямыми, а если прямые пересекаются, то найти косинус угла между ними и точку M_0 пересечения прямых.
4. Задана прямая $L: \frac{x-1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{0}$ и точка $M(0, 1, 2) \notin L$ (проверить). Необходимо написать уравнение плоскости P , которая проходит через прямую L и точку M .
5. Докажите, что $16x^2 - 9y^2 - 64x - 54y - 161 = 0$ эллипс. Для него найти полуоси, эксцентриситет, уравнения директрис.

Вариант 9

1. Найти координаты орта \vec{a}_0 , если $\vec{a} = (6, 7, -6)$
2. На оси ординат найти точку M , равноудаленную от точек $A(1, -4, 7)$ и $B(5, 6, -5)$
3. Прямая l задана двумя точками $M_1(1, 2)$ и $M_2(-1, 0)$. Написать уравнение прямой, свести его к общему виду, построить график прямой, найти расстояние от начала координат до прямой.
4. Задана прямая $L: \frac{x-1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{0}$ и точка $M(0, 1, 2) \notin L$ (проверить).
Необходимо написать уравнение плоскости P , которая проходит точку M перпендикулярно прямой L .
5. Напишите каноническое уравнение гиперболы, если эксцентриситет равен $3/2$ и расстояние между директрисами равно $8/3$

Вариант 10

1. Вектор $\vec{a} = 2\vec{i} + 3\vec{j} + z\vec{k}$. Найти z , если $|\vec{a}| = 12$
2. Заданы вершины треугольника $A(3, -1, 5)$, $B(4, 2, -5)$ и $C(-4, 0, 3)$. Найти длину медианы, проведенной из вершины A .
3. Найти взаимное расположение прямых l_1 и l_2 . При этом, если $l_1 \parallel l_2$ найти расстояние $\rho(l_1, l_2)$ между прямыми, а если прямые пересекаются, то найти косинус угла между ними и точку M_0 пересечения прямых.
 $l_1: x - y + 1 = 0 \quad l_2: 2x - 2y + 1 = 0$
4. Задана прямая $L: \frac{x-1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{0}$ и точка $M(0, 1, 2) \notin L$ (проверить).
Необходимо написать уравнение перпендикуляра, опущенного с точки M на прямую L .
5. Напишите каноническое уравнение гиперболы, если $c=10$ и уравнения асимптот $y = \pm \frac{4}{3}x$.

Вариант 11

1. Найти длину вектора $\vec{p} = 3\vec{a} - 5\vec{b} + \vec{c}$, если $\vec{a} = 4\vec{i} + 7\vec{j} + 3\vec{k}$, $\vec{b} = \vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}$, $\vec{c} = 2\vec{i} - 3\vec{j} - \vec{k}$.
2. Отрезок с концами в точках $A(3, -2)$ и $B(6, 4)$ разделен на три равные части. Найти координаты точек деления.
3. Найти взаимное расположение прямых $l_1: -2x + y - 1 = 0$ и $l_2: 2y + 1 = 0$. При этом, если $l_1 \parallel l_2$ найти расстояние $\rho(l_1, l_2)$ между прямыми, а если прямые пересекаются, то найти косинус угла между ними и точку M_0 пересечения прямых.
4. Задана прямая $L: \frac{x-1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{0}$ и точка $M(0, 1, 2) \notin L$ (проверить). Необходимо найти расстояние от точки M до прямой L .
5. Постройте гиперболу $16x^2 - 9y^2 = -144$. Найдите полуоси, координаты фокусов, эксцентриситет, уравнения директрис.

Вариант 12

1. Заданы вектора $\vec{a} = 2\vec{i} + 3\vec{j}$, $\vec{b} = -3\vec{i} - 2\vec{k}$, $\vec{c} = \vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$. Найти координаты вектора $\vec{d} = \vec{a} + \vec{b} - \frac{1}{2}\vec{c}$.
2. Определить координаты концов отрезка AB , который точками $C(2, 0, 2)$ и $B(5, -2, 0)$ разделен на три равные части.
3. Задана прямая $l: x + y + 1 = 0$ и точка $M(0, -1)$. Необходимо вычислить расстояние $\rho(M, l)$ от точки M до прямой l , написать уравнение прямой l' , которая проходит через точку M параллельно заданной прямой l .
4. Задана поверхность $P: x + y - z = 0$ и прямая $L: \frac{x-1}{0} = \frac{y}{2} = \frac{z+1}{1}$, причем $L \notin P$ (проверить). Необходимо вычислить $\sin(\widehat{P, L})$ и координаты точки пересечения прямой и плоскости.
5. Докажите, что $4x^2 + 3y^2 - 8x + 12y - 32 = 0$ эллипс. Для него найти полуоси, эксцентриситет, уравнения директрис.

Вариант 13

1. Вектор $\vec{a} = \vec{i} + z\vec{j} + \vec{k}$. Найти z , если $|\vec{a}| = 9$
2. Отрезок с концами в точках $A(1,5)$ и $B(-2,3)$ разделен на три равные части. Найти координаты точек деления.
3. Прямая l задана двумя точками $M_1(1, 1)$ и $M_2(1, -2)$. Написать уравнение прямой, свести его к общему виду, построить график прямой, найти расстояние от начала координат до прямой.
4. Задана поверхность $P: x + y - z = 0$ и прямая $L: \frac{x-1}{0} = \frac{y}{2} = \frac{z+1}{1}$, причем $L \notin P$ (проверить). Необходимо написать уравнения плоскости Q , которая проходит через прямую L перпендикулярно плоскости P .
5. Докажите, что $16x^2 + 25y^2 + 32x - 100y - 284 = 0$ эллипс. Для него найти полуоси, эксцентриситет, уравнения директрис.

Вариант 14

1. Найти координаты орта \vec{a}_0 , если $\vec{a} = (2,5, -2)$
2. Известны вершины треугольника ABC : $A(1,5)$, $B(2,3)$ и $C(3,6)$. Определить координаты точки пересечения медиан.
3. Прямая l задана двумя точками $M_1(2, 2)$ и $M_2(0, 2)$. Написать уравнение прямой, свести его к общему виду, построить график прямой, найти расстояние от начала координат до прямой.
4. Задана поверхность $P: x + y - z = 0$ и прямая $L: \frac{x-1}{0} = \frac{y}{2} = \frac{z+1}{1}$, причем $L \notin P$ (проверить). Необходимо написать уравнение проекции прямой на плоскость P .
5. Докажите, что $5x^2 + 9y^2 - 30x + 18y + 9 = 0$ эллипс. Для него найти полуоси, эксцентриситет, уравнения директрис.

Вариант 15

1. Задан вектор $\vec{a} = (3, 1, 1)$. Вычислите $\cos(\widehat{\vec{a}, \vec{j}})$
2. Известны вершины треугольника ABC : $A(-1, -2)$, $B(0, 3)$ и $C(3, 0)$. Определить координаты точки пересечения медиан.
3. Задана прямая l : $-2x + y - 1 = 0$ и точка $M(-1, 2)$. Необходимо вычислить расстояние $\rho(M, l)$ от точки M до прямой l , написать уравнение прямой l' , которая проходит через точку M перпендикулярно заданной прямой l .
4. Найти расстояние между параллельными прямыми $L_1: \frac{x-2}{3} = \frac{y+1}{4} = \frac{z}{2}$ и $L_2: \frac{x-7}{3} = \frac{y-1}{4} = \frac{z-3}{2}$
5. Напишите каноническое уравнение эллипса, если $c=2$ и расстояние между директрисами равно 5.

Вариант 16

1. Найти направляющие косинусы вектора $\vec{p} = 3\vec{a} - 5\vec{b} + \vec{c}$, если $\vec{a} = 4\vec{i} + 7\vec{j} + 3\vec{k}$, $\vec{b} = \vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}$, $\vec{c} = 2\vec{i} - 3\vec{j} - \vec{k}$.
2. Найти координаты четвертой вершины квадрата $ABCD$, если известны координаты вершин $A(-5, 3, 4)$, $B(-1, -7, 5)$, $C(6, -5, -3)$.
3. Задана прямая l : $2y + 1 = 0$ и точка $M(1, 0)$. Необходимо вычислить расстояние $\rho(M, l)$ от точки M до прямой l , написать уравнение прямой l' , которая проходит через точку M перпендикулярно заданной прямой l .
4. Для какого значения λ плоскость P : $5x - 3y + \lambda z + 1 = 0$ будет параллельна прямой L : $\begin{cases} x - 4z - 1 = 0 \\ y - 3z + 2 = 0 \end{cases}$.
5. Постройте эллипс $9x^2 + 25y^2 = 225$. Найдите полуоси, координаты фокусов, эксцентриситет, уравнения директрис.