ALIMENTACIÓN

(DAR DE COMER NO ES ALIMENTAR)


- Una correcta alimentación es aquella que provee agua y nutrientes para el desarrollo de los animales.
- Los requerimientos en agua y nutrientes serán diferentes según la raza y tipo de animal, la etapa de crecimiento, entre otros.
- Debe brindarse en las proporciones adecuadas agua, grasas, hidratos de carbono, energía, proteínas, vitaminas, minerales

Fuente: INTA, ProHuerta y SENASA

ALIMENTOS

- Los alimentos pueden ser balanceados o simples / complejos, caseros o comerciales.
- Los alimentos balanceados son aquellos que aportan los nutrientes en las proporciones adecuadas para asegurar el desarrollo de las aves.
- Los alimentos simples y complejos son aquellos que no cumplen con el balance adecuado de nutrientes por lo que hay que complementarlos con otros (ej. maíz).

Fuente: INTA, ProHuerta y SENASA



Fuente: INTA, ProHuerta y SENASA

Constructores: son aquellos que aportan principalmente proteínas; fundamentales para el desarrollo de los músculos (carne) y producción de huevos.

Reguladores: aportan principalmente vitaminas y minerales los cuales ayudan a prevenir enfermedades. El calcio y el fósforo son indispensables para la formación de huesos y la cáscara del huevo.

Energéticos: principalmente grasas y carbohidratos que aportan energía.

- El uso de parques permite a las gallinas principalmente disminuir el estrés del confinamiento; pero también la provisión de vitaminas, minerales y proteínas adicionales con la ingesta de vegetación, semillas y "bichos" del suelo.
- Según la disponibilidad de espacio y la cantidad de animales, pueden manejarse en forma rotativa. No deben faltar sombra y bebederos para evitar el sol directo principalmente en verano.






Fuente: INTA, ProHuerta y SENASA

AGUA

- Es uno de los factores más relevantes y a veces más olvidados en la nutrición.
- El agua debe ser siempre potable y proveerse en cantidad adecuada. Debe cambiarse todos los días y estar fresca (no expuesta al sol).



Fuente: INTA, ProHuerta y SENASA

- El agua debe darse siempre para que los animales tomen a voluntad. Su consumo dependerá principalmente del ambiente y de la edad y tamaño de los animales.
- El aporte de agua es crítico, no sólo como nutriente esencial sino como regulador de la temperatura corporal: en épocas de altas temperaturas su consumo se duplica.
- El consumo estimado en aves adultas está entre 2 a 4 litros / 10 aves / día.

Fuente: INTA, ProHuerta y SENASA

PARA TENER EN CUENTA

- Una correcta distribución de comederos y bebederos es fundamental para la uniformidad del lote de aves. El uso de bebederos y comederos circulares además favorece la distribución de las aves en torno a ellos.
- La calidad del alimento influye directamente en el consumo: si éste tiene olor, humedad, hongos, el consumo será menor. Cuanto más grandes son las aves, más grandes deben ser las partículas de alimento.
- Si la alimentación no es adecuada, se retrasa el desarrollo, la postura de huevos, la uniformidad del plantel y los animales son más propensos a enfermedades.

Fuente: INTA, ProHuerta y SENASA

ETAPAS DE CRECIMIENTO

Según el destino de la producción, las etapas y su duración serán distintas:

Cría

Recría

Terminación

Postura

Fuente: INTA, ProHuerta y SENASA

CRIA

La duración de esta etapa es variable, desde que nacen:

- hasta el emplume (parrilleros)
- hasta los 35 días (campero INTA)
- hasta la 6ta semana (ponedora).





Fuente: INTA, ProHuerta y SENASA

Cuando llegan los pollitos BB hay que ofrecerles agua templada y dos cucharaditas de azúcar por litro (esto para para garantizar el consumo de agua y la hidratación).





Fuente: INTA, ProHuerta y SENASA

Durante las primeras semanas de vida del pollito, el ritmo de crecimiento y la conversión de alimento, son muy altas. Es así que estas semanas marcaran el éxito, o no, de la crianza.





Fuente: INTA, ProHuerta y SENASA

Para armar el "gallinerito" de los pollitos necesitamos:

- 1 Caja de cartón
- 2 botellas de plástico
- Viruta de madera
- 1 lámpara
- Alambre





En los primeros 2 meses las ponedoras comen aprox. 2 kilos de alimento cada una.

En esta etapa es mejor darles alimento balanceado del tipo comercial (cría o iniciador) a voluntad.

Fuente: INTA, ProHuerta y SENASA

En esta etapa la luz es fundamental ya que estimula el consumo, provee calor y evita la muerte por amontonamiento







La temperatura ambiental óptima durante los primeros 15 días es de 32 grados (un foco de 40 W. o una estufa)


Fuente: INTA, ProHuerta y SENASA

Según cómo se ubican los pollitos podremos saber si el ambiente y la temperatura son adecuados.




Temperatura óptima







Temperatura baja






Hay corrientes de aire





Demasiado calor



Temperaturas no adecuadas provocan disminución de crecimiento, muerte por aplastamiento o por enfriamiento.

Fuente: INTA, ProHuerta y SENASA











Para la etapa de CRIA se necesitará:

- 5 a 7 comederos / ave
- Espacio: 12 a 20 aves/m2
- Bebederos: 1 a 2 cm/ave de bebedero









A partir de los 15 días se les abre su "gallinerito": También en un espacio cerrado, pero con espacio para poder caminar.

Fuente: INTA, ProHuerta y SENASA

RECRÍA

- La duración de esta etapa es variable: del emplume hasta los 35 días (parrilleros), de los 36 a los 56/63 días (campero INTA) o de la 6ta a la 17va semana (ponedora).
- En esta etapa ya tienen plumas por lo que no necesitarán calor artificial; la recría puede hacerse en cautiverio o semicautiverio.
- Alimentación: el aporte de alimento debe ser a voluntad.

Fuente: INTA, ProHuerta y SENASA

POSTURA Y TERMINACIÓN

La duración de esta etapa es:

- desde la semana 17/18 (ponedoras);
- desde los 35 días hasta faena (parrilleros) o
- desde los días 56/63 hasta la faena (campero INTA)





Fuente: INTA, ProHuerta y SENASA

- Durante esta etapa las ponedoras consumen entre 100 a 120grs/día.
- Los parrilleros (de ciclo rápido) consumen entre 5,5 y 6,5 kg de alimento durante todo en ciclo.
- Los camperos INTA (de ciclo lento) consumen entre 7,5 a 9,5 kg de alimento durante el ciclo.



Fuente: INTA, ProHuerta y SENASA

PARA TENER EN CUENTA

El inicio de la postura a nivel de campo puede atrasarse o adelantarse ya que son muchos los factores que afectan: genética, alimentación, horas de luz, entre otros.

Una ponedora puede vivir muchos años, pero a partir de los 24 meses la producción de huevos será cada vez menor.

Fuente: INTA, ProHuerta y SENASA