MANEJO DE LOS LOTES


Incorporar el hábito del monitoreo diario: observar el plantel de animales en forma periódica para adelantarse a los problemas.





Registrar: ingreso y egreso de animales, nacimientos, compra de alimentos y equipamientos, muerte de animales, tareas realizadas y su responsable, entre otros.

Fuente: INTA, ProHuerta y SENASA




<u>Separar</u> los animales por razas y especies (no patos y gansos con las gallinas),destino (huevo, carne), edad o etapa de crecimiento (cría, recría, postura).

Si tenés otras especies en tu granja, no deben compartir espacio con las gallinas.



Fuente: INTA, ProHuerta y SENASA

Separar las gallinas enfermas de las sanas. Las que están muy enfermas hay que sacrificarlas, luego quemarlas o enterrarlas con cal.





Nunca hay comer gallinas enfermas, sí quemarlas o enterrarlas. Tampoco alimentar otros animales con ellas.

Fuente: INTA, ProHuerta y SENASA

Se debe evitar la exposición a vientos fuertes y lluvias. Para ello, es importante contar con gallinero y/o refugios con cortinas.





La materia fecal, malos bebederos y falta de higiene provocan exceso de humedad lo que favorece la presencia de microorganismos y enfermedades.

Fuente: INTA, ProHuerta y SENASA

Mantener siempre limpio el gallinero y sus alrededores evitando la acumulación de chatarra, plásticos y malezas.







Pintar con cal paredes, techos, perchas y nidos por lo menos 3 a 4 veces al año.

Fuente: INTA, ProHuerta y SENASA

Eliminar moscas, cucarachas, roedores y otras plagas que pueden ensuciar y transmitir enfermedades.











Las ratas y aves silvestres además comen el alimento de las gallinas.

Fuente: INTA, ProHuerta y SENASA

Los bebederos y comederos deben lavarse periódicamente con detergente y cepillo.







El agua y alimento deben estar siempre limpios.

Fuente: INTA, ProHuerta y SENASA

Revisar las aves para detectar piojillos y otros parásitos externos.









Se puede colocar un cajón de cenizas para que los animales se revuelquen y se saquen los piojillos.

Fuente: INTA, ProHuerta y SENASA

Colocar un pediluvio en la entrada (recipiente con desinfectante en la entrada o con cal). Utilizar ropa exclusiva para el trabajo en el gallinero: guantes, botas, barbijo. Al terminar lavarse las manos con agua y jabón.





Al gallinero no deben entrar personas extrañas, animales domésticos ni aves silvestres.

Fuente: INTA, ProHuerta y SENASA

Por lo menos una vez al año hay que realizar el vacío sanitario, esto es: desocupar por unos 15 a 21 días el gallinero sacando animales e instalaciones. Limpiar y desinfectar.



Esto es muy efectivo para cortar el ciclo de los patógenos.

Fuente: INTA, ProHuerta y SENASA



Realizar las recolección de huevos por lo menos 2 a 3 veces al día para evitar suciedades y roturas

El almacenamiento de los huevos debe hacerse a 10-15 grados y 70-80% de Hm. Hay que tener en cuenta que su mayor calidad nutricional, sabor y aspecto es mayor apenas puestos.






Nunca deben estar expuestos a rayos solares ni a olores fuertes.

Fuente: INTA, ProHuerta y SENASA



En postura hay que asegurar <u>14hs por día</u> por lo que en invierno hay que agregar luz artificial.



Fuente: INTA, ProHuerta y SENASA

Cuando se adquieren animales siempre conviene dejarlos en "cuarentena" para asegurarse que no tengan enfermedades que puedan transmitirse al resto de los animales.



La compra o adquisición debe tratar de hacerse en lugares reconocidos.

Fuente: INTA, ProHuerta y SENASA

Evitar en todo momento situaciones de estrés: entrada de personas extrañas o animales domésticos en el gallinero, ruidos fuertes, entre otros.



Temperatura y humedad no adecuadas, falta de ventilación, de agua y alimentos son factores que contribuyen al estrés de los animales.

Fuente: INTA, ProHuerta y SENASA

ES CONVENIENTE VACUNAR SIEMPRE QUE SEA POSIBLE

CUANDO	TIPO DE VACUNA
A LOS 7 DÍAS	1º DOSIS CONTRA ENFERMEDADES DE ENCASTRE ASOCIADA A BRONQUITIS INFECCIOSA.
A LOS 30 DÍAS	2º DOSIS CONTRA NEWCASTLE.
A LOS 60 DÍAS	3º DOSIS CONTRA NEWCASTLE.
A LAS 6 SEMANAS	VACUNA CONTRA DIFTERO VIRUELA AVIAR.
A LAS 12 SEMANAS	REVACUNAR CONTRA DIFTERO VIRUELA AVIAR.
CADA 90 DÍAS	DURANTE EL PERÍODO DE POSTURA VACUNAR CONTRA ENFERMEDAD DE NEWCASTLE.



Fuente: INTA, ProHuerta y SENASA

PARA TENER EN CUENTA

Para tratar el tema de enfermedades, es conveniente un riguroso manejo sanitario que incluya tareas de prevención.

Éstas buscando evitar la entrada y propagación de enfermedades, el estrés de los animales y la falta de condiciones óptimas en general.

Fuente: INTA, ProHuerta y SENASA