
UNIVERSITÄTS MEDIZIN FRANKFURT
GOETHE UNIVERSITÄT



Umgang mit multiresistenten und anderen hygienerelevanten Erregern: Häma-Onko (Station+TK), ITS/IMC, Neonat.

Version: 012/02.2026
ID-Nr.: 361678
überprüft:
nur für den internen Gebrauch

Geltungsbereich: Universitätsmedizin Frankfurt

Erreger	Isolations-Form[1]	Abrüsten	Reinigung nach Verlegung[2]	Hygiene-maßnahmen	Umgang mit Kontaktpersonen	Bemerkung	Hygieneplan	Türbeschilderung
VRE[3] mit Resistenz gegen: Linezolid, Tigecyclin, Daptomycin **(=VRE +)**	Iso-/ Einzel-zimmer	Alle nicht geschützt gelagerten Materialien im Patientenzimmer desinfizieren (wenn möglich) oder verwerfen	Schlussdes-infektion mit Perform Pro 2%	✓ Persönliche Schutzausrüstung (Schutzkittel, Handschuhe am Patienten)	Isolation, wenn Kontakt mit Indexpatient >12 Stunden	Abstriche: Index: keine Entisolation Kontakt.: Entisolation, wenn 1x neg.	04 Basishygiene 5.12 Vancomycin-res. Enterokokken	
2MRGN NeoPäd	Bettplatz (Inkuba-tor, Wärme-bett)	Alle nicht geschützt gelagerten Materialien im Patientenzimmer desinfizieren (wenn möglich) oder verwerfen	Schlussdes-infektion mit Incidin Pro 0,5%	✓ Persönliche Schutzausrüstung (Schutzkittel, Handschuhe am Patienten)	Isolation, wenn Kontakt mit Indexpatient >12 Stunden	**Geltungsbereich** Neonatologie	04 Basishygiene 05.4 MRGN	
3MRGN **(keine Iso bei 3 MRGN E. coli in der Häma-Onko)**	Iso-/ Einzel-zimmer	Alle nicht geschützt gelagerten Materialien im Patientenzimmer desinfizieren (wenn möglich) oder verwerfen	Schlussdes-infektion mit Incidin Pro 0,5% Ausnahme: 3 MRGN ACBA mit Perform Pro 2%	✓ Persönliche Schutzausrüstung (Schutzkittel, Handschuhe am Patienten)	Isolation, wenn Kontakt mit Indexpatient >12 Stunden	Abstriche: Index: Entisolation, wenn 3x neg. (Abstand 1 Woche) Kontakt: Entisolation, wenn 1x neg.	04 Basishygiene 05.4 MRGN	
4MRGN[3]	Iso-/ Einzel-zimmer	Alle nicht geschützt gelagerten Materialien im Patientenzimmer desinfizieren (wenn möglich) oder verwerfen	Schlussdes-infektion Incidin Pro 0,5%	✓ Persönliche Schutzausrüstung (Schutzkittel, Handschuhe am Patienten)	Isolation, wenn Kontakt mit Indexpatient >12 Stunden	Abstriche: Index: Entisolation, wenn 3x neg. (Abstand 1 Monat) Kontakt: Entisolation, wenn 1x neg	04 Basishygiene 05.4 MRGN	
4MRGN[3] Acinetobacter baumannii (ACBA)/ Candida auris[3]	Iso-/ Einzel-zimmer	Alle nicht geschützt gelagerten Materialien im Patientenzimmer desinfizieren (wenn möglich) oder verwerfen	Schlussdes-infektion mit Perform Pro 2%	✓ Persönliche Schutzausrüstung (Schutzkittel, Handschuhe, MNS vor Betreten des Zimmers)	Isolation, wenn Kontakt mit Indexpatient >12 Stunden	Abstriche: Index: keine Entisolation Kontakt: 3x neg. (Abstand 1 Woche)	04 Basishygiene 05.11 Acinetobacter baumannii 05.4 MRGN	

Erreger	Isolations-Form[1]	Abrüsten	Reinigung nach Verlegung[2]	Hygiene-maßnahmen	Umgang mit Kontaktpersonen	Bemerkung	Hygieneplan	Türbeschilderung
		Wäsche: gelber Infektionswäsche-sack					5.17 Candida auris	
MRSA	Iso-/ Einzel-zimmer	Alle nicht geschützt gelagerten Materialien im Patientenzimmer desinfizieren (wenn möglich) oder verwerfen	Schlussdes-infektion Incidin Pro 0,5%	✓ Persönliche Schutzausrüstung (Schutzkittel, Handschuhe, MNS am Patienten)	Isolation, wenn Kontakt mit Indexpatient >12 Stunden	Dekolonisation: 5 Tage Abstriche: Index: Entisolation, wenn 3x neg. (Abstand ≥ 24 h) Kontakt: Entisolation, wenn 1x neg.	02.3 Dekolonisation von MRSA-Patienten 04 Basishygiene 05.3 Isolation bei MRSA	
Clostridioides difficile	Iso-/ Einzel-zimmer	Alle nicht geschützt gelagerten Materialien im Patientenzimmer desinfizieren (wenn möglich) oder verwerfen	Schlussdes-infektion mit Perform Pro 2%	✓ Erst Hände waschen, dann Hände-desinfektion ✓ Persönliche Schutzausrüstung (Schutzkittel, Handschuhe am Patienten)	Keine Iso, erst bei Auftreten von Symptomen	Entisolation: > 48 h Symptomfreiheit	04 Basishygiene 05.6 Isolation bei C. diff.	Innen  Außen 
Norovirus ***mit*** **Erbrechen und Diarrhoe**	Iso-/ Einzel-zimmer	Alle nicht geschützt gelagerten Materialien im Patientenzimmer desinfizieren (wenn möglich) oder verwerfen	Schlussdes-infektion mit Perform Pro 2%	✓ Persönliche Schutzausrüstung (Schutzkittel, Handschuhe, MNS vor Betreten des Zimmers)	Isolation, unabhängig von der Kontaktdauer	Entisolation: Index: Bis 3 d nach Symptomfreiheit Kontakt: Bis 3 d nach Symptomfreiheit	04 Basishygiene 05.5 Isolation bei Noro-/Rotaviren 05.1 Übertragungsweg-abhängige Isolierungsmaß-nahmen	

Erreger	Isolations-Form[1]	Abrüsten	Reinigung nach Verlegung[2]	Hygiene-maßnahmen	Umgang mit Kontaktpersonen	Bemerkung	Hygieneplan	Türbeschilderung
Norovirus ***ohne*** **Erbrechen und Diarrhoe**	Iso-/ Einzel-zimmer	Alle nicht geschützt gelagerten Materialien im Patientenzimmer desinfizieren (wenn möglich) oder verwerfen	Schlussdes-infektion mit Perform Pro 2%	✓ Persönliche Schutzausrüstung (Schutzkittel, Handschuhe am Patienten)	Isolation, unabhängig von der Kontaktdauer	Entisolation: Index: Bis 3 d nach Symptomfreiheit Kontakt: Bis 3 d nach Symptomfreiheit	04 Basishygiene 05.5 Isolation bei Noro-/Rotaviren 05.1 Übertragungsweg-abhängige Isolierungsmaß-nahmen	
Rotavirus	Iso-/ Einzel-zimmer	Alle nicht geschützt gelagerten Materialien im Patientenzimmer desinfizieren (wenn möglich) oder verwerfen	Schlussdes-infektion mit Incidin Pro 0,5%	✓ Persönliche Schutzausrüstung (Schutzkittel, Handschuhe am Patienten)	Isolation, unabhängig von der Kontaktdauer	Entisolation: Index: Bis 3 d nach Symptomfreiheit Kontakt: Bis 3 d nach Symptomfreiheit	04 Basishygiene 05.5 Isolation bei Noro-/Rotaviren 05.1 Übertragungsweg-abhängige Isolierungsmaß-nahmen	
Offene TBC	Iso-/ Einzel-zimmer	Alle nicht geschützt gelagerten Materialien im Patientenzimmer desinfizieren (wenn möglich) oder verwerfen Wäsche: gelber Infektions-wäschesack	Schlussdes-infektion mit Perform Pro 2%	✓ Persönliche Schutzausrüstung (Schutzkittel, Handschuhe, **FFP2** vor Betreten des Zimmers)	gem. 03.2 Untersuchung von Kontaktpersonen zu TBC	/	04 Basishygiene 05.7 Tuberkulose	
Influenza[4] **RSV[4]**	Iso-/ Einzel-zimmer	Alle nicht geschützt gelagerten Materialien im Patientenzimmer desinfizieren (wenn möglich) oder verwerfen	Schlussdes-infektion Incidin Pro 0,5%	✓ Persönliche Schutzausrüstung (Schutzkittel, Handschuhe, **FFP2/MNS[4]** vor Betreten des Zimmers)	Isolation, unabhängig von der Kontaktdauer	Entisolation: Index: Bis 3 d Symptomfreiheit Kontakt: Bis 3 d Symptomfreiheit	04 Basishygiene 05.8 Isolationsmaß-nahme bei Tröpfchenübertrag-baren Infektionen	

Erreger	Isolations-Form[1]	Abrüsten	Reinigung nach Verlegung[2]	Hygiene-maßnahmen	Umgang mit Kontaktpersonen	Bemerkung	Hygieneplan	Türbeschilderung
Hepatitis A+E	Iso-/ Einzel-zimmer	Alle nicht geschützt gelagerten Materialien im Patientenzimmer desinfizieren (wenn möglich) oder verwerfen	Schlussdes-infektion mit Perform Pro 2%	✓ Persönliche Schutzausrüstung (Schutzkittel, Handschuhe am Patienten) ✓ Desinfektion mit HD-Mittel voll viruzid (z.B. **Sterillium Virugard**)	Patienten, die innerhalb 7 d vor positivem IgM-Nachweis &/o. 7 d vor Auftreten des Ikterus mit einem virusaus-scheidenden Indexpat. >12 h im selben Zimmer gepflegt worden sind	Entisolation: Index: HAV: 1 Wo. nach Beginn des Ikterus HEV: 4 Wo. nach Beginn des Ikterus, (Immunsupp. ggf. länger) Kontakt: Wenn HEV über Stuhl ausgeschieden, dann Stuhl-Untersuchung von asympt. Kontaktpat. empfohlen	04 Basishygiene 05.10 Patienten mit Hep. A, E	
Hepatitis B+C+D+ HIV	Isolation nicht notwen-dig	Unterhalts-reinigung	/	✓ Basishygiene	/	/	04 Basishygiene 05.9 Patienten mit Hepatitis B, C, D und HIV	/
SARS-CoV-2	Iso-/ Einzel-zimmer	Alle nicht geschützt gelagerten Materialien im Patientenzimmer desinfizieren (wenn möglich) oder verwerfen	Schlussdes-infektion mit Incidin Pro 0,5%	✓ Persönliche Schutzausrüstung (**FFP2**, Schutzbrille, Haube, Schutzkittel, Handschuhe vor Betreten des Zimmers)	Isolation, unabhängig von der Kontaktdauer	Entisolation: gem. 05.8 Isolationsmaßnahme bei Tröpfchenübertrag-baren Infektionen	04 Basishygiene 05.8 Isolationsmaßnah me bei Tröpfchenübertrag baren Infektionen	
Auslands-iso: Risikogr. I Deutschland, Niederlande, skandinavische Länder	Keine Iso	Unterhalts-reinigung	/	✓ Basishygiene	/	/	02.4 MRE-Screening/Iso. von Pat. mit Vorbehandlung im Ausland/in Einrichtung mit häufigem MRE-Vorkommen	/

Erreger	Isolations-Form[1]	Abrüsten	Reinigung nach Verlegung[2]	Hygiene-maßnahmen	Umgang mit Kontaktpersonen	Bemerkung	Hygieneplan	Türbeschilderung
Risikogr. II Sonstige EU-Länder (außer Italien, Griechenland, Türkei), Kasachstan, Usbekistan, Russland, Nord- & Süd-Amerika, China, Japan, Australien	Iso-/ Einzel-zimmer, wenn stationär in II Keine Iso, wenn amb. in II	Je nach Abstrich-ergebnis, falls Ergebnis noch aussteht: Alle nicht geschützt gelagerten Materialien im Patientenzimmer desinfizieren (wenn möglich) oder verwerfen	Je nach Abstrich-ergebnis	✓ Persönliche Schutzausrüstung (Schutzkittel, Handschuhe, MNS am Patienten)	/	Wenn stat. in II, dann Entisolation wenn 1x neg. Abstriche: Auf MRSA + MRGN	04 Basishygiene 02.4 MRE-Screening/Iso. von Pat. mit Vorbehandlung im Ausland/in Einrichtung mit häufigem MRE-Vorkommen	
Risikogr. III Südostasien (z.B. Vietnam, Thailand, Indonesien), Italien, Griechenland, Türkei, Israel, Nahost/arabische Länder, gesamte afrikanische Kontinent, Indien, Pakist., Banglad., Afghanistan, Ukraine, Russland (bei Gefechts-verletzung)	Iso-/ Einzel-zimmer	Je nach Abstrich-ergebnis, falls Ergebnis noch aussteht: Alle nicht geschützt gelagerten Materialien im Patientenzimmer desinfizieren (wenn möglich) oder verwerfen	Schluss-desinfektion Incidin Pro 0,5%	✓ Persönliche Schutzausrüstung (Schutzkittel, Handschuhe, MNS am Patienten)	/	Wenn amb. in III, dann Entisolation, wenn 1x neg. Abstriche Wenn stat. in III, dann Entisolation nach 12 Monaten + neg. Abstriche Abstriche: Auf MRSA + MRGN Bei pos. Erregernachweis Umgang laut Erregerstatus	04 Basishygiene 02.4 MRE-Screening/Iso. von Pat. mit Vorbehandlung im Ausland/in Einrichtung mit häufigem MRE-Vorkommen	

[1] Neonatologische Bereiche: anstelle Einzelzimmerisolierung Bettplatzisolierung in Inkubator oder Wärmebett
[2] Neonatologische Bereiche: anstelle Perform Pro 2%: Dismozon 1,2%
[3]Info an zuständige Hygienefachkraft nach Entlassung folg. MRE-Patienten: VRE+, Candida auris, 4 MRGN: Klebsiella pneum. // Pseudomonas aeruginosa // Acinetobacter baumanii
[4]RSV: MNS // Influenza (saisonales Virus & geimpftes Personal): MNS // Influenza (Pandemievirus &/oder ungeimpftes Personal): FFP2