

Vektorji

Bor Bregant

1 Vektorji

Vektor je množica usmerjenih daljiv, ki imajo isto velikost in ležijo na vzporednih nosilkah. Operiramo le z enim predstavnikom vektorjev.

Vektorju $\vec{a} = \vec{AB}$ lahko določimo:

i Velikost: $|\vec{AB}| = d(A, B)$

ii Smer in usmerjenost: Določena s premico nosilko in usmerjenostjo

Vektorja sta enaka, če imata enako velikost, ležita na vzporednih premicah in sta enako usmerjena.

Operacije z vektorji

Seštevanje in odštevanje vektorjev

Dvočlena operacija, ki dvema vektorjema priredi nov vektor (vsoto). Operacija je komutativna in asociativna.

i Paralelogramsko pravilo

Slika

ii Trikotniško pravilo

Slika

Ničelni vektor $\vec{0} = \vec{AA} = \vec{AB} + \vec{BA}$

Nasprotni vektor za \vec{AB} je vektor \vec{BA} .

Enotski vektor je vektor z dolžino 1.

Razlika vektorjev je seštevanje nasprotnega vektorja.

Zgled. V pravilnem šestkotniku $ABCDEF$, zapiši vse vektorje, ki so enaki \vec{AB} . Zapiši še vse nasprotne vektorje vektorja \vec{SB} , kjer je S središče tega šestkotnika.

Zgled. V kvadratu $ABCD$ izračunaj $\vec{BC} + \vec{CD}$, ter $\vec{DB} - \vec{CB} + \vec{CD}$.

Zgled. V kocki $ABCD A'B'C'D'$ izračunaj vrednost izrazov $\vec{AD} + \vec{A'B'}$ in $\vec{AB} - \vec{D'A} + \vec{BB'}$.

Zgled. Izračunaj \vec{x} , če je $\vec{x} - \vec{AC} = -\vec{AB}$.

Naloga 1. DN 275b, 277bdf, 278e, 281ač. 283c

Množenje vektorja s številom (skalarjem)

$m \cdot \vec{a}$, kjer $m \in \mathbb{R}_{\neq 0}$ je vektor z enako smerjo kot \vec{a} , usmerjenost je odvisna od predznaka m , njegova velikost pa je enaka $|m| \cdot |\vec{a}|$. Za $|m| > 1$, se \vec{a} podaljša, za $0 < |m| < 1$, se \vec{a} skrajša.

i Asociativnost v skalarnem delju: $m(n\vec{a}) = (mn)\vec{a}$

ii Distributivnost v vektorskem delu: $m(\vec{a} + \vec{b}) = m\vec{a} + m\vec{b}$

iii Distributivnost v skalarnem delu: $(m + n)\vec{a} = m\vec{a} + n\vec{a}$

Iz vektorja \vec{a} lahko naredimo enotski vektor $\vec{e} = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$


2 Vektorji v prostoru

Bazo prostora sestavljajo trije neodvisni vektorji. Vsak vektor v prostoru lahko torej enolično zapišemo kot njihovo linearno kombinacijo.

Baza je ortogonalna, če so vektorji baze med sabo pravokotni. Baza je ortonormirana, če so vektorji pravokotni med sabo in dolžine 1.

Standardna baza je ortonormirana baza $\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$, kjer ti vektorji ležijo zaporedno na poltrakah koordinatnih osi x, y in z .

V tej standardni bazi, lahko vsako točko $A(a_1, a_2, a_3)$ predstavimo s krajevnim vektorjem $\vec{r}_A = a_1\vec{i} + a_2\vec{j} + a_3\vec{k}$. Pišemo $\vec{r}_A = (a_1, a_2, a_3)$. Posebej $\vec{i} = (1, 0, 0)$, $\vec{j} = (0, 1, 0)$ in $\vec{k} = (0, 0, 1)$.



Zgled. Poiščimo eno ortogonalno in eno neoortogonalno bazo kocke.

Računanje s krajevnimi vektorji:

$$(a_1, a_2, a_3) + (b_1, b_2, b_3) = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3)$$

$$n(a_1, a_2, a_3) = (na_1, na_2, na_3); n \in \mathbb{R}$$

Zgled. Zapišimo vektor daljice AB in krajevni vektor razpolovišča te daljice.
[Video rešitve](#)

Zgled. Dani sta točki $A(-2, 2, 6)$ in $B(3, 2, -4)$. Točka T leži na daljici AB , da $|AT| : |TB| = 4 : 1$. Izračunajmo koordinate T . [Video rešitve](#)

Zgled. Dana sta vektorja $\vec{a} = (3, -2, 0)$ in $\vec{b} = (-1, 4, 3)$. Zapišimo linearne kombinacije $\vec{a} + \vec{b}$ in $2\vec{a} - \frac{1}{2}\vec{b}$.

Zgled. Določimo parameter u , da bosta vektorja $\vec{a} = (4, -6, u)$ in $\vec{b} = (-6, 9, 4)$ kolinearna. [Video rešitve](#)

Zgled. Pokažimo, da so vektorji $\vec{a} = (1, -1, 3)$, $\vec{b} = (2, 1, 0)$ in $\vec{c} = (0, -3, 6)$ koplanarni. [Video rešitve](#)

Velja še, da je krajevni vektor r_T težišča T trikotnika ABC enak $r_T = \frac{1}{3}(r_A + r_B + r_C)$.

Naloga 1. NALOGE 321, 322, 324, 330, 340

3 Skalarni produkt

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos \varphi, \text{ kjer je } \varphi \text{ vmesni kot}$$


Dolžina pravokotne projekcije \vec{b} na \vec{a} je $pr_{\vec{a}}\vec{b} = |\vec{b}| \cos \varphi$.

Za skalarni produkt velja komutativnost, distributivnost in homogenost.

$$\vec{a} \perp \vec{b} \iff \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$$

$$\text{Dolžina vektorja } |\vec{a}| = \sqrt{\vec{a} \cdot \vec{a}}$$

$$\text{Kosinusni izrek } c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma$$



Zgled. Izračunajmo dolžino vektorja \vec{a} , če ima \vec{b} dolžino 6, njun skalarni produkt je enak 21, njun vmesni kot pa 60° . Izračunajmo še $pr_{\vec{a}}\vec{b}$. [Video rešitve](#)

Zgled. Dolžina vektorja \vec{a} je 3, $|\vec{b}| = 4$, dolžina $2\vec{a} - \vec{b}$ pa $\sqrt{76}$. Izračunajmo kot med \vec{a} in \vec{b} . [Video rešitve](#)

Zgled. V paralelogramu $ABCD$ je $a = 7\text{cm}$, $b = 4\text{cm}$, $\alpha = 36^\circ$. Izračunajmo dolžino diagonale f . [Video rešitve](#)

Naloga 1. 357a, 360c, 366 ampak izračunaj kot med a in b, 375ab, 377ab

3.1 Skalarni produkt v ortonormirani bazi

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3$$

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$$


$$\cos \varphi = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|} = \frac{a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} \sqrt{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2}}$$

Zgled. Za vektorja $\vec{a} = (2, 1, 4)$ in $\vec{b} = (1, 0, -1)$ izračunajmo $(2\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{b}$. [Video rešitve](#)

Zgled. Določimo komponento u , da bosta $\vec{a} = (-3, 2u, 5)$ in $\vec{b} = (6, u, 2)$ pravokotna. [Video rešitve](#)

Zgled. Naloga z mature 2021. [Video rešitve](#)

V ravnini, opremljeni s koordinatnim sistemom, sta narisana vektorja \vec{a} in \vec{b} . Narišite vektor $\vec{c} = \frac{1}{2}\vec{a} - \vec{b}$. Kolikšni sta dolžini vektorjev \vec{a} in \vec{b} ? Koliko meri kot φ med \vec{a} in \vec{b} ? Rezultat zaokrožite na stotinko stopinje.



Naloga 2. NALOGE 388 (razdalja=dolžina vektorja), 389 (enotski vektor=vektor/dolžina), 390ac, 393, 399, 405, 408, 414