


log2(mean normalised count + 1)
10
5
0
UBE2I
UBE2I-206
UBE2I-214
UBE2I-238
UBE2I-AS1-205
UBE2I-246
UBE2I-AS1-214
UBE2I-AS1-204
UBE2I-AS1-215
UBE2I-AS1-217
UBE2I-AS1-216
UBE2I-AS1-209
HCC827
H1975
gene
UBE2I-AS1-209 (-)
UBE2I-AS1-214 (-)
UBE2I-AS1-215 (-)
UBE2I-AS1-217 (-)
UBE2I-AS1-216 (-)
UBE2I-AS1-205 (-)
UBE2I-AS1-204 (-)
UBE2I-206 (+)
UBE2I-246 (+)
UBE2I-214 (+)
UBE2I-238 (+)
[0 - 8000]
HCC827 (mean of 3)
[0 - 8000]
H1975 (mean of 3)
1,284,019 bp
chr16
1,329,066 bp
lncRNA
protein coding


log2(mean normalised count + 1)
10
5
0
UBE2I
UBE2I-206
UBE2I-214
UBE2I-238
UBE2I-AS1-205
UBE2I-246
UBE2I-AS1-214
UBE2I-AS1-204
UBE2I-AS1-215
UBE2I-AS1-217
UBE2I-AS1-216
UBE2I-AS1-209
HCC827
H1975
gene
UBE2I-AS1-209 (-)
UBE2I-AS1-214 (-)
UBE2I-AS1-215 (-)
UBE2I-AS1-217 (-)
UBE2I-AS1-216 (-)
UBE2I-AS1-205 (-)
UBE2I-AS1-204 (-)
UBE2I-206 (+)
UBE2I-246 (+)
UBE2I-214 (+)
UBE2I-238 (+)
[0 - 8000]
HCC827 (mean of 3)
[0 - 8000]
H1975 (mean of 3)
1,284,019 bp
chr16
1,329,066 bp
lncRNA
protein coding