


UBE2I / UBE2I-AS1 · AS lncRNA | chr16:1,284,019-1,329,066
gene log2FC -0.95, FDR 0.0039 (DE) | lncRNA regulation
11 models (11 DE), non-DE isoforms hidden | * FDR < 0.05 | coverage: TMM-scaled depth, condition mean
Chromosome 16
gene
UBE2I-AS1-209 (-)
UBE2I-206 (+)
UBE2I-AS1-214 (-)
UBE2I-246 (+)
UBE2I-AS1-215 (-)
UBE2I-214 (+)
UBE2I-AS1-217 (-)
UBE2I-238 (+)
UBE2I-AS1-216 (-)
UBE2I-AS1-205 (-)
UBE2I-AS1-204 (-)
[0 - 8000]
TKI_sensitive (mean of 3)
[0 - 8000]
TKI_resistant (mean of 3)
1,284,019 bp
chr16
1,329,066 bp
lncRNA
protein coding


UBE2I / UBE2I-AS1 · AS lncRNA | chr16:1,284,019-1,329,066
gene log2FC -0.95, FDR 0.0039 (DE) | lncRNA regulation
11 models (11 DE), non-DE isoforms hidden | * FDR < 0.05 | coverage: TMM-scaled depth, condition mean
Chromosome 16
gene
UBE2I-AS1-209 (-)
UBE2I-206 (+)
UBE2I-AS1-214 (-)
UBE2I-246 (+)
UBE2I-AS1-215 (-)
UBE2I-214 (+)
UBE2I-AS1-217 (-)
UBE2I-238 (+)
UBE2I-AS1-216 (-)
UBE2I-AS1-205 (-)
UBE2I-AS1-204 (-)
[0 - 8000]
TKI_sensitive (mean of 3)
[0 - 8000]
TKI_resistant (mean of 3)
1,284,019 bp
chr16
1,329,066 bp
lncRNA
protein coding