

# Dekompozycja macierzy

2026

1. Znaleźć rozkład SVD dla macierzy:

$$\text{a) } A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

$$\text{b) } A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{bmatrix},$$

Rozkład SVD (rozkład według wartości osobliwych - *Singular Value Decomposition*) jest to rozkład macierzy  $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$  na trzy specyficzne macierze:  $U \in \mathbb{R}^{m \times m}$  - ortogonalna,  $\Sigma \in \mathbb{R}^{m \times n}$  - o postaci bliskiej do ortogonalnej,  $V \in \mathbb{R}^{n \times n}$  - ortogonalna.

$$A = U\Sigma V^T$$

2. Wyznaczyć rozkład Choleskiego macierzy:

$$\text{a) } A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix},$$

$$\text{b) } A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

$$\text{c) } A = \begin{bmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \end{bmatrix}.$$

Rozkład Choleskiego jest procedurą rozkładu symetrycznej, dodatnio określonej macierzy  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$  do iloczynu:

$$A = LL^T$$

gdzie macierz  $L$  jest macierzą trójkątną dolną, zatem:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} l_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ l_{21} & l_{22} & & \vdots \\ \vdots & \cdots & \cdots & \vdots \\ l_{n1} & l_{n2} & \cdots & l_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} l_{11} & l_{21} & \cdots & l_{n1} \\ 0 & l_{22} & & l_{n2} \\ \vdots & \cdots & \cdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & l_{nn} \end{bmatrix}$$

Przy takiej notacji łatwo zauważyć, że:

- $a_{11} = l_{11}^2 \rightarrow l_{11} = \sqrt{a_{11}},$
- $a_{21} = l_{21}l_{11} \rightarrow l_{21} = \frac{a_{21}}{l_{11}},$
- $\dots$

A w ogólności:

- $l_{ii} = \sqrt{a_{ii} - \sum_{k=0}^{i-1} l_{ik}^2},$
- $l_{ji} = \frac{a_{ji} - \sum_{k=0}^{i-1} l_{jk}l_{ik}}{l_{ii}}$

3. Wyznaczyć rozkład  $LU$  macierzy:

a)  $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix},$

b)  $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$

c)  $A = \begin{bmatrix} 5 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 4 \end{bmatrix},$

d)  $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}.$

Rozkład  $LU$  jest procedurą rozkładu macierzy  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$  do iloczynu:

$$A = LU$$

gdzie:  $L \in \mathbb{R}^{n \times n}$  - macierz trójkątna dolna,  $U \in \mathbb{R}^{n \times n}$  - macierz trójkątna górna.

Dekompozycji  $LU$  można dokonać metodą Doolittle'a - zakładając, że przekątna macierzy  $L$  wypełniona jest jedynkami, zatem:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ l_{21} & 1 & & \vdots \\ \vdots & \cdots & \cdots & \vdots \\ l_{n1} & l_{n2} & \cdots & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & \cdots & u_{1n} \\ 0 & u_{22} & & u_{2n} \\ \vdots & \cdots & \cdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & u_{nn} \end{bmatrix}$$

Wówczas dla  $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ :

- $u_{ij} = a_{ij} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik}u_{kj}, j \in i, i+1, \dots, n,$
- $l_{ji} = \frac{1}{u_{ii}}(a_{ji} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{jk}u_{ki}), j \in i+1, i+2, \dots, n$

**Odpowiedzi:**

$$\mathbf{1: a) } U = \begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{(2)} }{2} & 0 & -\frac{\sqrt{(2)} }{2} \\ -\frac{\sqrt{(2)} }{2} & 0 & \frac{\sqrt{(2)} }{2} \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \Sigma = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, V = \begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{(2)} }{2} & 0 & \frac{\sqrt{(2)} }{2} \\ -\frac{\sqrt{(2)} }{2} & 0 & -\frac{\sqrt{(2)} }{2} \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix},$$

$$\text{b) } U = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{(5)}} & \frac{2}{\sqrt{(5)}} \\ \frac{2}{\sqrt{(5)}} & -\frac{1}{\sqrt{(5)}} \end{bmatrix}, \Sigma = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}, V = \begin{bmatrix} \frac{5}{3\sqrt{(5)}} & 0 & -\frac{2}{3} \\ \frac{2}{3\sqrt{(5)}} & \frac{2}{\sqrt{(5)}} & \frac{1}{3} \\ \frac{4}{3\sqrt{(5)}} & -\frac{1}{\sqrt{(5)}} & \frac{2}{3} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{2: a) } L = \begin{bmatrix} \sqrt{(2)} & \frac{\sqrt{(2)} }{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{(2)} }{2} \end{bmatrix} \text{ b) } L = \begin{bmatrix} \sqrt{(2)} & \frac{\sqrt{(2)} }{2} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{(2)} }{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \text{ b) } L = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{3: a) } L = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}, U = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}, \text{ b) } L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, U = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

$$\text{c) } L = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ \frac{1}{35} & 1 & 0 \\ \frac{3}{5} & -\frac{9}{7} & 1 \end{bmatrix}, U = \begin{bmatrix} 5 & 3 & 2 \\ 0 & \frac{7}{5} & -\frac{2}{5} \\ 0 & 0 & \frac{16}{7} \end{bmatrix}, \text{ d) } L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

$$U = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix},$$