0.2 Temperatura di Equilibrio id due corpi a contatto termico

	Ora		Ora		Ora		Ora		Ora	
Alluminio		1		2		3		4		5
T circa 65 °C	10:05	70	10:22	64	10:38	65	10:56	66,8	11:12	69
T1	10:07	66	10:27	62	10:41	61,2	11:01	63,8	11:15	65,2
m_a *	10:10	202	10:27	201	10:34	203	10:53	202,5	11:09	202
m1	10:07	79,5	10:27	79,5	10:39	79,5	11:00	79,5	11:06	79,5
T_a	10:10	20	10:27	23	10:41	20,6	11:01	23,2	11:15	24,2
T_f	10:16	23,2	10:32	25,6	10:50	23,4	11:04	26	11:20	27

	Ora		Ora		Ora		Ora		Ora	
Ottone		1		2		3		4 (opzionale)		5 (opzionale)
T circa 65 °C	11:22	67	13:01	66						
T1	11:25	64	13:01	63,5						
m_a *	11:26	200,6	13:01	202,4						
m1	10:24	195,3	10:27	195,3						
T_a	11:28	20	13:02	21						
T_f	11:33	23,2	13:08	24,1						

	Ora		Ora		Ora		Ora		Ora	
Okite		1		2		3		4 (opzionale)		5 (opzionale)
T circa 65 °C	11:31	65	11:53	65	12:52	66				
T1	11:36	61	11:57	60,4	12:53	61,5				
m_a *	11:32	200	11:57	205,1	12:53	202				
m1	10:25	100,8	11:45	100,8	12:52	100,8				
T_a	11:33	23,6	11:57	24,4	12:54	24				
T_f	11:40	26,8	12:00	27,4	12:59	27,2				

	Ora		Ora		Ora		Ora		Ora	
Granito		1		2				4 (opzionale)		5 (opzionale)
T circa 65 °C	11:44	65	13:09	66						
T1	11:47	61,8	13:10	62						
m_a *	11:46	203,5	13:11	201,8						
m1	10:26	112,9	10:27	112,9						
T_a	11:48	25	13:11	24,6						
T_f	11:52	28,4	13:19	28,1						

0.3 Ghiaccio disciolto in acqua e calore latente

	Ora	1	Ora	2	Ora	3	Ora	4 (opzionale)	Ora	5 (opzionale)
m_a	12:08	197,8	12:25	198,8	12:36	214,5	12:47	200,8		
T_a	12:14	52	12:26	54	12:37	55,6	12:47	52		
m_g	12:16	70	12:28	70,3	12:38	69,3	12:48	70,6		
T_f	12:19	21,6	12:30	23	12:42	26	12:52	21,6		

0.7 Operazioni per Misura Massa Equivalente del thermos (opzionale)

	Ora	1	Ora	2	Ora	3	Ora	4 (opzionale)	Ora	5 (opzionale)
m2	13:20	100,5								
T2	13:22	4								
m1	13:20	110,6								
T1	13:21	44								
Tf	13:24	23								

Sequenza Operativa 1

pesa oggetti, riempire il thermos di acqua calda non abbondante, immersione oggetto nel thermos attesa 3 min, cambio di thermos con acqua a t ambiente (miurata), attesa 3 min, misura t finale

Sequenza Operativa 2

MIsura della temperatura ambiente: circa 1 ogni ora

	9:30	10:30	11:30	12:30
* = temperatura ambiente	23	24	24,4	24,4

NOTE

- Aumento della accurrateza delle misure aumentando il tempo di immersione del campione in acqua a temperatura ambiente
- 3 misure del calore specifico dell'okite contro i 2 di ottone e granito. Scelata giustificata perché l'okite è l'unico materiale di cui non si può sapere a priori valore di c

COMPONENTI DEL GRUPPO

Caporuscio Gabriele

Comandini Cesare

D'Agostino Niccolò

Di Noia Filippo

Data e ora di inizio

13/10/2026; 9:35/13:30

bagno di ghiaccio di pochi minuti (poca acqua t ambiente), pesa senza ghiaccio, tara, aggiunta del ghiaccio (t di circa 0 gradi fino a scioglimento ghiaccio), scolo acqua residua manualmente, metto ghia											