

Zestaw Problemów: Kinematyka

Numerowane zadania w części zadania egzaminacyjne są zadaniami, które mógłbyś spotkać podczas egzaminu (zauważ, że część z nich jest wzięta prosto z egzaminów). Pomiedzy zadaniami egzaminacyjnym dodałem kilka zadań, które mają pomóc ci zrozumieć szerszy kontekst problemu, te zadania nie są numerowane ale zaznaczyłem je **pogrubieniem**. Trudniejsze zadania zaznaczyłem na **zielono**, a najtrudniejsze na **czzerwono**. Powodzenia!

I. Zadania Egzaminacyjne

Zadanie 1. Rozważmy hipotetyczną sytuację, w której zawodnik z piłką znajdował się przez pewien czas w kabynie spadającej swobodnie z przyspieszeniem ziemskim \vec{g} . Kabina podczas spadania nie obraca się. W pewnym momencie piłkarz – znajdujący się w stanie nieważkości – lekko rzucił piłkę. Prędkość początkowa \vec{u}_0 rzuconej piłki, określona względem kabiny, ma kierunek równoległy do podłogi kabiny. Opory powietrza pomijamy. Ruch piłki w układzie odniesienia związanym z kabiną, od momentu odrzucenia jej przez zawodnika do chwili uderzenia piłki w ścianę kabiny, będzie odbywał się:

- A. wzdłuż linii prostej równoległej do podłogi kabiny, ze stałą prędkością.
- B. wzdłuż ramienia paraboli skierowanego w górę, z przyspieszeniem skierowanym w górę.
- C. wzdłuż ramienia paraboli skierowanego w dół, z przyspieszeniem skierowanym w dół.
- D. wzdłuż linii prostej równoległej do podłogi kabiny, z niezerowym przyspieszeniem.

Proszę podaj argumentacje swojej odpowiedzi.

Zadanie 2. Teraz studiujemy ruch tej samej piłki stojąc na Ziemi (wyobraź sobie, że kabina z zadania 1. spada na ziemię). Ruch piłki w naszym nowym układzie odniesienia, od momentu odrzucenia jej przez zawodnika do chwili uderzenia piłki w ścianę kabiny, będzie odbywał się (użyj odpowiedzi z zadania 1.): **A lub B lub C lub D?**

Zadanie Dodatkowe: wydaje mi się, że byłoby kształcące zobaczyć ten przykład w akcji. Najbliższym fizycznym przykładem w tym kontekście może być następujące: mamy pełną butelkę wody, w której zrobiliśmy kilka dziur (żeby umożliwić cieknięcie wody), studiujemy co się stanie jeżeli pionowo opuszczymy butelkę z okna budynku. Spróbuj, zrozumieć w jaki sposób ten przykład jest podobny do zadania 1. i 2., i wytłumacz co się stanie z wypływającą wodą podczas lotu butelki (pomiń opory powietrza). Na koniec obejrzyj następujący filmik (start 4:00):

<https://www.youtube.com/watch?v=0jjFjC30-4A>.

Powyższy przykład (patrz zadania 1 i 2) był studiowany już przez A. Einsteina około 1910 roku, tylko zamiast piłki Einstein rozważał ruch światła, doprowadziło go to do nowego rozumienia zasady równoważności (https://pl.wikipedia.org/wiki/Zasada_r%C3%B3wnowa%C5%BCno%C5%9Bci).

Zadanie 3. Dwaj kolarze zbliżali się do mety, jadąc jeden obok drugiego ruchem jednostajnym z prędkością 15 m/s . W odległości 100 m od mety jeden z nich przyspieszył i jadać ruchem jednostajnie przyspieszonym po sześciu sekundach minął metę. W jakiej odległości od mety znajdował się wówczas drugi kolarz jadący do końca z niezmienną prędkością?

- A. $2,5 \text{ m}$.
- B. 5 m .
- C. 10 m .
- D. 15 m .

Zadanie 4. Paweł szedł na Uniwersytet z prędkością o średniej wartości $(5/6) \text{ m/s}$. Kiedy dotarł na miejsce, okazało się, że z powodu pandemii Koronawirusa lekcje odwołano. Ile powinna wynieść średnia wartość prędkości, z jaką poruszał się w drodze powrotnej, aby na całej trasie wyniosła ona 4 km/h ?

- A. $3,5 \text{ km/h}$.
- B. 4 km/h .
- C. $4,5 \text{ km/h}$.
- D. 6 km/h .

Zadanie Dodatkowe: czy całkowita wartość prędkości średniej (4 km/h) jest arytmetyczną średnią wartości dwóch cząstkowych prędkości ($5/6 \text{ m/s}$ i twojej odpowiedzi), podaj argumentację swojej odpowiedzi.

Zadanie 5. Kamień został rzucony poziomo z prędkością 5 m/s. Po jakim czasie wektor jego prędkości będzie odchylony od pionu o 40° ?

A. 0,2 s.

B. 0,4 s.

C. 0,6 s.

D. 0,8 s.

Zadanie Dodatkowe: rozważmy teraz następującą hipotetyczną sytuację, w której obserwujemy i dokonujemy pomiarów ruchu kamienia z nowego układu odniesienia (nazwijmy go układem K). Początek oryginalnego układu oraz układu K pokrywa się w przestrzeni w czasie 0 s, dodatkowo mamy, że układ K porusza się względnie do układu oryginalnego z prędkością 5 m/s, która jest równoległa do początkowej prędkości kamienia. Po jakim czasie wektor prędkości kamienia mierzony z układu K będzie odchylony od pionu o 40° ?

Zadanie 6. Kamień został rzucony poziomo z prędkością 5 m/s. Jaka wartość prędkości będzie miał kamień kiedy wektor jego prędkości będzie odchylony od pionu o 40° ?

A. 1,2 m/s.

B. 3,4 m/s.

C. 5,6 m/s.

D. 7,8 m/s.

Zadanie Dodatkowe: jaką wartość prędkości, mierzoną w układzie K, będzie miał kamień kiedy wektor jego prędkości będzie odchylony od pionu o 40° w układzie K.

Zadanie 7. Oblicz wartość prędkości obiegu Ziemi wokół Słońca (odległość Ziemi od Słońca wynosi 150 mln km, symbol \sim oznacza około).

A. $\sim 1 \times 10^3$ km/h.


B. $\sim 10 \times 10^3$ km/h.

C. $\sim 100 \times 10^3$ km/h.

D. $\sim 1000 \times 10^3$ km/h.

Zadanie Dodatkowe: oblicz wartość prędkości obiegu Ziemi wokół Słońca jaką zmierzy statek kosmiczny (statek kosmiczny dokona pomiaru, gdy jego wektor prędkości będzie całkowicie przeciw-równoległy do wektora prędkości Ziemi wokół Słońca) uciekający z układu słonecznego z wartością prędkości 500 km/s względem ruchu Marsa (tutaj zakła-

dam, że prędkość względna statku jest mierzona z układu odniesienia na Marsie kiedy prędkość Marsa dookoła Słońca jest całkowicie przeciw-równoległa do prędkości statku kosmicznego; odległości Marsa od Słońca wynosi 57,7 mln km), kierunek wektora prędkości statku leży w płaszczyźnie układu słonecznego i jest skierowany promieniowo na zewnątrz. Co zmieniłoby się jeżeli statek miałby wartość prędkości 500 km/s względem ruchu Ziemi a nie Marsa (przedstaw jakościową odpowiedź). **Ważne:** w tym pytaniu zakładamy, że pomiary są dokonywane, gdy prędkości planet są przeciw-równoległe do prędkości statku kosmicznego (to znaczy planety i statek kosmiczny poruszają się wzdłuż tej samej osi w czasie pomiaru).



Rysunek 1: Ten rysunek dotyczy zadania 8.

Zadanie 8. Dwie przekładnie odpowiednio o promieniach $R_1 = 2\text{ cm}$, $R_2 = 10\text{ cm}$ obracają się w taki sposób, że punkty na ich styku nie ślizgają się po sobie. Wiedząc, że prędkość kątowna mniejszej przekładni wynosi $\omega_1 = 6.28\text{ rad/s}$ wyznacz okres obrotu przekładni większej.

- A. 5 s.
- B. 10 s.
- C. 12 s.
- D. 15 s.

Zadanie 9. Które z poniższych zdań są nieprawdziwe:

- A. w ruchu jednostajnym prostoliniowym prędkość rośnie proporcjonalnie do czasu;
- B. w ruchu jednostajnie zmiennym droga zmienia się proporcjonalnie do kwadratu czasu;
- C. prędkość liniowa w ruchu jednostajnym po okręgu związana jest z prędkością kątową następującą zależnością (gdzie symbole w równaniu mają swoje standardowe znaczenie): $\vec{v} = \vec{r} \times \vec{\omega}$;

D. wszystkie odpowiedzi są nieprawdive.

Zadanie 10. Jeżeli wiemy, że dwa identyczne ciała poruszają się ruchem jednostajnym po okręgu i ich prędkości kątowe są takie same, to możemy powiedzieć, że:

- A. prędkość liniowa pierwszego ciała jest większa od prędkości liniowej drugiego ciała;
 - B. prędkości liniowe obydwu ciał są różne;
 - C. prędkości liniowe obydwu ciał są sobie równe;
 - D. wszystkie odpowiedzi są nieprawdive.
-

Zadanie 11.

A. Przyspieszenie grawitacyjne ciał na dowolnej planecie można obliczyć, korzystając ze wzoru $g = \frac{GM}{R^2}$, gdzie G to stała grawitacji, M to masa planety, R to promień planety. Sprawdź, czy obliczając przyspieszenie, z tego wzoru, otrzymasz wynik w m/s^2 .

B. Woltomierz pozwala zmierzyć napięcie z dokładnością do 2%. Oblicz bezwzględną niepewność pomiaru, jeśli urządzenie podało wynik 235 V. Zapisz ten wynik wraz z niepewnością pomiarową.

C. Przeczytaj opis i odpowiedz, czy w danym przypadku można traktować poruszające się ciało jako punkt materialny podaj krótkie uzasadnienie: (i) samolot leci z Gdańska do Sztokholmu, (ii) podczas zawodów akrobatycznych samolot wykonał figurę zwaną korkociągiem.


Zadanie Dodatkowe: poszukaj w dostępnych źródłach informacji na temat cykloidy. Wskaż, gdzie pojawia się ta krzywa. **Podaj wzór opisujący tą krzywą?**

Zadanie 12. Kierowca samochodu jadącego z prędkością 80 km/h nacisnął hamulec, który zaczął działać, gdy samochód był w odległości 60 m od ronda. Samochód jechał po linii prostej ze stałym opóźnieniem i wjechał na rondo gdy jego prędkość spadła do 35 km/h. W czasie jazdy po rondzie samochód nie przyspieszał ani nie zwalniał.

A. Oblicz czas dojazdu do ronda i wartość opóźnienia samochodu podczas dojazdu.

Zadanie 13. Rzut z autu jest elementem gry w piłkę nożną i polega na wprowadzeniu piłki do gry z linii bocznej boiska. Podczas wykonywania autu piłkarz rzuca piłkę oburącz zza głowy.

A. Zawodnik podczas meczu wyrzuca piłkę z autu w kierunku poziomym. W momencie wyrzutu piłka znajduje się na wysokości $h = 1,96$ m ponad poziomą powierzchnią boiska. Oblicz czas lotu piłki od momentu wyrzutu do chwili uderzenia piłki o ziemię.



Rysunek 2: Schematyczny rysunek rzutu z autu.

B. Piłka wyrzucona poziomo z autu, z wysokości $h = 1,96$ m, spadła na boisko w odległości $x = 5,10$ m – jeśli zmierzyć w kierunku poziomym od miejsca wyrzutu (zobacz rys. 2). Oblicz wartość \vec{v}_0 prędkości początkowej piłki.

Zadanie 14. Płynąc z prądem rzeki, motorówka pokonuje pewną drogę w czasie 2 h. Pod prąd pokonanie tego samego odcinka zajmuje jej aż 4 h. W jakim czasie motorówka przebyłaby tę samą drogę po jeziorze?

Zadanie 15. Z dziurawej rynny co 0,5 s spada kropla wody. Czy dwie kolejne krople poruszają się względem siebie ruchem jednostajnym, czy jednostajnie przyspieszonym? Odpowiedź uzasadnij.

II. Zadania Matematyczne

Zadanie 16. Spróbuj opisać ruch piłki w 2 wymiarach (przedstawiony w zadaniach 1 i 2) za pomocą wektorów. To znaczy przedstaw równania ruchu piłki z dwóch układów odniesienia (odpowiednio z pytań 1 i 2). Wymagane terminy w równaniach nazwij odpowiednio według swoich upodobań. Wreszcie, czy mógłbyś użyć transformacji Galileusza do zmiany między układami odniesienia, jeśli tak, to w jaki sposób?

Zadanie 17. Dwie przykładowe wielkości skalarne w fizyce, które są zdefiniowane za pomocą iloczynu skalarnego wektorów, to praca i moc. Dla stałej siły: praca mechaniczna jest iloczynem skalarnym wektorów siły i przemieszczenia, a moc jest iloczynem skalarnym siły i prędkości.

- A.** Oblicz pracę wykonaną przez pole grawitacyjne podczas przemieszczania ciała z pozycji $(1, 1, 1)$ do $(0, 0, 0)$, tutaj pozycje są podane w metrach, przyjmij, że siła grawitacji jest podana przez $(-mg, 0, 0)$ gdzie m to masa ciała (przyjmij $m = 10 \text{ kg}$), a g to 10 m/s^2 .
- B.** Jaka jest średnia ilość energii w jednostce czasu przenoszona do tego ciała przez pole grawitacyjne podczas jego ruchu (przyjmij, że prędkość początkową ciała jest zerowa), który przedstawiono w poprzedniej części zadania.
-

Zadanie 18. Policz prędkość chwilową cząsteczki w ruch po okręgu w czasie t jeżeli prędkość kątowna ($\vec{\omega}$) oraz wektor położenia cząstki w czasie t mają następujące wartości (pracujemy w układzie Kartezjańskim): $\vec{\omega} = (A, B, C)$ i $\vec{r} = (AR/B, BR/C, CR/A)$

III. Zadania Teoretyczne

W tej sekcji przestudiujemy twierdzenie Buckingham. Twierdzenie Buckingham znane też jako twierdzenie pi jest kluczowym prawem stosowanym w analizie wymiarowej. Twierdzenie wprowadził E. Buckingham w 1914 roku. Stwierdza ono, że: jeżeli mamy jakieś równanie opisane przez pewną liczbę niezależnych parametrów fizycznych to równanie to możemy wyrazić przy pomocy modułów bezwymiarowych, których liczba równa jest liczbie tych parametrów fizycznych pomniejszonych o wymiary podstawowe. Twierdzenie Buckingham można najlepiej zrozumieć po rozwiązaniu kilku przykładów. Mamy nadzieję, że możemy rzucić okiem na to podczas naszych lekcji, zanim przejdziemy do poniższych problemów.

Zadanie 19/Rozgrzewka. Jednostki naturalne to układ jednostek zaproponowanych przez Maxa Plancka i będących kombinacjami uniwersalnych stałych fizycznych: stałej Plancka \hbar , stałej Grawitacji G i prędkości światła.

A. Napisz nazwę wielkości fizycznej, której jednostką jest $\sqrt{\frac{\hbar G}{c^5}}$, $\sqrt{\frac{\hbar G}{c^3}}$, $\sqrt{\frac{\hbar c}{G}}$. Uzasadnij odpowiedź.

B. Oblicz wartość liczbową tych jednostek w układzie SI (w czysto naturalnym układzie jednostek wszystkie jednostki są zwykle tak zdefiniowane, że wartości liczbowe wybranych stałych fizycznych w zakresie tych jednostek wynoszą dokładnie 1).

Zadanie 20. Możemy użyć analizy wymiarowej do oszacowania skali długości, l_P , na

której badanie grawitacji musi uwzględniać efekty kwantowe. Spekuluj, dlaczego możesz oczekiwać, że l_P zależy od trzech podstawowych stałych G , c i \hbar , tj. że powinno ich być funkcja f z:

$$f(l_P, G, c, \hbar) = \text{constans} . \quad (1)$$

Znajdź bezwymiarową kombinację l_P i trzech podstawowych stałych, a potem użyj analizy wymiarowej w celu oszacowania skali długości l_P (zwykle nazywanej długością Plancka). W jednostkach SI: $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2$, $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$, $h = 2\pi\hbar = 6.6310^{-34} \text{ Js}$.

Ciekawostka. W 1941 roku Sir Geoffrey I. Taylor wykorzystał analizę wymiarową do oszacowania energii uwolnionej podczas eksplozji bomby atomowej. Pierwsza bomba atomowa została zdetonowana w pobliżu Alamogordo w Nowym Meksyku 16 lipca 1945 r. W 1947 r. Filmy z eksplozji zostały odtajnione, co umożliwiło sir Geoffreyowi dokończenie analizy i oszacowanie energii uwolnionej podczas eksplozji, mimo że uwalnianie energii wciąż było sklasyfikowane. Rzeczywista uwolniona energia została później odtajniona, a jej wartość była niezwykle zbliżona do szacunków Taylora.

Należy zauważyć, że analiza wymiarowa jest bardzo potężnym narzędziem. Niektóre proste procesy fizyczne, które można badać za jego pomocą, to: wysokość fali w płytkiej wodzie, okres w prostym ruchu wahadłowym.