

### 3) Opérations sur les fonctions dérivées

Optionnel

Propriété : Soit  $f$  et  $g$  deux fonctions dérivables sur un intervalle  $I$  et  $k \in \mathbb{R}$ .

- ❖ La somme de  $f$  et  $g$  est dérivable sur  $I$  et sa dérivée est, pour tout  $x \in I$   $f'(x) + g'(x)$ .
- ❖ La fonction  $kf$  est dérivable sur  $I$  et sa dérivée est, pour tout  $x \in I$ ,  $k \times f'(x)$ .

Méthode : Calculer les dérivées de sommes, produits et quotients de fonctions  
Calculer les fonctions dérivées des fonctions suivantes :

- 1)  $f_1(x) = 5x^3$       2)  $f_2(x) = x^2 + x$       3)  $f_3(x) = \frac{1}{2}x^2$   
4)  $f_4(x) = x \times (3x + 4)$       5)  $f_5(x) = 2 \times (x^3 + x^2 + 1)$ .

## IV. Applications de la dérivée

### 1) Signe de la dérivée et sens de variation

Théorème :

Soit une fonction  $f$  définie et dérivable sur un intervalle  $I$ .

- ❖ Si, pour tout  $x \in I$ ,  $f'(x) \geq 0$ , alors  $f$  est croissante sur  $I$ .
- ❖ Si, pour tout  $x \in I$ ,  $f'(x) \leq 0$ , alors  $f$  est décroissante sur  $I$ .
- ❖ Si, pour tout  $x \in I$ ,  $f'(x) = 0$ , alors  $f$  est constante sur  $I$ .



Remarque :

Le **SIGNE** de la dérivée nous informe sur les **VARIATIONS** de la fonction.

Exemple :

Soit la fonction  $f$  définie sur  $[0; 10]$  par  $f(x) = 2x^2 - 8x + 1$ .

- 1) Calculer la fonction dérivée de  $f$ .
- 2) Déterminer le **signe** de  $f'$  en fonction de  $x$ .
- 3) Dresser le tableau de variations de  $f$ .

1) Pour tout  $x \in [0; 10]$ , on a :  $f'(x) =$  .

2) On commence par résoudre l'équation  $f'(x) = 0$ .

Soit :

Donc

La fonction  $f'$  est une fonction affine et  $f'(0) = -8$  donc négative en 0 et  $f'(3) = 4 \times 3 - 8 = 4 > 0$  en  $x = 3$ .

3) On peut donc dresser le tableau de signes et le compléter par le tableau de variations.

$x$	
$f'(x)$	⋮
$f$	

## 2) Etude des variations, extremum de fonction

### Propriété :

Lorsque la fonction dérivée  $f'$  s'annule et change de signe, la fonction atteint un extremum local.

### Exemple 1 :

Soit la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = x^3 + 2x^2 + 2x$ .

1) Calculer la fonction dérivée de  $f$ .

2) a. Montrer que  $f'(x) = 3 \left[ \left( x + \frac{2}{3} \right)^2 + \frac{2}{9} \right]$

b. En déduire le signe de  $f'$  en fonction de  $x$ .

3) Dresser le tableau de variations de  $f$ .

4) À l'aide de la calculatrice, représenter graphiquement la fonction  $f$  puis la tracer dans le cours.

### Exemple 2 :

Soit la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = x^3 + \frac{9}{2}x^2 - 12x + 5$ .

1) Calculer la fonction dérivée de  $f$ .

2) Montrer que  $f'(x) = 3(x + 4)(x - 1)$  puis, déterminer le signe de  $f'$  en fonction de  $x$ .

3) Dresser le tableau de variations de  $f$ .

4) À l'aide de la calculatrice, représenter graphiquement la fonction  $f$  puis la tracer dans le cours.