



ÉLEVAGE DE LA DYNASTIE D'ORKHAN

Livret d'information & Carnet de soins

Cavalier King Charles Spaniel

La race · l'arrivée du chiot · éducation & socialisation · prévention des morsures · alimentation · activité · hygiène & toilettage · vaccination · vermifuge · antiparasitaires · suivi vétérinaire · reproduction & stérilisation · sécurité · courbe de poids · check-list de suivi.

Document d'information établi conformément au contenu prévu par l'article 2 de l'arrêté du 31 juillet 2012 (art. L.214-8 du code rural et de la pêche maritime), remis en complément du certificat d'engagement et de connaissance et des documents de cession. À conserver tout au long de la vie du chien. Il complète, sans le remplacer, l'avis de votre vétérinaire traitant.

Édition 2026



- 1. Le Cavalier King Charles — caractéristiques & besoins
- 2. Coût d'entretien annuel estimé
- 3. L'arrivée du chiot — les premiers jours
- 4. Éducation & comportement
- 5. Socialisation
- 6. Prévention des morsures & sécurité des enfants
- 7. Alimentation
- 8. Activité physique selon l'âge
- 9. Hygiène & toilettage (1) — pelage, bain, poils, ongles
- 10. Hygiène & toilettage (2) — oreilles, yeux, dents, glandes anales
- 11. Vaccination
- 12. Vermifugation & antiparasitaires
- 13. Suivi vétérinaire, ostéopathie & repères physiologiques
- 14. Reproduction & stérilisation
- 15. Sécurité — aliments & dangers domestiques
- 16. Courbe de poids du Cavalier King Charles
- 17. Check-list de suivi (à compléter)
- 18. Sources & avertissement

◆ Comment utiliser ce livret

Les chapitres 1 à 16 expliquent tout ce qu'il faut savoir pour bien accueillir et accompagner votre Cavalier King Charles. Le chapitre 17 est une **check-list à compléter** (cochez et datez les étapes de soins au fil du temps). Conservez ce document avec le carnet de santé de votre chien.



Le Cavalier King Charles

Caractéristiques, besoins et organisation de vie

Petit épagneul d'origine britannique, le Cavalier King Charles a été sélectionné depuis des siècles comme chien de compagnie. Gai, doux et sociable, il aborde la vie avec une élégance tranquille.

Tempérament & besoins

- ◆ **Affectueux et très attaché** à sa famille : il recherche le contact et **supporte mal la solitude prolongée**. À habituer progressivement aux absences.
- ◆ **Grande capacité d'adaptation** : calme à la maison, joueur dehors ; convient à la famille, aux enfants (sous surveillance) et à la vie en appartement avec des sorties quotidiennes.
- ◆ **Sociable avec ses congénères et les autres animaux** lorsqu'il y est habitué jeune.
- ◆ **Sensible** : il s'éduque dans la douceur — une voix ferme suffit, jamais de brutalité.

Repères indicatifs de la race

Repère	Valeur indicative
Poids adulte	≈ 5,4 à 8 kg (poids courant souvent ≈ 7 kg femelle / 8 kg mâle)
Robe	Blenheim, Tricolore, Noir & feu, Rubis ; poil long et soyeux, sans boucle
Fin de croissance	≈ 12 mois
Longévité moyenne	≈ 12 à 14 ans

◆ Un compagnon, pas un gardien

Le Cavalier prévient volontiers de l'arrivée d'un visiteur mais n'est pas un chien de garde : c'est avant tout un chien d'agrément. Un suivi vétérinaire régulier (bilan annuel, dont un contrôle cardiaque) participe à le garder en pleine forme.



Accueillir un chien est un engagement sur 12 à 14 ans. Voici une estimation indicative du budget annuel d'entretien d'un Cavalier King Charles.

Poste	Estimation annuelle
Alimentation (chien adulte d'environ 7-8 kg)	300 - 450 €
Vétérinaire d'entretien (bilan annuel + vaccins)	100 - 180 €
Vermifuges + antiparasitaires externes	80 - 150 €
Hygiène & toilettage (produits, matériel)	50 - 150 €
Assurance santé animale (facultative)	150 - 400 €
Divers (accessoires, friandises, hygiène)	80 - 150 €
Total indicatif	≈ 760 - 1 480 € / an

◆ Frais de santé à prévoir en plus

Cette estimation ne comprend pas les frais de santé. **Des frais de santé, de valeur variable, sont de plus à prévoir** (maladie, accident, chirurgie, soins dentaires). Un budget de précaution ou une assurance est conseillé.

◆ Budget de départ (une seule fois)

Prévoir aussi l'équipement initial : couchage, gamelles, laisse et harnais, caisse de transport, brosse en soie et peigne, produits d'hygiène (oreilles, yeux, dents) — un budget ponctuel à l'arrivée du chiot.



L'arrivée du chiot

Les premiers jours dans son nouveau foyer

Un chiot qui change d'environnement a besoin de temps pour s'adapter. Patience et bienveillance sont les maîtres-mots des premières semaines.

La règle des 3 / 3 / 3

Délai	Ce qui se passe
3 jours — décompresser	Peut être dépassé, craintif, manger ou boire peu, se replier. C'est normal.
3 semaines — la routine	Commence à s'habituer, prend ses repères et montre sa personnalité.
3 mois — à la maison	Confiant, attaché à sa famille, installé durablement dans sa routine.

Le couchage & la gestion des absences

- ◆ Installez un **couchage fixe** (panier, tapis) dans un endroit calme. Le chiot peut être désorienté les premières nuits : un couchage près de vous au début, puis déplacé progressivement, l'aide à s'apaiser.
- ◆ **Habituez-le à rester seul par étapes** : commencez par de courtes absences. Évitez les départs et retours trop démonstratifs pour ne pas installer d'anxiété.
- ◆ Le Cavalier souffrant particulièrement de la solitude, ce travail précoce est essentiel pour son équilibre.

La propreté

- ◆ Un chiot ne maîtrise réellement sa propreté que vers **4 mois**. Sortez-le **après chaque repas, réveil et jeu**, et régulièrement dans la journée.
- ◆ **Récompensez immédiatement** dehors (voix chaleureuse, caresse). Ne grondez jamais après coup : il ne comprendrait pas.
- ◆ S'il a un accident à l'intérieur, nettoyez sans lui et sans le réprimander.



L'éducation du Cavalier repose sur la douceur, la cohérence et la récompense — jamais sur la force. Un cadre clair et stable le rassure et l'aide à grandir équilibré.

Le mordillement

Le chiot apprend à doser sa morsure (« morsure inhibée ») au contact de sa mère et de sa fratrie. S'il mordille trop fort, **dites « non » d'une voix ferme et interrompez aussitôt le jeu** ; reprenez quand il est calme. Évitez les jeux de tiraillement et de poursuite, qui encouragent la morsure.

Le jeu & la récompense

- ◆ Le jeu est essentiel à son développement. Privilégiez le **rapport d'objet** ; arrêtez le jeu s'il s'excite trop, reprenez au calme.
- ◆ **Récompensez à la fin du bon comportement** (caresse, voix, friandise sans excès) : c'est le moteur de l'apprentissage.
- ◆ La réprimande éventuelle doit rester **brève, calme et immédiate**. Une voix posée marque davantage qu'un cri.

Un cadre cohérent

- ◆ Fixez des **règles stables**, comprises par toute la famille (ce qui est permis l'est toujours, ce qui ne l'est pas ne l'est jamais).
- ◆ Des **repas à heure et lieu fixes**, un couchage attitré et des moments de calme respectés structurent sa journée.
- ◆ Travaillez tôt le **rappel** (« ici / au pied », voix enjouée, en vous accroupissant) et la **marche en laisse sans tirer**, par séances courtes (15-30 min) dans un endroit calme.

◆ L'approche recommandée

Privilégiez une éducation **positive et respectueuse**, idéalement accompagnée par un professionnel de l'éducation canine ayant une approche éthologique et bien-traitante. La patience et la régularité priment sur tout.



La socialisation se joue surtout entre la 3e et la 12e semaine. Bien menée, elle construit un chien confiant et équilibré pour toute sa vie.

Ce qu'il faut faire

- ◆ **Faire découvrir des environnements variés** : ville, campagne, rue, marché, voiture, bruits du quotidien.
- ◆ **Rencontrer des personnes de tous profils** (enfants, adultes, personnes âgées, à mobilité réduite) et d'autres animaux sains et vaccinés.
- ◆ **Habituer aux manipulations** très tôt : oreilles, yeux, bouche, pattes, brossage, séchage, prise de traitements — cela facilite tous les soins futurs.
- ◆ Multiplier les **expériences positives et progressives**, sans forcer : si le chiot a peur, on le rassure par le jeu ou une friandise plutôt qu'en le portant.

Pendant la primovaccination

Inutile d'attendre la fin des vaccins pour commencer : le bénéfice comportemental d'une socialisation précoce l'emporte largement, à condition de fréquenter des lieux non souillés et des animaux sains et à jour de leurs vaccins. La fenêtre se referme vite — c'est maintenant que tout se joue.

◆ Habituer à la voiture & au vétérinaire

Faites faire de **courts trajets en voiture** agréables (vers une promenade) pour éviter d'associer le véhicule au stress. Passez de temps en temps à la clinique simplement pour une pesée ou une caresse : le vétérinaire deviendra un lieu familier et non une source d'angoisse.



La plupart des morsures surviennent au domicile et touchent des enfants. La quasi-totalité est évitable : un chien prévient presque toujours avant de mordre.

Reconnaître les signes d'inconfort

Avant de mordre, le chien envoie des signaux : il se détourne, se lèche les babines, bâille, se gratte, montre le blanc de l'œil, baisse les oreilles, se fige ou grogne. **Ces signaux doivent être respectés** : ils disent que le chien a besoin d'espace.

Apprendre aux enfants

- ◆ **Ne jamais déranger** un chien qui dort, mange, ronge un objet ou s'occupe de ses petits.
- ◆ Ne pas l'approcher de face en le fixant dans les yeux ni se pencher au-dessus de lui ; le laisser **venir sentir** d'abord.
- ◆ **Toujours demander au propriétaire** avant de caresser un chien, et le caresser sur le côté ou le dos, jamais la tête.
- ◆ Face à un chien inconnu ou agité : rester calme, immobile, bras le long du corps, ne pas crier ni courir.
- ◆ **Toute interaction enfant-chien doit être supervisée** par un adulte.

◆ En cas de morsure

Laver la plaie à l'eau et au savon. Pour une plaie profonde, au visage, aux mains ou qui saigne : comprimer et **consulter un médecin sans délai** (vérifier la vaccination antitétanique). Faire évaluer le chien par un vétérinaire si nécessaire.

Fréquence des repas

Âge	Repas / jour
Jusqu'à 4 mois	3 à 4 repas (petit estomac, croissance rapide)
4 – 6 mois	3 repas
À partir de 6 mois	2 repas (matin et soir)

◆ Donnez un **aliment « croissance » de qualité, adapté aux chiots de petite race**, jusqu'à la fin de la croissance ($\approx$ 12 mois). Tout changement d'aliment se fait **progressivement, sur environ 7 jours**.

◆ **Eau fraîche à volonté**, renouvelée chaque jour. Une consommation soudainement excessive doit faire consulter.

◆ **Règle des 15 minutes** : laissez la gamelle 15 min puis retirez-la, même non terminée. Cela régule l'appétit et évite le grignotage.

◆ Repas **au calme**, à heure et lieu fixes. On ne donne rien à table, même exceptionnellement (mauvaise habitude difficile à corriger).

◆ Gardez le même aliment au départ

Votre chiot quitte l'élevage avec un **sac de l'aliment qu'il connaît déjà** : conservez ce même aliment (celui conseillé par l'élevage) pendant les premières semaines. Un changement brutal, ajouté au stress du départ, provoque très souvent des **troubles digestifs** (diarrhée, vomissements). Si vous souhaitez en changer ensuite, faites-le **très progressivement, sur 7 à 10 jours**, en mélangeant les deux aliments par proportions croissantes. En cas de troubles digestifs persistants, **consultez votre vétérinaire**.

◆ À ne jamais donner

De nombreux aliments humains sont toxiques pour le chien (chocolat, raisin, oignon/ail, xylitol...). La liste complète et la conduite à tenir figurent au **chapitre 15 — Sécurité**.

Activité physique selon l'âge

Protéger les articulations en croissance

Pendant la croissance, les cartilages sont fragiles. L'exercice doit rester mesuré : on privilégie des sorties courtes et régulières, et on évite les efforts violents avant la fin de la croissance (≈ 12 mois).

Activité	2-3 mois	4-5 mois	6 mois	dès 12 mois	dès 18 mois
Promenade en laisse	15-20 min	25-30 min	45 min	1 h et +	1 h et +
Jeux de balle (modérés)	5-10 min	15-20 min	25 min	30 min	45 min
Escaliers	interdit	interdit	modéré	ok	ok
Sauts / frisbee	interdit	interdit	interdit	20 min	40 min
Sports canins (agility...)	interdit	interdit	interdit	30 min	60 min

- ◆ **Privilégiez des promenades courtes et fréquentes**, à rythme libre, en laissant le chiot explorer et s'arrêter.
- ◆ **Évitez** escaliers répétés, sauts, courses longues et jeux brutaux tant que la croissance n'est pas terminée.
- ◆ Le jeu et l'exploration **fatiguent autant que la marche** : un chiot a aussi besoin de beaucoup de sommeil.

◆ Repère

Ces durées sont **indicatives** pour un chiot en bonne santé. Adaptez-les à votre chiot et demandez conseil à votre vétérinaire, surtout en cas de fatigue, de boiterie ou d'essoufflement.

Hygiène & toilettage (1)

Pelage, bain, poils et ongles

Le Cavalier ne nécessite pas de tonte, mais un entretien régulier de son poil long et soyeux. Le toilettement vous-même est un moment de complicité — et le résultat s'améliore à chaque fois.

Le pelage

- ◆ **Brossage au moins une fois par semaine** (tous les jours en période de mue), puis peignage des zones à nœuds : oreilles, plastron, culotte arrière.
- ◆ Utilisez une **brosse en soie ou en sanglier** et un **peigne à dents écartées** ; évitez la **carde métallique**, qui casse et arrache le poil.

Le bain

- ◆ Bain régulier (jusqu'à tous les 1 à 2 mois) avec un **shampooing pour chien** dilué, suivi d'un **après-shampooing pour chien**.
- ◆ **Rinçage soigneux** à l'eau tiède en évitant les yeux et les oreilles, puis **séchage complet au sèche-cheveux** (température douce) pour un poil lisse et lustré.
- ◆ Bien sécher avant toute sortie par temps froid : le Cavalier **craint le froid et l'humidité**.

Les poils & les ongles

- ◆ **Les poils ne se coupent pas**, sauf sous les pattes et entre les coussinets (terre, cailloux), légèrement autour des pieds pour un aspect arrondi mais emplumé, et le bas des oreilles si effiloché.
- ◆ **Ongles** : couper **très peu à la fois** avec une pince adaptée, en évitant la **veine** à l'intérieur de l'ongle (saignement). Commencer jeune ; idéalement une fois par semaine.
- ◆ **Mâles** : entre deux bains, passer un gant humide sur le ventre pour enlever les traces d'urine qui jaunissent le poil.

◆ Ne jamais tondre le Cavalier — même en été

Tondre un Cavalier en pensant le rafraîchir l'été est une **fausse bonne idée**. Le poil ne sert pas qu'à tenir chaud : il **protège du soleil et participe à la régulation de la température**. Tendu, le chien est en réalité plus exposé aux **coups de chaleur et aux coups de soleil** (peau fragile), et le poil **repousse souvent terne, abîmé ou de façon inégale**. Pour l'aider quand il fait chaud : ombre, eau fraîche à volonté, sorties aux heures fraîches et brossage régulier.

Hygiène & toilettage (2)

Oreilles, yeux, dents et glandes anales

Les oreilles

- ◆ À **contrôler et nettoyer une fois par semaine** : les oreilles tombantes du Cavalier favorisent cire et otites.
- ◆ Verser un **nettoyant auriculaire adapté** dans le conduit, masser la base de l'oreille, laisser le chien se secouer, essuyer l'excédent au coton. **Jamais de coton-tige** dans le conduit.
- ◆ Oreille saine = pavillon clair et inodore. Grattage, secouements de tête, écoulement ou odeur → consulter.

Les yeux

- ◆ Nettoyer régulièrement (souvent quotidiennement) avec un **sérum physiologique** et une compresse différente pour chaque œil.
- ◆ Des lotions existent pour atténuer les **traces de larmes** sur les joues (Blenheim, tricolores). Œil rouge, fermé ou douloureux → consulter.

Les dents

- ◆ **Brossage idéalement plusieurs fois par semaine** (voire quotidien si possible) avec brosse et dentifrice pour chien ; à défaut, un brossage hebdomadaire reste préférable à rien. Préviennent tartre et maladie parodontale (fréquente et néfaste pour la santé générale).
- ◆ En complément : croquettes, lamelles ou solutions dentaires adaptées. Un **détartrage vétérinaire** peut être nécessaire selon l'état dentaire.

Les glandes anales

- ◆ Situées de part et d'autre de l'anus, elles peuvent s'engorger. **À surveiller** (signe du « traîneau », léchage excessif, gêne ou mauvaise odeur). **Ne pas vider systématiquement** en l'absence de signe : demandez conseil à votre vétérinaire ou à un toiletteur formé.

◆ Habituer dès le plus jeune âge

Tous ces soins se passent d'autant mieux que le chiot y est **habitué tôt et en douceur**. Faites-en des moments calmes et positifs, récompensés — ils renforcent aussi votre complicité.

Les anticorps de la mère neutralisent une partie des premiers vaccins : le chiot reçoit donc plusieurs injections espacées, la dernière à 16 semaines ou plus. Le calendrier précis est fixé par votre vétérinaire.

Calendrier du chiot

Âge	Acte recommandé
6-8 sem.	1re injection CHP (Carré, Hépatite de Rubarth, Parvovirose) ± Parainfluenza. Réalisée à l'élevage.
10-12 sem.	2e injection CHPPi + 1re Leptospirose .
14-16 sem.	2e Leptospirose + dose finale CHP (à 16 sem. ou plus), selon le vaccin et le protocole de votre vétérinaire.
≥ 12 sem.	Rage : nécessaire pour voyager (passeport européen) ; voir ci-dessous.

Rappels après la primovaccination

Échéance	Vaccins
1er rappel — vers 12 mois	CHPPi + Leptospirose. <i>Un rappel précoce vers 6 mois (26e sem.) reste possible selon le vétérinaire.</i>
2e rappel — à 2 ans	CHPPi + Leptospirose.
Ensuite (selon le vétérinaire)	Carré, Hépatite, Parvovirose (vaccins essentiels) tous les 3 ans ; Leptospirose chaque année ; Parainfluenza chaque année si exposition (pension, regroupements).

◆ Avant & après l'injection • Rage

Le chiot doit être **en bonne santé et déparasité** (vermifuge idéalement 8 jours avant) ; laissez-le **au repos 24 h** après l'injection. **Rage** : obligatoire pour voyager dans l'UE ou à l'étranger (passeport européen, identification) ; elle peut aussi être exigée par certaines pensions, campings ou assurances. **En cas de retard de rappel**, le protocole peut devoir être adapté, voire repris selon la valence concernée : demandez conseil à votre vétérinaire.

Vermifugation & antiparasitaires

Parasites internes et externes

Près d'un animal sur deux est porteur de vers, souvent sans symptôme. Certains parasites sont transmissibles à l'homme (enfants surtout) : un traitement régulier protège le chien et la famille.

Vermifugation (parasites internes)

Période	Protocole
2 sem. → 3 mois	Dès le 14 ^e jour, puis toutes les 2 semaines . Réalisé à l'élevage.
3 → 6 mois	Une fois par mois.
Adulte (à partir de 6 mois)	4 fois par an. Une fréquence plus rapprochée peut être conseillée par votre vétérinaire en cas de risque particulier (jeunes enfants au foyer, alimentation crue non sécurisée, chasse/proies, vie en collectivité ou expositions fréquentes).

◆ Utiliser une **molécule adaptée** aux parasites ciblés et au **poids réel** du chien ; l'alternance éventuelle des molécules se fait sur conseil vétérinaire.

◆ À partir de 6 mois, une **analyse de selles (coproscopie)** permet de cibler le traitement.

Antiparasitaires externes (puces & tiques)

Profil	Protocole
Chiot	Dès l'âge / le poids minimal indiqué sur le produit (souvent ≈ 8 sem.).
Adulte	Couverture mensuelle ou produit longue durée (comprimé ≈ 12 sem., collier 6-8 mois).

◆ Traiter tout le foyer

Puces présentes **toute l'année** (chauffage), tiques surtout du printemps à l'automne. L'animal ne porte qu'une fraction de l'infestation : traiter **tous les animaux** du domicile et l'**environnement**. Inspecter les oreilles tombantes et les franges après chaque sortie et retirer toute tique sans tarder.



Visites d'entretien

- ◆ **Bilan annuel** de santé, couplé au rappel vaccinal (poids, dents, cœur, palpation).
- ◆ **Contrôle cardiaque annuel** dès l'âge adulte, recommandé chez le Cavalier.
- ◆ **Senior** (≈ 7 ans et +) : **2 visites par an** ; bilan sanguin conseillé.

Ostéopathie

- ◆ **1 séance dans la 1re année** pour vérifier l'équilibre et les aplombs, puis **1 à 2 fois par an** en préventif.
- ◆ Soins **complémentaire** qui ne remplace pas la consultation vétérinaire ; repos 2-3 jours après une séance.

Repères physiologiques (indicatifs)

Paramètre	Valeur de repère
Température rectale	38 – 39 °C
Fréquence cardiaque	≈ 70 – 140 / min (plus élevée chez le chiot et les petits gabarits)
Fréquence respiratoire au repos	≈ 10 – 30 / min

Équivalence d'âge (petit chien)

Âge du chien	1 an	2 ans	4 ans	7 ans	10 ans	14 ans
≈ âge humain	20	28	36	48	60	76



Faire reproduire ou stériliser son chien est une décision importante. Voici des repères neutres — la décision se prend au cas par cas avec votre vétérinaire.

Quelques repères de reproduction

- ◆ **Puberté** vers 6-12 mois ; chez la femelle, **chaleurs en général 2 fois par an** (≈ 21 jours). La période fertile varie beaucoup d'une chienne à l'autre : en cas de projet de reproduction, un **suivi vétérinaire (dosage de progestérone)** est recommandé.
- ◆ **Faire reproduire est un acte réfléchi** : pensez au devenir des chiots (alimentation, identification, inscription, vaccination, éducation, placement) et au cadre réglementaire de la vente.

Stérilisation : ce qu'il faut savoir

Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 31 juillet 2012, l'éleveur **encourage à envisager la stérilisation** et vous invite à en parler à votre vétérinaire. C'est une décision individualisée :

- ◆ **Femelle** : à discuter avec le vétérinaire, souvent **environ 2 mois après les chaleurs** (hors période hormonale défavorable) ; un calendrier précoce peut réduire le risque de tumeurs mammaires.
- ◆ **Mâle** : généralement envisageable **vers 10-12 mois**, selon le développement et l'avis vétérinaire ; le bénéfice médical reste à évaluer au cas par cas.
- ◆ **À anticiper** : possible prise de poids (adapter la ration), parfois modification du poil ; incontinence surtout chez les grandes races. La castration chimique réversible permet parfois de « tester » au préalable.

◆ En pratique

Il n'existe pas de réponse unique : âge, sexe, caractère, mode de vie et projet (reproduction ou non) entrent en compte. **Discutez-en avec votre vétérinaire**, qui vous orientera vers la solution la plus adaptée à votre chien.



Certains aliments et produits courants sont toxiques, parfois mortels même en petite quantité. À garder hors de portée.

ALIMENTS TOXIQUES — JAMAIS

- ◆ Chocolat et cacao
- ◆ Raisins, raisins secs, groseilles
- ◆ Oignon, ail, poireau, ciboulette
- ◆ Xylitol (chewing-gums, bonbons sans sucre)
- ◆ Avocat, noyaux, noix de macadamia
- ◆ Alcool, caféine, sel en excès
- ◆ Os cuits, pâte à pain crue levée, aliments moisiss

DANGERS MAISON & JARDIN

- ◆ Plantes : laurier-rose (même l'eau du vase), muguet, if, tulipe, azalée, dieffenbachia...
- ◆ Fumée & nicotine : cigarettes, mégots, vapotage
- ◆ Produits ménagers, capsules de lessive, antigel
- ◆ Médicaments humains (paracétamol, ibuprofène...)
- ◆ Piles, peintures, pesticides, engrais, algues bleues

◆ En cas d'ingestion — les bons réflexes

NE PAS faire vomir sans avis vétérinaire. Notez le produit, la quantité et l'heure, gardez l'emballage, puis contactez **immédiatement** votre vétérinaire ou un centre antipoison vétérinaire :

- **CNITV (Lyon) : 04 78 87 10 40** — 7j/7 de 8h30 à minuit (service payant)
- **CAPAE-Ouest (Nantes) : 02 40 68 77 40**


◆ Prévenir

Rangez tout hors de portée (placards, poubelles fermées), surveillez constamment, et n'utilisez que des produits « pet-safe ». Ne donnez que des aliments adaptés au chien.

◆ À éviter (sans être toxiques)

Le **lait de vache**, les aliments très **gras, salés ou épicés** ne sont pas des poisons, mais provoquent des troubles digestifs : à éviter, ou à ne donner que sur avis vétérinaire.

Courbe indicative de 3 à 12 mois (identique pour les mâles et les femelles). La zone dorée représente la fourchette de poids attendue. C'est un repère, non une norme stricte.



Âge	Poids attendu
3 mois	2,6 – 3,6 kg
6 mois	4,7 – 6,4 kg
12 mois (fin de croissance)	5,9 – 8,2 kg

◆ Bien utiliser la courbe

Pesez régulièrement votre chiot et situez-le dans la zone dorée. Un poids un peu hors fourchette n'est pas alarmant en soi, mais un écart marqué ou une cassure de la courbe justifie d'**adapter la ration** et d'en **parler à votre vétérinaire**.

Nom du chiot : Date de naissance :

À L'ARRIVÉE

FAIT LE

- ☐ **2e vaccin** CHPPi + Leptospirose vers 10-12 semaines
- ☐ **Vermifuge mensuel** jusqu'à 6 mois
- ☐ **Antiparasitaire externe** adapté à l'âge / au poids
- ☐ Mise à jour **carnet de santé / passeport** et identification (puce)
- ☐ **4 repas/jour** d'aliment croissance

AVANT 6 MOIS

FAIT LE

- ☐ **3e vaccin** à 16 semaines ou plus + **2e Leptospirose** selon protocole vétérinaire
- ☐ **1re séance d'ostéopathie**
- ☐ Passage à **3 puis 2 repas/jour**
- ☐ **1er rappel vaccinal** (vers 6 à 12 mois, selon le vétérinaire)

CHAQUE ANNÉE (ADULTE)

FAIT LE

- ☐ **Bilan vétérinaire annuel** + rappels Leptospirose / Parainfluenza
- ☐ **Contrôle cardiaque** annuel
- ☐ **Vermifuge** 4 fois par an (plus si conseillé par le vétérinaire)
- ☐ **Antiparasitaire** : couverture mensuelle / longue durée
- ☐ **Ostéopathie préventive** 1 à 2x/an

TOUS LES 3 ANS

FAIT LE

- ☐ **Rappel des vaccins essentiels** (Carré / Hépatite / Parvovirose) — ou titrage



- ◆ **Société Centrale Canine** / Club de race (Club des Épagneuls Nains Anglais) — description, comportement et standard du Cavalier King Charles.
- ◆ **WSAVA** (2024) — recommandations de vaccination du chien (primovaccination, dose finale $\geq$ 16 sem., intervalle 3 ans des vaccins essentiels).
- ◆ **ESCCAP** (2025) — lutte contre les parasites internes (GL1) et externes (GL3).
- ◆ **CNITV** — Centre National d'Informations Toxicologiques Vétérinaires (VetAgro Sup, Lyon), 04 78 87 10 40.
- ◆ **CAPAE-Ouest** — Centre antipoison animal et environnemental de l'Ouest (Oniris, Nantes), 02 40 68 77 40.
- ◆ **SVK-ASMPA** — position sur la castration/stérilisation du chien et du chat.
- ◆ Fiches conseils vétérinaires (hygiène, dentaire, vermifugation), prévention des morsures (sensibilisation enfants), et recommandations de toilettage du Cavalier King Charles.

◆ Avertissement

Document d'information à visée pédagogique remis en application de l'article 2 de l'arrêté du 31 juillet 2012. Il **complète, sans le remplacer, l'avis de votre vétérinaire traitant** : les protocoles exacts (molécules, doses, calendrier) relèvent de sa prescription, en tenant compte du mode de vie, de la région, de l'état de santé de l'animal et de la réglementation en vigueur. Les estimations de coût et la courbe de poids sont **indicatives et non contractuelles**.