

# 1 一元函数微分学的计算

## 1.1 基本求导公式

1.  $(x^a)' = ax^{a-1}$  ( $a$  为常数)
2.  $(a^x)' = a^x \ln a$  ( $a > 0, a \neq 1$ )
3.  $(e^x)' = e^x$
4.  $(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$  ( $a > 0, a \neq 1$ )
5.  $(\ln |x|)' = \frac{1}{x}$

### 6. 三角函数求导

- $(\sin x)' = \cos x$
  - $(\cos x)' = -\sin x$
  - $(\tan x)' = \sec^2 x$
  - $(\cot x)' = -\csc^2 x$
  - $(\sec x)' = \sec x \tan x$
  - $(\csc x)' = -\csc x \cot x$
  - $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
  - $(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
  - $(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$
  - $(x)' = -\frac{1}{1+x^2}$
7.  $[\ln(x + \sqrt{x^2 + 1})]' = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}}$
  8.  $[\ln(x + \sqrt{x^2 - 1})]' = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}}$

## 1.2 四则运算

1.  $(u \pm v)' = u' \pm v'$
2.  $d[u(x) \pm v(x)] = d[u(x)] \pm d[v(x)]$
3.  $(uv)' = u'v + uv'$
4.  $d[u(x)v(x)] = u(x)d[v(x)] + v(x)d[u(x)]$

$$5. \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2} \quad (v \neq 0)$$

$$6. d\left[\frac{u(x)}{v(x)}\right] = \frac{v(x)d[u(x)] - u(x)d[v(x)]}{[v(x)]^2} \quad v(x) \neq 0$$

### 1.3 复合函数的导数与微分形式不变性

设  $u = g(x)$  在点  $x$  处可导,  $y = f(u)$  在点  $u = g(x)$  处可导, 则

- $\{f[g(x)]\}' = f'[g(x)]g'(x)$
- $d\{f[g(x)]\} = f'[g(x)]g'(x)dx = f'[g(x)]d[g(x)]$

### 1.4 分段函数的导数

设

$$f(x) = \begin{cases} f_1(x), & x \geq x_0, \\ f_2(x), & x < x_0, \end{cases}$$

其中  $f_1(x)$ 、 $f_2(x)$  分别在  $x > x_0$  与  $x < x_0$  时可导, 则:

① 在分段点  $x_0$  处, 用导数定义求导:

$$f'_+(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f_1(x) - f(x_0)}{x - x_0}, \quad f'_-(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f_2(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

根据  $f'_+(x_0)$  是否等于  $f'_-(x_0)$  来判定  $f'(x_0)$

② 在非分段点用导数公式求导:

$$\begin{cases} x > x_0, & f'(x) = f'_1(x), \\ x < x_0, & f'(x) = f'_2(x). \end{cases}$$

### 1.5 反函数的导数

1. 设  $y = f(x)$  为单调且可导函数, 并且  $f'(x) \neq 0$ , 则存在反函数  $x = \varphi(y)$ , 且

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}} = \frac{1}{f'(x)},$$

即

$$\varphi'(y) = \frac{1}{f'(x)}.$$

$$2. y = f(x), x = \varphi(y), \varphi'(y) = -\frac{f''(x)}{[f'(x)]^3}$$

$$3. y''_{xx} = -\frac{x''_{yy}}{(x'_y)^3}$$

$$4. x''_{yy} = -\frac{y''_{xx}}{(y'_x)^3}$$

## 1.6 隐函数求导法

设函数  $y = f(x)$  是由方程  $F(x, y) = 0$  确定的可导函数, 则

- ① 方程  $F(x, y) = 0$  两边对自变量  $x$  求导, 注意  $y = y(x)$ , 即将  $y$  看作中间变量, 得到一个关于  $y'$  的方程
- ② 解该方程便可求出  $y'$

## 1.7 参数方程所确定的函数的导数

设函数  $y = y(x)$  由参数方程

$$\begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t) \end{cases}$$

所确定, 其中  $t$  为参数, 且  $\varphi(t)$ 、 $\psi(t)$  均可导, 并且  $\varphi'(t) \neq 0$ , 则

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}.$$

## 1.8 对数求导法

对于多项相乘、相除、开方、乘方的式子, 一般先取对数再求导。设  $y = f(x)$  (其中  $f(x) > 0$ ), 则

- ① 等式两边取自然对数, 得

$$\ln y = \ln f(x).$$

- ② 两边对自变量  $x$  求导 (注意  $y = y(x)$ , 将  $y$  视为中间变量), 得

$$\frac{1}{y} y' = [\ln f(x)]'.$$

因此

$$y' = y \frac{f'(x)}{f(x)}.$$

## 1.9 幂指数函数求导法

对于  $u(x)^{v(x)}$  ( $u(x) > 0$ , 且  $u(x) \neq 1$ ), 除了用上面的对数求导法, 还可以先化成指数函数

$$u(x)^{v(x)} = e^{v(x) \ln u(x)}$$

然后求导

### 1.10 ★ 高阶导数

### 1.11 ★ 高阶导数

### 1.12 基础概念

### 1.13 结论

### 1.14 定理

### 1.15 运算

### 1.16 公式

$$1. [\ln(x + \sqrt{x^2 + a^2})]' = \frac{1}{\sqrt{x^2 + a^2}}$$

$$2. (x \ln x)' = \ln x + 1$$

$$3. \left(\frac{1}{x} \ln x\right)' = -\frac{1}{x^2} \ln x + \frac{1}{x^2}$$

### 1.17 方法总结

### 1.18 条件转换思路

### 1.19 理解