

# 1 一元函数积分学的计算

## 1.1 基本积分公式

1.  $\int x^k dx = \frac{1}{k+1} x^{k+1} + C, k \neq -1$

2.  $\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$

### 3. 指数函数的积分

- $\int e^x dx = e^x + C$

- $\int a^x dx = \frac{1}{\ln a} a^x + C, a > 0 \text{ 且 } a \neq 1$

### 4. 三角函数的积分

- $\int \sin x dx = -\cos x + C$

- $\int \cos x dx = \sin x + C$

- $\int \tan x dx = -\ln|\cos x| + C$

- $\int \cot x dx = \ln|\sin x| + C$

- ★  $\int \frac{1}{\cos x} dx = \int \sec x dx = \ln|\sec x + \tan x| + C$

- $\int \frac{1}{\sin x} dx = \int \csc x dx = \ln|\csc x - \cot x| + C$

- $\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \int \sec^2 x dx = \tan x + C$

- $\int \frac{1}{\sin^2 x} dx = \int \csc^2 x dx = -\cot x + C$

- $\int \sec x \tan x dx = \sec x + C$

- $\int \csc x \cot x dx = -\csc x + C$

5.  $\int \frac{1}{a^2 + x^2} dx = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C, a > 0$

- $\int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + C$

6.  $\int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = \arcsin \frac{x}{a} + C, a > 0$

$$\bullet \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x + C$$

## 7. 对数型 (二次根式型)

$$\bullet \int \frac{1}{\sqrt{x^2+a^2}} dx = \ln(x + \sqrt{x^2+a^2}) + C$$

$$\textcircled{1} \star \int \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} dx = \ln(x + \sqrt{x^2+1}) + C$$

$$\bullet \int \frac{1}{\sqrt{x^2-a^2}} dx = \ln|x + \sqrt{x^2-a^2}| + C, |x| > |a|$$

$$\textcircled{1} \int \frac{1}{\sqrt{x^2-1}} dx = \ln|x + \sqrt{x^2-1}| + C, |x| > |a|$$

## 8. 部分分式分解型

$$\bullet \int \frac{1}{x^2-a^2} dx = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C$$

$$\bullet \int \frac{1}{a^2-x^2} dx = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x+a}{x-a} \right| + C$$

$$9. \star \int \sqrt{a^2-x^2} dx = \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} + \frac{x}{2} \sqrt{a^2-x^2} + C, a > |x| \geq 0$$

$$\bullet \int \sqrt{1-x^2} dx = \frac{1}{2} \arcsin x + \frac{x}{2} \sqrt{1-x^2} + C$$

## 10. 三角函数降幂公式型

$$\bullet \int \sin^2 x dx = \int \frac{1-\cos 2x}{2} dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} + C$$

$$\bullet \int \cos^2 x dx = \int \frac{1+\cos 2x}{2} dx = \frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4} + C$$

$$\bullet \int \tan^2 x dx = \int \sec^2 x - 1 dx = \tan x - x + C$$

$$\bullet \int \cot^2 x dx = \int \csc^2 x - 1 dx = -\cot x - x + C$$

## 1.2 不定积分的积分法

### 1. 基本积分公式

### 2. 化简 (恒等变形)

### 3. 凑微分法

### 4. 换元法

### 5. 分部积分法

### 6. 有理函数的积分

### 1.2.1 凑微分法

$$\int f[g(x)]g'(x) \mathrm{d}x = \int f[g(x)] \mathrm{d}[g(x)] = \int f(u) \mathrm{d}u$$

常用的凑微分公式

1. 由于  $x \mathrm{d}x = \frac{1}{2} \mathrm{d}(x^2)$ , 因此

$$\int x f(x^2) \mathrm{d}x = \frac{1}{2} \int f(x^2) \mathrm{d}(x^2) = \frac{1}{2} \int f(u) \mathrm{d}u$$

2. 由于  $\sqrt{x} \mathrm{d}x = \frac{2}{3} \mathrm{d}(x^{\frac{3}{2}})$ , 因此

$$\int \sqrt{x} f(x^{\frac{3}{2}}) \mathrm{d}x = \frac{2}{3} \int f(x^{\frac{3}{2}}) \mathrm{d}(x^{\frac{3}{2}}) = \frac{2}{3} \int f(u) \mathrm{d}u$$

3. 由于  $\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x}} = 2 \mathrm{d}(\sqrt{x})$ , 故

$$\int \frac{f(\sqrt{x})}{\sqrt{x}} \mathrm{d}x = 2 \int f(\sqrt{x}) \mathrm{d}(\sqrt{x}) = 2 \int f(u) \mathrm{d}u.$$

4. 当  $x > 0$  时,  $\frac{1}{x} \mathrm{d}x = \mathrm{d}(\ln x)$ , 故

$$\int \frac{f(\ln x)}{x} \mathrm{d}x = \int f(\ln x) \mathrm{d}(\ln x) = \int f(u) \mathrm{d}u.$$

5. 由于  $\frac{\mathrm{d}x}{x^2} = \mathrm{d}\left(-\frac{1}{x}\right)$ , 故

$$\int \frac{f\left(-\frac{1}{x}\right)}{x^2} \mathrm{d}x = \int f\left(-\frac{1}{x}\right) \mathrm{d}\left(-\frac{1}{x}\right) = \int f(u) \mathrm{d}u.$$

6. 由于  $\mathrm{e}^x \mathrm{d}x = \mathrm{d}(\mathrm{e}^x)$ , 故

$$\int \mathrm{e}^x f(\mathrm{e}^x) \mathrm{d}x = \int f(\mathrm{e}^x) \mathrm{d}(\mathrm{e}^x) = \int f(u) \mathrm{d}u.$$

7. 由于  $a^x \mathrm{d}x = \frac{1}{\ln a} \mathrm{d}(a^x)$ ,  $a > 0$ ,  $a \neq 1$ , 故

$$\int a^x f(a^x) \mathrm{d}x = \frac{1}{\ln a} \int f(a^x) \mathrm{d}(a^x) = \frac{1}{\ln a} \int f(u) \mathrm{d}u.$$

8. 由于  $\sin x \mathrm{d}x = \mathrm{d}(-\cos x)$ , 故

$$\int \sin x f(-\cos x) \mathrm{d}x = \int f(-\cos x) \mathrm{d}(-\cos x) = \int f(u) \mathrm{d}u.$$

9. 由于  $\cos x \, dx = d(\sin x)$ , 故

$$\int \cos x f(\sin x) \, dx = \int f(\sin x) \, d(\sin x) = \int f(u) \, du.$$

10. 由于  $\frac{dx}{\cos^2 x} = \sec^2 x \, dx = d(\tan x)$ , 故

$$\int \frac{f(\tan x)}{\cos^2 x} \, dx = \int f(\tan x) \, d(\tan x) = \int f(u) \, du.$$

11. 由于  $\csc^2 x \, dx = d(-\cot x)$ , 故

$$\int \frac{f(-\cot x)}{\sin^2 x} \, dx = \int f(-\cot x) \, d(-\cot x) = \int f(u) \, du.$$

12. 由于  $\frac{1}{1+x^2} \, dx = d(\arctan x)$ , 故

$$\int \frac{f(\arctan x)}{1+x^2} \, dx = \int f(\arctan x) \, d(\arctan x) = \int f(u) \, du.$$

13. 由于  $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \, dx = d(\arcsin x)$ , 故

$$\int \frac{f(\arcsin x)}{\sqrt{1-x^2}} \, dx = \int f(\arcsin x) \, d(\arcsin x) = \int f(u) \, du.$$


### 1.2.2 换元法

$$\int f(x) \, dx \xrightarrow{x=g(u)} \int f[g(u)] \, d[g(u)] = \int f[g(u)] g'(u) \, du$$


$x = g(u)$  须是单调可导函数

1. 三角函数代换: 当被积函数含有如下根式时, 可作三角函数代换, 这里  $a > 0$

•  $\sqrt{a^2 - x^2} \Rightarrow$  令  $x = a \sin t, |t| < \frac{\pi}{2}$



•  $\sqrt{a^2 + x^2} \Rightarrow$  令  $x = a \tan t, |t| < \frac{\pi}{2}$



•  $\sqrt{x^2 - a^2} \Rightarrow \text{令 } x = a \sec t$

$$\begin{cases} x > 0 \implies 0 < t < \frac{\pi}{2}, \\ x < 0 \implies \frac{\pi}{2} < t < \pi. \end{cases}$$

- 恒等变形后作三角函数代换：当被积函数含有根式  $\sqrt{ax^2 + bx + c}$  时，可先化为  $\sqrt{\varphi^2(x) + k^2}$ 、 $\sqrt{\varphi^2(x) - k^2}$  或  $\sqrt{k^2 - \varphi^2(x)}$ ，再作三角函数代换
- ★ 根式代换：当被积函数含有根式  $\sqrt[n]{ax + b}$ ,  $\sqrt{\frac{ax + b}{cx + d}}$ ,  $\sqrt{ae^{bx} + c}$  时，一般令根式  $\sqrt[n]{*} = t$ 。对既含有  $\sqrt[n]{ax + b}$ ，也含有  $\sqrt[m]{ax + b}$  的函数，一般取  $m, n$  的最小公倍数  $l$ ，令  $\sqrt[l]{ax + b} = t$
- 倒代换：当被积函数分母的幂次比分子高两次及两次以上时，作倒代换，令  $x = \frac{1}{t}$
- 复杂函数的直接代换：当被积函数中含有  $a^x, e^x, \ln x, \arcsin x, \arctan x$  等时，可考虑直接令复杂函数等于  $t$

### 1.2.3 分部积分法

- $\int u dv = uv - \int v du$  (反对幂指三)
- 设函数  $u = u(x)$  与  $v = v(x)$  具有直到第  $n + 1$  阶的连续导数，并根据分部积分公式  $\int u dv = uv - \int v du$  则有

$$\int uv^{(n+1)} dx = uv^{(n)} - u'v^{(n-1)} + u''v^{(n-2)} - \dots + (-1)^n u^{(n)}v + (-1)^{n+1} \int u^{(n+1)}v dx$$

$$\begin{aligned} \int uv^{(4)} dx &= \frac{\begin{array}{c|c|c|c|c|c} u \text{ 各阶导数} & u & u' & u'' & u^{(3)} & u^{(4)} \\ \hline v^{(4)} \text{ 各阶导数} & v^{(4)} & v^{(3)} & v'' & v' & v \end{array}}{=} \\ &= uv^{(3)} - u'v'' + u''v' - u^{(3)}v + \int u^{(4)}v dx \end{aligned}$$

计算方法：以  $u$  作起点左上、右下错位相乘，各项符号  $+, -, \dots$  相间，最后一项为  $\int u^{(4)}v dx$

- 分部积分法可能的结果

- 方程:  $I = \square - I$
- 抵消:  $I = \square - I_1 + I_1$
- 递推式:  $I_n = F(I_{n-1}, I_{n-2})$

### 1.2.4 有理函数的积分

1. 定义:形如  $\int \frac{P_n(x)}{Q_m(x)} dx (n < m)$  的积分称为**有理函数的积分**,其中  $P_n(x), Q_m(x)$  分别是  $x$  的  $n$  次多项式和  $m$  次多项式

2. 思想:若  $Q_m(x)$  在实数域内可因式分解,则因式分解后再把  $\frac{P_n(x)}{Q_m(x)}$  拆成若干项最简有理分式之和。有理式 = 最简有理分式之和,其中最简有理式分为

$$\textcircled{1} \frac{A}{ax+b}$$

$$\textcircled{2} \frac{A_k}{(ax+b)^k}, k=2,3,\dots$$

$$\textcircled{3} \frac{Ax+B}{px^2+qx+r}$$

$$\textcircled{4} \frac{A_kx+B_k}{(px^2+qx+r)^k}, k=2,3,\dots$$

3. 方法 (如何拆)

①  $Q_m(x)$  的一次单因式产生一项  $\frac{A}{ax+b}$

Example

$$\int \frac{1}{x+1} dx = \ln|x+1| + C$$

②  $Q_m(x)$  的  $k$  重一次因式  $(ax+b)^k$  产生  $k$  项,分别为  $\frac{A_1}{ax+b}, \frac{A_2}{(ax+b)^2}, \dots, \frac{A_k}{(ax+b)^k}, k=2,3,\dots$

Example

$$\int \frac{2}{(2x-1)^2} dx = \int \frac{1}{(2x-1)^2} d(2x-1) = -\frac{1}{2x-1} + C$$

③  $Q_m(x)$  的二次单因式  $px^2+qx+r$  产生一项  $\frac{Ax+B}{px^2+qx+r}$ 。须  $\Delta = q^2 - 4pr < 0$

Example

$$\int \frac{x-1}{x^2+1} dx = \int \frac{1}{2} \frac{2x}{x^2+1} dx - \int \frac{1}{x^2+1} dx = \frac{1}{2} \ln(x^2+1) - \arctan x + C$$

- ④  $Q_m(x)$  的  $k$  重二次因式  $(px^2 + qx + r)^k$  产生  $k$  项, 分别为  $\frac{A_1x + B_1}{px^2 + qx + r}, \frac{A_2x + B_2}{(px^2 + qx + r)^2}, \dots, \frac{A_kx + B_k}{(px^2 + qx + r)^k}$

### Example

求

$$I_2 = \int \frac{dx}{(1+x^2)^2}.$$

**思路:** 若分母为  $1+x^2$ , 则原函数为  $\arctan x$ , 因此考虑将  $(1+x^2)^2$  降阶处理。

**解:** 设

$$I_1 = \int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x.$$

利用分部积分法,

$$I_1 = \int \frac{1}{1+x^2} dx = \frac{x}{1+x^2} + \int x \cdot \frac{2x}{(1+x^2)^2} dx.$$

整理被积式:

$$\begin{aligned} I_1 &= \frac{x}{1+x^2} + 2 \int \frac{x^2}{(1+x^2)^2} dx \\ &= \frac{x}{1+x^2} + 2 \int \frac{(1+x^2) - 1}{(1+x^2)^2} dx \\ &= \frac{x}{1+x^2} + 2 \int \frac{1}{1+x^2} dx - 2 \int \frac{1}{(1+x^2)^2} dx. \end{aligned}$$

即

$$I_1 = \frac{x}{1+x^2} + 2I_1 - 2I_2.$$

解得

$$I_2 = \frac{x}{2(1+x^2)} + \frac{1}{2} \arctan x + C.$$

⑤

### Example

$$\frac{4x^2 - 6x - 1}{(x+1)(2x-1)^2} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{2x-1} + \frac{C}{(2x-1)^2}$$

解恒等式:

$$A(2x-1)^2 + B(x+1)(2x-1) + C(x+1) = 4x^2 - 6x - 1$$

在恒等式中, 对变量  $x$  取任意值, 等式两边应恒相等, 因此可代入特殊值求系数。

令

$$x = -1, \quad x = \frac{1}{2}, \quad x = 0$$

即可求得  $A, B, C$

## 1.3 定积分的计算

### 1.3.1 牛顿-莱布尼茨公式

设函数  $F(x)$  是连续函数  $f(x)$  在  $[a, b]$  上的一个原函数, 则

$$\int_a^b f(x) dx = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a)$$

### 1.3.2 牛顿-莱布尼茨公式的推广

设  $f(x)$  在  $[a, b]$  上分段存在原函数。若在  $[a, c)$  上存在原函数  $F_1(x)$ , 在  $(c, b]$  上存在原函数  $F_2(x)$ , 则

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

若极限存在, 则

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{x \rightarrow c^-} F_1(x) - F_1(a) + F_2(b) - \lim_{x \rightarrow c^+} F_2(x).$$

收敛性判定:

- 若  $\lim_{x \rightarrow c^-} F_1(x)$  与  $\lim_{x \rightarrow c^+} F_2(x)$  均存在, 则  $\int_a^b f(x) dx$  收敛;
- 若上述两个极限中至少有一个不存在, 则  $\int_a^b f(x) dx$  发散。

### 1.3.3 定积分的换元积分法

设  $f(x)$  在  $[a, b]$  上连续, 函数  $x = \varphi(t)$  满足①  $\varphi(\alpha) = a, \varphi(\beta) = b$ ; ②  $x = \varphi(t)$  在  $[\alpha, \beta]$  (或  $[\beta, \alpha]$ ) 上有连续的导数, 且其值域为  $R_\varphi = [a, b]$ , 则有

$$\int_a^b f(x) dx = \int_\alpha^\beta f[\varphi(t)]\varphi'(t) dt$$

**换元要三换**

- ① 被积函数要换:  $f(x) \rightarrow f[\varphi(t)]$
- ② 积分变量要换:  $dx \rightarrow \varphi'(t) dt$
- ③ 上下限要换:  $\int_a^b \rightarrow \int_\alpha^\beta$



### 1.3.4 定积分的分部积分法

$$\int_a^b u(x)v'(x) \, dx = u(x)v(x) \Big|_a^b - \int_a^b v(x)u'(x) \, dx$$

这里要求  $u'(x), v'(x)$  在  $[a, b]$  上连续

### 1.3.5 结论

1. 设  $f(x)$  为连续的偶函数, 则  $\int_{-a}^a f(x) \, dx = 2 \int_0^a f(x) \, dx$
2. 设  $f(x)$  为连续的奇函数, 则  $\int_{-a}^a f(x) \, dx = 0$
3. 设  $f(x)$  是以  $T$  为周期的连续函数, 则  $\int_a^{a+T} f(x) \, dx = \int_0^T f(x) \, dx$
4. 区间再现公式: 设  $f(x)$  为连续函数, 则  $\int_a^b f(x) \, dx = \int_a^b f(a+b-x) \, dx$

(a) 若  $f(x)$  复杂,  $f(x) + f(a+b-x)$  简单, 则考虑

$$\int_a^b f(x) \, dx = \int_a^b \frac{f(x) + f(a+b-x)}{2} \, dx$$

(b) 经典

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(1 + \tan x) \, dx &\stackrel{x=\frac{\pi}{4}-t}{=} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln\left[1 + \tan\left(\frac{\pi}{4} - x\right)\right] \, dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln\left(\frac{2}{1 + \tan x}\right) \, dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\ln\left(\frac{2}{1 + \tan x}\right) + \ln(1 + \tan x)}{2} \, dx \\ &= \frac{\pi}{8} \ln 2 \end{aligned}$$

$$(c) \int_0^{\pi} x f(\sin x) \, dx \stackrel{x=\pi-t}{=} \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(\sin x) \, dx$$

5. 华里士公式 (点火公式)

•

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x \, dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x \, dx = \begin{cases} \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{2}{3} \cdot 1, & n \text{ 为大于 1 的奇数,} \\ \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2}, & n \text{ 为正偶数.} \end{cases}$$

$$\int_0^{\pi} \sin^n x \, dx = \begin{cases} 2 \cdot \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{2}{3} \cdot 1, & n \text{ 为大于 1 的奇数,} \\ 2 \cdot \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2}, & n \text{ 为正偶数.} \end{cases}$$

$$\int_0^{\pi} \cos^n x \, dx = \begin{cases} 0, & n \text{ 为正奇数,} \\ 2 \cdot \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2}, & n \text{ 为正偶数.} \end{cases}$$

$$\int_0^{2\pi} \sin^n x \, dx = \int_0^{2\pi} \cos^n x \, dx = \begin{cases} 0, & n \text{ 为正奇数,} \\ 4 \cdot \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2}, & n \text{ 为正偶数.} \end{cases}$$

## 1.4 变限积分的计算

### 1.4.1 求导公式

设  $F(x) = \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(t) \, dt$ , 其中  $f(x)$  在  $[a, b]$  上连续, 可导函数  $\varphi_1(x)$  和  $\varphi_2(x)$  的值域在  $[a, b]$  上, 则在函数  $\varphi_1(x)$  和  $\varphi_2(x)$  的公共定义域上, 有

$$F'(x) = \frac{d}{dx} \left[ \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(t) \, dt \right] = f[\varphi_2(x)]\varphi_2'(x) - f[\varphi_1(x)]\varphi_1'(x)$$

上面公式中的  $x$  为求导变量,  $t$  为积分变量。当被积函数中只含积分变量  $t$  时, 才能使用求导公式, 若被积函数中有求导变量  $x$ , 则必须通过恒等变形 (比如变量代换等) 将其移出被积函数, 才能使用变限积分求导公式

### 1.4.2 重要结论

只需要被积函数可积, 即可有变限积分的相关性质, 只有被积函数连续时, 才能谈原函数的相关性质

1. ★  $f(x)$  为可积 (有可能有跳跃间断点、可去间断点) 的奇函数  $\Rightarrow \int_a^x f(t) \, dt, \forall a$  为偶函数
2. 若  $f(x)$  为连续的奇函数, 则  $\int_a^x f(t) \, dt + C$  也是偶函数, 故  $f(x)$  的全体原函数均为偶函数

3. ★  $f(x)$  为可积的偶函数  $\Rightarrow$

$$\begin{cases} \int_0^x f(t) dt \text{ 为奇函数,} \\ \int_a^x f(t) dt \ (a \neq 0) \end{cases} \begin{cases} \text{若 } \int_a^x f(t) dt = \int_0^x f(t) dt, \text{ 为奇函数,} \\ \text{若 } \int_a^x f(t) dt \neq \int_0^x f(t) dt, \text{ 为非奇非偶函数.} \end{cases}$$

#### Example

判断函数

$$f(x) = \int_0^{\sin x} \cos t^2 dt$$

的奇偶性。

令

$$h(x) = \int_0^x \cos t^2 dt,$$

则

$$f(x) = h(\sin x) = h(g(x)), \quad g(x) = \sin x.$$

由于  $\cos t^2$  为偶函数, 故  $h(x)$  为奇函数;

又  $g(x) = \sin x$  为奇函数,

因此

$$f(x) = h(g(x))$$

为奇函数。

4. 若  $f(x)$  为连续的偶函数, 则  $f(x)$  的全体原函数中, 只有  $\int_0^x f(t) dt$  是奇函数

5.  $f(x)$  是可积且以  $T$  为周期的周期函数, 则  $\int_0^x f(t) dt$  是以  $T$  为周期的周期函数  $\Leftrightarrow \int_0^T f(x) dx = 0 \Leftrightarrow \int_a^x f(t) dt = \int_a^0 f(t) dt + \int_0^x f(t) dt$  亦是以  $T$  为周期的周期函数 ( $a \neq 0$ )

## 1.5 反常积分的计算

1. 在计算反常积分时, 注意识别奇点 (端点、内部) (瑕点,  $\pm\infty$ )
2. 反常积分在收敛的情况下, 通过换元可能实现反常积分与定积分的相互转化

## 1.6 基础概念

### 1. $\Gamma$ 函数

定义:

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx \stackrel{x=t^2}{=} 2 \int_0^{+\infty} t^{2\alpha-1} e^{-t^2} dt (\alpha, t > 0).$$

递推公式：

$$\begin{aligned}\Gamma(\alpha+1) &= \int_0^{+\infty} x^\alpha e^{-x} \mathrm{d}x \\ &= - \int_0^{+\infty} x^\alpha \mathrm{d}(e^{-x}) \\ &= -x^\alpha e^{-x} \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-x} \alpha x^{\alpha-1} \mathrm{d}x \\ &= \alpha \Gamma(\alpha).\end{aligned}$$

特殊值：

$$\Gamma(1) = 1, \quad \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}.$$

因此

$$\begin{aligned}\Gamma(n+1) &= n! \\ \Gamma\left(\frac{5}{2}\right) &= \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4} \sqrt{\pi}.\end{aligned}$$

## 1.7 运算

1.

$$\int \frac{1}{1+e^x} \mathrm{d}x = \int \left(1 - \frac{e^x}{1+e^x}\right) \mathrm{d}x$$

2.

$$\begin{aligned}\int_0^1 \arcsin \sqrt{1-x^2} \mathrm{d}x &= x \arcsin \sqrt{1-x^2} \Big|_0^1 - \int_0^1 x \mathrm{d}(\arcsin \sqrt{1-x^2}) \\ &= \int_0^1 \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \mathrm{d}x \\ &= -\sqrt{1-x^2} \Big|_0^1 \\ &= 1\end{aligned}$$

3.

$$\begin{aligned}\int \cos^3 t \mathrm{d}t &= \int (1 - \sin^2 t) \cos t \mathrm{d}t \\ &= \int (1 - \sin^2 t) \mathrm{d}(\sin t) \\ &= \sin t - \frac{\sin^3 t}{3} + C.\end{aligned}$$

## 1.8 公式

1.

$$\begin{aligned}\int e^{ax} \sin bx \, dx &= \frac{\begin{vmatrix} (e^{ax})' & (\sin bx)' \\ e^{ax} & \sin bx \end{vmatrix}}{a^2 + b^2} + C \\ &= \frac{ae^{ax} \sin bx - be^{ax} \cos bx}{a^2 + b^2} + C\end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned}\int e^{ax} \cos bx \, dx &= \frac{\begin{vmatrix} (e^{ax})' & (\cos bx)' \\ e^{ax} & \cos bx \end{vmatrix}}{a^2 + b^2} + C \\ &= \frac{ae^{ax} \cos bx + be^{ax} \sin bx}{a^2 + b^2} + C\end{aligned}$$

3.  $I_n = \int_0^{+\infty} x^n e^{-x} \, dx = n! (n \text{ 为非负整数})$

4.  $\tan(\frac{\pi}{4} - \alpha) = \frac{1 - \tan \alpha}{1 + \tan \alpha}$

5.

$$\int \sqrt{1+x^2} \, dx = \frac{x\sqrt{1+x^2}}{2} + \frac{1}{2} \ln(x + \sqrt{1+x^2}) + C$$

## 1.9 方法总结

1. 若不是常用的凑微分公式, 则可对被积函数的复杂部分  $g(x)$  求导, 若  $g'(x) = f(x)$ , 即  $d[g(x)] = f(x)dx$ , 则  $\int f(x)g(x) \, dx = \int g(x) d[g(x)]$ , 凑微分成功

2.  $\int \Delta \, dx$  一般不好求, 可将其转化成  $\int \nabla \, dx$

3. 形如  $R(\sin x, \cos x)$  的有理式称为三角函数有理式

(a) 令  $t = \tan \frac{x}{2}$ ,  $\sin x = \frac{2t}{1+t^2}$ ,  $\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$

(b) 凑微分

- 若  $R(\sin x, \cos x) = -R(-\sin x, \cos x)$ , 令  $\cos x = t$ 。sin 是奇数次方, e.g.  $\frac{\sin^5 x}{\cos^4 x} = -\frac{\sin^5 x}{\cos^4 x}$
- 若  $R(\sin x, \cos x) = -R(\sin x, -\cos x)$ , 令  $\sin x = t$ 。cos 是奇数次方
- 若  $R(\sin x, \cos x) = R(-\sin x, -\cos x)$ , 令  $\tan x = t$

4. 定积分计算时考虑奇偶性和周期性, 做平移代换。e.g.  $\int_0^1 \Rightarrow ? \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}$