

Практическая линейная алгебра

Минкин Даниэль

20 февраля 2025 г.

Содержание

1 Введение	2
1.1 Темы	2
1.2 Организация курса	3
2 Разложение полного ранга (скелетное разложение)	3
2.1 Теорема о существовании скелетного разложения	3
2.2 Практический способ нахождения скелетного разложения	4
3 Псевдообратная матрица	4
3.1 Немного о ранге	4
3.2 Снова возврат к псевдообратной матрице	5
3.3 Рассмотрим виды СЛАУ	5
3.4 Эрмитова матрица	6
3.5 Наконец то определим псевдообратную матрицу	6
3.6 Немного определений	7
3.7 Примеры работы	8
3.7.1 Частный случай	8
3.7.2 Общий случай	8
3.8 Лемма об обратимости A^*A	9
3.9 Теорема о существовании псевдообратной матрицы для матриц полного столб. и строч. ранга	9
3.10 Теорема о существовании псевдообратной матрицы для любой матрицы	10
3.10.1 Лемма об обратной матрице произведения матриц	10
3.10.2 Основная теорема	11
3.10.3 Начало доказательства	11
3.11 Суть псевдообратной матрицы	12
3.12 Теорема о псевдорешении	12
3.12.1 Лемма	12
3.12.2 Возврат к доказательству	12
3.12.3 Как описать все псевдорешения?	14

4	Матричные разложения	14
4.1	LU разложение	14
4.1.1	Теорема об LU разложении	14
4.1.2	Практический подход для LU разложения	15
4.1.3	Где используется	15
4.2	LUP-разложение	16

1 Введение

1.1 Темы

Вот ключевые темы курса:

- Псевдообратная матрица
- Линейная регрессия и МНК
- Полиномиальная интерполяция, сплайны, кривые Безье (возможно сплайны Безье)
- Аппроксимация (лишь часть связанная с лин. алгеброй) (Многочлены Чебышева)
- Метрики и нормы
- Оценка погрешности стандартных задач линейной алгебры
- Итерационные алгоритмы
- Проблемы собственных значений и собственных векторов
- Неотрицательные и положительные матрицы и их специальные свойства (Теорема Фробениуса — Перрона). Пример использования данной теоремы — PageRank
- Функции от матриц
- (Если успеем) Системы алгебраических уравнений
- (Если успеем) Линейные экономические модели

В процессе также будут затронуты:

- Разложения матриц
- Приближение малого ранга (а.к.а PCA в общем виде)

1.2 Организация курса

Будет 2 онлайн кр (как на выч. стате дают сложные задачи на подумать) в конце каждого из модулей. Формула оценки задается как:

$$0.5 \cdot \text{КР1} + 0.5 \cdot \text{КР2} + \text{Бонус} \quad (1)$$

Бонус будет формироваться в зависимости от активности на парах, но основная его часть будет получена за формирование доклада по линейной алгебре, который будет презентован на одной из пар.

Чел упомянул интересную тему для доклада: существует теорема, по которой мы с помощью двух линейных слоев и функции активации можно аппроксимировать любую функцию с заданной точностью

2 Разложение полного ранга (скелетное разложение)

Пусть A матрица (m, n) , такая что $\text{rang}(A) = r$. Разложение $A = FG$, где F имеет размерность (m, r) , а G имеет размерность (r, n) называется разложением полного ранга.

Заметим, что $\text{rang}(F) \leq r$ из-за размера, при этом $\text{rang}(F) \geq r$ по свойству умножения матриц. Следовательно $\text{rang}(F) = r$, это матрица полного столбцового ранга, аналогично получаем, что G матрица полного строкового ранга. Таким образом матрица A представима, как произведение двух полноранговых матриц

2.1 Теорема о существовании скелетного разложения

Для любой матрицы существуют скелетное разложение

Доказательство

Покажем, что для любой матрицы существует скелетное разложение, у нас есть r независимых столбцов внутри матрицы. Выберем первые r столбцов (мы можем так сделать так, как нам не важно какие брать, остальные точно могут быть выражены через них), тогда матрица A представима как $A = (\bar{a}_1 \dots \bar{a}_r \sum_{i=1}^r w_{1,i} \bar{a}_i \dots \sum_{i=1}^r w_{n-r,i} \bar{a}_i)$. Пусть тогда матрица F равна $(\bar{a}_1 \dots \bar{a}_r)$, она имеет размер (m, r) . По условию отбора данных столбцов они все линейно независимы, таким образом $\text{rang}(F) = r$, так как $\text{rang}(F) \leq r$ (по условию размера матрицы) и при этом $\text{rang}(F) \geq r$ (так как все столбцы ЛНЗ).

Рассмотрим матрицу G , которая выглядит так $G = (e(1) \dots e(r) w_1 \dots w_{n-r})$, где $e(i)$ — вектор с размерностью m где все координаты равны 0, а i -ая координата равна 1. Такая матрица имеет размерность (r, n) и ее первые r

столбцов линейно независимы, а остальные выражаются через них, следовательно $\text{rang}(G) = r$. При этом $FG = A$. Ч.Т.Д

2.2 Практический способ нахождения склетного разложения

Рассмотрим практический способ нахождения данного разложения. Приведем матрицу A с размерами (m, n) к каноническому виду (на диагонали 1, а под ними ничего). У нас получится r ступенек, вырежем верхний левый блок канонической матрицы, размером (r, n) . Далее выберем столбцы у которых в каноническом виде в столбце всего лишь одна 1 и во всех остальных местах нули. Добавим эти столбцы в новую матрицу, тогда это будет матрица F

3 Псевдообратная матрица

Почему мы не можем всегда использовать метод Гаусса для решения СЛАУ?

Самый большой минус - сложность задаваемая как $O(n^2)$ для квадратной матрицы n на n .

Вторая проблема - аккумуляция погрешности при использовании данного метода, пример: при вычитании первой строчки из второй, ошибка первой строчки суммируется со второй. Плюс также погрешность создают float-ы (особенно с первой причиной вместе)

Вспомним, что такое обратная матрица. Это матрица A^{-1} такая, что

$$AA^{-1} = A^{-1}A = E \quad (2)$$

Пусть матрица A имеет размеры m на n , попробуем проверить условия, которыми задаются условия для обратной матрицы

Тогда $AA^{-1} = E$, тут E будет иметь размеры m на m , а A^{-1} иметь размеры n на m . В обратном же случае $A^{-1}A = E$ матрица E будет иметь размеры n на n .

Если мы будем использовать лишь одно из условий, тогда очень легко определить обратную матрицу

3.1 Немного о ранге

rang может быть определен как

- Наибольшее кол-во линейно независимых строк/столбцов в матрице
- $\dim(\text{Im}(A))$, где A — наша матрица, а Im — образ нашей матрицы.

Вспоминаем условие про ранг суммы и произведения

Ранг суммы

Рассмотрим выражение $\text{rang}(A+B)$ и попробуем его оценить. Очевидно, что $\text{rang}(A+B) \leq \text{rang}(A) + \text{rang}(B)$. Почему так? По свойству линейных операторов можно заметить, что $(A+B)v = Av + Bv$, следовательно, любой вектор из $\text{Im}(A+B)$ является подпространством $\text{Im}(A) + \text{Im}(B)$. При этом $\text{Im}(A) + \text{Im}(B) = \{u + v | u \in \text{Im}(A), v \in \text{Im}(B)\}$. По свойству пространств $\dim(U+V) = \dim(U) + \dim(V) - \dim(U \cap V)$ (Это уже на 100% интуитивно). Следовательно $\dim(U+V) \leq \dim(U) + \dim(V)$. Применяя данное уравнение к образам, получим $\dim(\text{Im}(A+B)) \leq \dim(\text{Im}(A)) + \dim(\text{Im}(B))$, что исходя из определения rang приводит к $\text{rang}(A+B) \leq \text{rang}(A) + \text{rang}(B)$. Ч.Т.Д

Ранг произведения

$\text{rang}(AB) \leq \max(A, B)$. В данном случае посмотрим на суть произведения матриц — это композиция линейных операторов. Т.е функция от функции, сначала применяется линейный оператор B , а к результату применяется оператор A . Пусть A — матрица (m, n) , а B — матрица (n, k) . Рассмотрим процесс работы данной композиции, к нам приходит вектор с размерностью k , его отображают в пространство с размерностью $\text{rang}(B)$, а после к нему применяется оператор A , заметим, что он не может отобразить вектор в пространство с размерностью больше чем $\text{rang}(B) \Rightarrow \text{rang}(AB) \leq \text{rang}(B)$, при этом выходная размерность также не может превысить $\text{rang}(A)$. Таким образом $\text{rang}(AB) \leq \min(\text{rang}(B), \text{rang}(A)) \leq \max(\text{rang}(B), \text{rang}(A))$

3.2 Снова возврат к псевдообратной матрице

$$\text{rang}(AA^{-1}) = m \quad (3)$$

$$\text{rang}(A^{-1}A) = n \quad (4)$$

При этом $\text{rang}(A) \leq \min(m, n)$. Исходя из неравенств выше получаем, что $\text{rang}(A) \geq m$ и $\text{rang}(A) \geq n$ (Так как максимальный элемент из $\text{rang}(A)$ и $\text{rang}(A^{-1})$ больше данных значений). **Однако в таком случае возникает противоречие, если $m \neq n$.** Это говорит о том, что мы не можем использовать такие аксиомы для нашей “обратной” матрицы, которая может быть применена в общем случае

3.3 Рассмотрим виды СЛАУ

Какие виды систем уравнений бывают:

- **Определенная** — у нас есть матрица (m, n) , где $m > n$. Система имеет единственное решение. Мы хотим представить решение как Jb ,

когда уравнение задается как $Ax = b$, где J — произвольная матрица с размерами (n, m) .

- **Не определенная** — решений бесконечно много. У нас возникает вопрос как выразить хоть какое то решение
- **Не совместна** — решений нет. Мы хотим получить наиболее правдоподобное приближение к решению

3.4 Эрмитова матрица

Введем операцию комплексного (эрмитова) сопряжения для матрицы. Пусть дана матрица A , тогда эрмитово сопряженная матрица (которая обозначается как A^*) это транспонированная матрица A в которой каждый элемент заменили на комплексно сопряженный ему. Т.е для любого $a \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ в матрице A $\overline{a + bi} = a - bi$. Новая матрица называется **эрмитово сопряженной**

Эрмитова матрица — квадратная матрица, которая при транспонировании равна своей эрмитово сопряженной матрице

$$A^T = A^* \quad (5)$$

NOTE: Любая симметричная матрица является эрмитовой

3.5 Наконец то определим псевдообратную матрицу

Пусть A — некая прямоугольная матрица. Матрица C называется псевдообратной матрицей (а точнее псевдообратной Мура-Пенроуза), если выполняются следующие 4 аксиомы Пенроуза

- $ACA = A$
- $CAC = C$
- $(AC)^* = AC$ (т.е это эрмитова матрица)
- $(CA)^* = CA$ (тоже эрмитова)

Важные замечания которые следуют из аксиом

- Если A — матрица (m, n) , то C имеет размер (n, m)
- Если A — невырожденная квадратная матрица, то псевдообратная матрица совпадает с обратной матрицей

Покажем что данная матрица единственна

1. Пусть B и C — две псевдообратные матрицы для A . 2. Тогда:

$$B = BAB = B(ACA)B = (BA)(CA)B.$$

3. Поскольку BA и CA эрмитовы, их можно переставлять в сопряжённом виде:

$$\begin{aligned} BACAB &= (BA)^*(CA)^*B = A^*B^*A^*C^*B = (ABA)^*C^*B \\ &= A^*C^*B = (CA)^*BAB = CABAB \\ &= CAB. \end{aligned}$$

4. Аналогично:

$$C = CAC = C(ABA)C = (CA)(BA)C = CAB.$$

5. Из $B = CAB$ и $C = CAB$ следует $B = C$, что доказывает единственность.

Введем специальный символ

Псевдообратную матрицу принято обозначать, как A^+

3.6 Немного определений

Матрица $A (m, n)$ называется **матрицей полного столбового ранга**, если $\text{rang}(A) = n$. При этом $m > n$. Т.е все ее столбцы Л.Н.З

Матрица $A (m, n)$ называется **матрицей полного строкового ранга**, если $\text{rang}(A) = m$. При этом $m < n$. Т.е все ее строки Л.Н.З

Вставил не по порядку рассказа чисто по своему желанию:

Вспомним определение ядра: $\ker(A) = \{v | Av = \bar{0}\}$. При этом по свойству ядра $\dim(\text{Im}(A)) + \dim(\ker(A)) = n$, для матрицы (m, n)

3.7 Примеры работы

3.7.1 Частный случай

Рассмотрим матрицу $\begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix}$. Нам нужно найти псевдообратную к ней, мы точно знаем, что псевдообратная матрица будет иметь размерность $(2, 1)$. Т.е. псевдообратная матрица это некий вектор $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$. Запишем, все аксиомы:

- $\begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix}$
- $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$
- $\left(\begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \right)^* = \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$
- $\left(\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix} \right)^* = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix}$

Заметим, что третий пункт всегда выполняется, значит его можно исключить, выполним перемножение матриц

- $(a + b) \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix}$
- $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} (a + b) = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$
- $\begin{pmatrix} a & a \\ b & b \end{pmatrix}^* = \begin{pmatrix} a & a \\ b & b \end{pmatrix}$

Следовательно $a = b$ и $a + b = 1$ таким образом псевдообратная матрица имеет вид $\begin{pmatrix} 0.5 \\ 0.5 \end{pmatrix}$

3.7.2 Общий случай

В общем случае для вектора \bar{a} псевдообратная матрица будет иметь вид:

$$\bar{a}^+ = \frac{\bar{a}^*}{\|\bar{a}\|^2} \quad (6)$$

Покажем, что все аксиомы выполняются

- $\bar{a} \frac{\bar{a}^*}{\|\bar{a}\|^2} \bar{a} = \bar{a}$
- $\frac{\bar{a}^*}{\|\bar{a}\|^2} \bar{a} \frac{\bar{a}^*}{\|\bar{a}\|^2} = \frac{\bar{a}^*}{\|\bar{a}\|^2}$
- $\left(\bar{a} \frac{\bar{a}^*}{\|\bar{a}\|^2} \right)^* = \bar{a} \frac{\bar{a}^*}{\|\bar{a}\|^2}$
- $\left(\frac{\bar{a}^*}{\|\bar{a}\|^2} \bar{a} \right)^* = \frac{\bar{a}^*}{\|\bar{a}\|^2} \bar{a}$

Это равносильно (Note: для расчета нормы комплексного вектора используется не транспонирование, а комплексное сопряжение)

- $\bar{a} \cdot 1 = \bar{a}$
- $1 \cdot \frac{\bar{a}^*}{\|\bar{a}\|^2} = \frac{\bar{a}^*}{\|\bar{a}\|^2}$

- $(\bar{a} \frac{\bar{a}^*}{\|a\|^2})^* = \bar{a} \frac{\bar{a}^*}{\|a\|^2}$
- $1^* = 1$

Таким образом нам нужно, чтобы выполнялось выражение

$$(\bar{a} \frac{\bar{a}^*}{\|a\|^2})^* = \bar{a} \frac{\bar{a}^*}{\|a\|^2} \quad (7)$$

Сократим константу

$$(\bar{a}\bar{a}^*)^* = \bar{a}\bar{a}^* \quad (8)$$

Раскроем эрмитово сопряжение

$$\bar{a}\bar{a}^* = \bar{a}\bar{a}^* \quad (9)$$

Следовательно, аксиома 3 тоже выполняется. А по условию единственности это и есть псевдообратная матрица, легко показать, что для вектора строки ситуация будет аналогичной

3.8 Лемма об обратимости A^*A

Пусть A — матрица полного столбцового ранга, то матрица A^*A — невырожденная квадратная матрица. (Для матрицы полного строкового ранга все практически 1 в 1 сейм)

Доказательство

Пусть A — матрица (m, n) , такая, что $n < m$ и $\text{rang}(A) = n$. Заметим, что $\text{rang}(A^*A) \leq \text{rang}(A)$ (по свойству произведения матриц). Тогда для док-ва нам достаточно показать, что $\text{rang}(A^*A) \geq \text{rang}(A)$. По свойству ядра, если X имеет размерность (m, n) , то $\dim(\ker(X)) + \text{rang}(X) = n$. Пусть $x \in \ker(A^*A)$, тогда $A^*Ax = 0$, домножим на x^* справа, тогда выражение примет вид $(Ax)^*Ax = 0$. Это скалярное произведение вектора Ax на самого себя и по свойству скалярного произведения мы получаем, что $Ax = 0$, при этом $\dim(\ker(A)) = 0$, следовательно $\dim(\ker(A^*A)) = 0$, а тогда $\text{rang}(A^*A) = n$

В общем случае мы доказали, что $\ker(A^*A) \subset \ker(A)$, отсюда вытекает неравенство $\dim(\ker(A^*A)) \leq \dim(\ker(A))$, то равносильно $n - \text{rang}(A^*A) \leq n - \text{rang}(A)$, что приводит нас к $\text{rang}(A^*A) \geq \text{rang}(A)$

3.9 Теорема о существовании псевдообратной матрицы для матриц полного столб. и строч. ранга

Если A матрица (m, n) , такая что $n < m$ и что $\text{rang}(A) = n$ (матрица полного столбцового ранга), то A^+ существует и равна

$$A^+ = (A^*A)^{-1}A^* \quad (10)$$

Для матрицы полного строчного ранга

$$A^+ = A^*(AA^*)^{-1} \quad (11)$$

Проверим аксиомы для матрицы полного столбцового ранга

- $A(A^*A)^{-1}A^*A = A$
- $(A^*A)^{-1}A^*A(A^*A)^{-1}A^* = (A^*A)^{-1}A^*$
- $(A(A^*A)^{-1}A^*)^* = A(A^*A)^{-1}A^*$
- $((A^*A)^{-1}A^*A)^* = (A^*A)^{-1}A^*A$

Это сводится к (3 точно выполняется)

- $AE = A$
- $(A^*A)^{-1}EA^* = (A^*A)^{-1}A^*$
- $(E)^* = E$

Следовательно, данная матрица удовлетворяет всем четырем аксиомам и единственна

Аналогично, для матриц полного строчного ранга

3.10 Теорема о существовании псевдообратной матрицы для любой матрицы

3.10.1 Лемма об обратной матрице произведения матриц

Если $A = BC$, где B — матрица полного столбцового ранга, а C — матрица полного строкового ранга, то тогда $A^+ = B^+C^+$,

Доказательство

Рассмотрим, аксиомы для A , пусть псевдообратная матрица $A^+ = C^+B^+$, если для нее будут выполнены аксиомы, то тогда по условию единственности, это и есть псевдообратная матрица

- $AC^+B^+A = A$
- $C^+B^+AC^+B^+ = C^+B^+$
- $(AC^+B^+)^* = AC^+B^+$
- $(C^+B^+A)^* = C^+B^+A$

Заменим A на BC , тогда

- $BCC^+B^+BC = BC$
- $C^+B^+BCC^+B^+ = C^+B^+$
- $(BCC^+B^+)^* = BCC^+B^+$
- $(C^+B^+BC)^* = C^+B^+BC$

Так как мы знаем, что за матрицы B и C мы можем выразить их псевдообратные матрицы явно

- $BC(C^*(CC^*)^{-1})((B^*B)^{-1}B^*)BC = BC$
- $(C^*(CC^*)^{-1})((B^*B)^{-1}B^*)BC(C^*(CC^*)^{-1})((B^*B)^{-1}B^*) = (C^*(CC^*)^{-1})((B^*B)^{-1}B^*)$
- $(BC(C^*(CC^*)^{-1})((B^*B)^{-1}B^*))^* = BC(C^*(CC^*)^{-1})((B^*B)^{-1}B^*)$
- $((C^*(CC^*)^{-1})((B^*B)^{-1}B^*)BC)^* = (C^*(CC^*)^{-1})((B^*B)^{-1}B^*)BC$

Начнем раскрывать скобки

- $BC = BC$
- $(C^*(CC^*)^{-1})((B^*B)^{-1}B^*) = (C^*(CC^*)^{-1})((B^*B)^{-1}B^*)$
- $(B((B^*B)^{-1}B^*))^* = B(B^*B)^{-1}B^*$
- $((C^*(CC^*)^{-1})C)^* = (C^*(CC^*)^{-1})C$

Легко заметить, что все 4 аксиомы выполняются

3.10.2 Основная теорема

Для любой матрицы существует псевдообратная матрица

3.10.3 Начало доказательства

Мы знаем, что такая матрица есть для невырожденных матриц, матриц полного столбцового и строкового рангов и нулевых матриц, рассмотрим ситуацию для других матриц, которые не попадают в эту категорию. Мы знаем, что для любой матрицы можно применить скелетное разложение, так и сделаем для произвольной матрицы A , тогда $A = FG$, по свойству леммы о произведении матриц мы знаем, что $A^+ = G^+F^+$. При этом, мы знаем, что для любой матрицы полного столбцового ранга и полного строчного ранга, существует псевдообратная матрица, следовательно $A^+ = G^*(GG^*)^{-1}(F^*F)^{-1}F^*$. Следовательно, для любой матрицы существует псевдообратная.

3.11 Суть псевдообратной матрицы

В случае несовместных систем псевдообратная матрица позволяет получить наиболее точное приближенное решение по МНК. Сформулируем задачу более точно. Вектор \bar{u} называется приближенным решением системы $A\bar{x} = \bar{b}$ по МНК или псевдорешением, если для любого \bar{x} выполняется

$$\|A\bar{x} - \bar{b}\| \geq \|A\bar{u} - \bar{b}\| \quad (12)$$

Используется Евклидова норма, легко заметить, что если система имеет решение, то оно совпадает с псевдорешением

3.12 Теорема о псевдорешении

Вектор $\bar{u} = A^+ \bar{b}$ является псевдорешением и имеет наименьшую длину из всех псевдорешений

Доказательство

Заметим, что $\text{Im}(A)$ порождено столбцами матрицы A , а все векторы $\ker(A)$ ортогональны строкам матрицы A . Следовательно для любых $\bar{x} \in \text{Im}(A)$ и $\bar{y} \in \ker(A^*)$ выполняется $\bar{x} \cdot \bar{y} = 0$. Аналогично и в обратную сторону для $\bar{x} \in \text{Im}(A^*)$ и $\bar{y} \in \ker(A)$

3.12.1 Лемма

Для любого $\bar{x} \in \text{Im}(M)$ и $\bar{y} \in \text{Im}(A)$, выполняется $\bar{x} \cdot \bar{y} = 0$, если $M = AA^+ - E$

Доказательство

Если мы покажем, что $\text{Im}(M) \subset \ker(A^*)$, тогда точно лемма будет доказана по свойству выше. Рассмотрим вектор $y = Mx \in \text{Im}(M)$, покажем, что $A^*y = 0$. $A^*Mx = 0$, следовательно $(A^*AA^+ - A^*)x = 0$. По аксиоме три $(A^*(AA^+)^* - A^*)x = 0$. Это равняется $((AA^+)^* - A^*)x = 0$. Что приводит к $(A^* - A^*)x = 0$. Таким образом данное равенство выполняется всегда. **Ч.Т.Д**

3.12.2 Возврат к доказательству

Если $\bar{x} \cdot \bar{y} = 0$, то тогда для $\bar{z} = \bar{x} + \bar{y}$ выполняется следующее равенство $\|\bar{z}\|^2 = \|\bar{x}\|^2 + \|\bar{y}\|^2$. Покажем это $\|\bar{z}\| = \sqrt{\bar{z} \cdot \bar{z}}$, раскрывая это получим: $\sqrt{(\bar{x} + \bar{y}) \cdot (\bar{x} + \bar{y})}$, что приводит нас к выражению $\sqrt{\bar{x} \cdot \bar{x} + \bar{y} \cdot \bar{y}}$. Следовательно мы получаем, что $\|\bar{z}\|^2 = \|\bar{x}\|^2 + \|\bar{y}\|^2$. **Ч.Т.Д**

Отсюда мы получаем неравенство: $\|\bar{z}\| \geq \|\bar{x}\|$ (или \bar{y})

Покажем, что $u = A^+b$ является псевдорешением. Рассмотрим $f(x) = Ax - b$ нам нужно показать, что такой вектор имеет длину больше чем $AA^+b - b$. Мы можем заметить, что второе выражение равно $(AA^+ - E)b$. А $Ax \in \text{Im}(A)$, следовательно эти два вектора перпендикулярны.

Мы можем записать $f(x)$ как $Ax - Au + Au - b$, где $u = A^+b$

$$Ax - Au + Au - b = A(x - u) + (AA^+ - E)b \quad (13)$$

Легко увидеть, что данные слагаемые перпендикулярны, таким образом исходя из неравенства выше

$$\|A(x - u) + (AA^+ - E)b\| \geq \|(AA^+ - E)b\| \quad (14)$$

Раскрывая скобки получим, что для любого x

$$\|f(x)\| \geq \|AA^+b - b\| \quad (15)$$

Легко заметить, что равенство достигается при

$$A(x - A^+b) = 0 \quad (16)$$

Покажем, что такое решение имеет минимальную длину по сравнению с другими псевдорешениями

Пусть x другое псевдорешение, т.е $A(x - u) = 0$

Покажем, что $(x - u) \perp u$, при условии $A(x - u) = 0$. Рассмотрим их произведение

$$(x - u)^* \cdot u = b^* A^{+*} (x - u) \quad (17)$$

При этом $A^{+*} = (A^+ A A^+)^* = A^{+*} A^+ A^*$. Итого мы получаем, что скалярное произведение имеет вид

$$b^* A^{+*} A^+ A (x - u) = 0 \quad (18)$$

Ч.Т.Д

Используя прошлое неравенство мы получим, что

$$\|x - u + u\| \geq \|u\| \quad (19)$$

Мы доказали, что псевдорешение A^+b имеет минимальную длину среди всех возможных

3.12.3 Как описать все псевдорешения?

Все псевдорешения могут быть описаны формулой

$$A(x - A^+b) = 0 \quad (20)$$

Можно заметить, что, если

$$x = A^+b - (A^+A - E)y \quad (21)$$

где y — это произвольный вектор, то тогда подставив такой x в формулу мы получим, что

$$A(A^+b - (A^+A - E)y - A^+b) = -A(A^+A - E)y = -(A - A)y = 0 \quad (22)$$

Следовательно любой такой вектор подходит в качестве псевдорешения, т.е. минимизирует норму между собой и целевым вектором

4 Матричные разложения

4.1 LU разложение

LU разложение позволяет представить матрицу как произведение двух матриц L — нижнетреугольная матрица с единицами на диагонали, а U — верхнетреугольная

4.1.1 Теорема об LU разложении

Пусть A — матрица (n, n) и все угловые подматрицы невырождены. Тогда существует единственное разложение $A = LU$, где L — нижнетреугольная с единицами на диагонали, а U — верхнетреугольная матрица

Доказательство

Докажем по индукции, что такое разложение существует, база индукции выглядит так: для матрицы $(1, 1)$ мы получим $L = \begin{pmatrix} 1 \end{pmatrix}$ и $U = \begin{pmatrix} a_{11} \end{pmatrix}$

Пусть разложение существует для любой матрицы размерами $(n-1, n-1)$ для которой выполнены требования, покажем что в таком случае оно существует для любой матрицы A с размерами (n, n) . Представим A в блочном виде

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{nn} \end{bmatrix} \quad (23)$$

Тут матрица A_{11} имеет размеры $(n-1, n-1)$ по условию все угловые миноры ненулевые, следовательно для данной подматрицы существует LU разложение $A_{11} = L_{11}U_{11}$

Мы хотим представить A как LU , рассмотрим как должны выглядеть такие матрицы в предположении, что L и U будут занимать соответствующие им блоки

$$L = \begin{bmatrix} L_{11} & 0 \\ l_{21} & 1 \end{bmatrix} \quad (24)$$

и

$$U = \begin{bmatrix} U_{11} & u_{12} \\ 0 & u_{nn} \end{bmatrix} \quad (25)$$

Тогда произведение матриц задается как

$$LU = \begin{bmatrix} L_{11}U_{11} & L_{11}u_{12} \\ l_{21}U_{11} & l_{21}u_{12} + u_{nn} \end{bmatrix} \quad (26)$$

Нужно заметить, что l_{12} — вектор строка

Запишем наши равенства

$$\begin{cases} L_{11}u_{12} = a_{12} \\ l_{21}U_{11} = a_{21} \\ l_{21}u_{12} + u_{nn} = a_{nn} \end{cases}$$

Тут l_{12} — вектор строка и u_{12} — вектор столбец

L_{11} однозначно обратима, а U_{11} так как все угловые миноры неотрицательны ($\det(A_{11}) = \det(L_{11}) \cdot \det(U_{11})$ и при этом $\det(A_{11}) \neq 0$)

$$\begin{cases} u_{12} = L_{11}^{-1}a_{12} \\ l_{21} = a_{21}U_{11}^{-1} \\ u_{nn} = a_{nn} - a_{21}U_{11}^{-1}L_{11}^{-1}a_{12} = a_{nn} - a_{21}A_{11}^{-1}a_{12} \end{cases}$$

Мы можем заметить, что такое разложение единственно, и для него строго необходимо, чтобы матрица в левом верхнем блоке обращалась

4.1.2 Практический подход для LU разложения

Мы можем привести матрицу A к нижнетреугольному виду с помощью метода Гаусса, а после найти U как $U = L^{-1}A$

4.1.3 Где используется

Можно выделить следующие use-case:

- Быстрое решение систем вида $Ax = y$. Такая система превращается в две треугольные системы при ее представлении как: $LUx = y$

- Численно стабильное решение задачи нахождения \det , так как мы можем использовать натуральный логарифм от детерминанта и при этом сохранять численную стабильность решения, так как $\det(A) = \det(L) \cdot \det(U) = 1 \cdot \prod_i^n U_{ii}$
- Более удобное обращение раскладываемой матрицы

4.2 LUP-разложение

Данное разложение является обобщением LU разложения на случай любой квадратной невырожденной матрицы. Любая матрица может быть представлена в виде:

$$PA = LU \tag{27}$$

Т.е мы выполняем разложение для матрицы PA , где P отвечает за перестановку строк в матрице A . Мы всегда можем привести невырожденную матрицу A к такому виду, чтобы к ней можно было применить LU разложение, это следует из метода окаймляющих миноров для определения ранга.

Хорошим алгоритмом для LUP разложения является алгоритм Дулиттла (рассмотрим позже), который позволяет удобно векторизовать вычисления. Однако алгоритмическая сложность все также составляет $O(n^3)$