

1. NOTATIONS UNIVERSELLES

$$\tau = 2\pi$$

2. VOLUME ET MÉTRIQUES

2.1. Cas riemannien. Soit (M, g) une variété riemannienne orientée. Alors dans *n'importe quelle carte* (orientée) $(x^i)_i$ on peut écrire

$$(1) \quad g_x = \sum_{i,j} g_{ij}(x) dx^i \otimes dx^j$$

Le tenseur g_{ij} est

- Symétrique : $g_{ij} = g_{ji}$
- Positif : $\sum g_{ij} x^i x^j \geq 0$
- Défini : $(\sum g_{ij} x^i x^j = 0) \Rightarrow (x = 0)$

On définit la forme de volume riemannienne

$$(2) \quad dVol = \sqrt{\det(g)} dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n$$

Elle ne dépend pas du choix de la carte !

On peut remarquer que

$$(3) \quad dVol = E_1^* \wedge \cdots \wedge E_n^*$$

où $(E_i)_i$ base orthonormée orientée de TM et (E_i^*) la base duale.

2.2. Cas hermitien. Soit X une variété complexe. Alors une métrique hermitienne h sur X peut s'écrire dans *n'importe quelle carte* holomorphe $(z^i)_i$ comme

$$(4) \quad h_x = \sum_{i,j} h_{ij}(z) dz^i \otimes d\bar{z}^j$$

Rq : Une métrique hermitienne est antiholomorphe à droite

On lui associe :

- $\omega = -Im(h)$ la forme fondamentale [?]
- $g = Re(h)$ la métrique riemannienne sous-jacente

Dès lors

$$(5) \quad h = g - i\omega$$

d'où

$$(6) \quad g(I_-, _) = \omega$$

et

$$(7) \quad \omega(I_-, _) = -g$$

On pose $dV_\omega = \omega^n / n!$ forme volume hermitienne [?]

On a la relation

$$(8) \quad dV_\omega = 2^n dVol$$

2.3. Sur \mathbb{P}^1 .

$$\omega_{FS} = i \partial \bar{\partial} \log(1 + \zeta \bar{\zeta}) = \frac{i d\zeta \wedge d\bar{\zeta}}{(1 + \zeta \bar{\zeta})^2}$$

En posant $\zeta = re^{i\theta}$ on a

$$i d\zeta \wedge d\bar{\zeta} = 2r dr \wedge d\theta$$

et donc on en déduit que

$$\int_{\mathbb{P}^1} \omega_{FS} = \int_0^\tau \int_0^\infty \frac{2r dr d\theta}{(1 + r^2)^2} = \tau$$

Et $Vol(\mathbb{P}^1) = \frac{1}{2} \int_{\mathbb{P}^1} \omega = \pi$: La sphère de rayon $\frac{1}{2}$.

2.3.1. *Courbure.* Une section locale du tangent de \mathbb{P}^1 est un champ de vecteur local. Prenons $X = \partial_\zeta$ alors sa norme relativement à la métrique ω_{FS} est

$$|\partial_\zeta|^2 = \frac{1}{(1 + \zeta\bar{\zeta})^2}$$

D'où la courbure de \mathbb{P}^1 est donnée dans cette carte par

$$\Theta(T\mathbb{P}^1) = -i \partial\bar{\partial} \log \left(\frac{1}{(1 + \zeta\bar{\zeta})^2} \right) = 2\omega_{FS}$$