







Technische
Universität
Braunschweig



Plant Biotechnology
and Bioinformatics



species biosynthesis proteins analysis different conditions
biosynthesis biosynthesis within genes functional variants H293-MYB
within genes within genes site data dioxigenases Col-0 varient
dioxigenases dioxigenases dioxigenases non-canonical
sequencer ICGM single reference multiple protein annotation level identified
sites structures synthesis genes loc accession facula evolutionary
sites enzymes model systems biology long insertion Canophylales
plants plants Keyverda genes systems biology long insertion Arabidopsis
pigments model genome key against canonical for conserved free thaliana
genomes across evolution sequencing flavonoid conservation sequencing evolution
gene read transcription synthetic accessions identification sequence
MYB introns residues RNA-Seq



Kamille - eine universelle Heilpflanze?

Prof. Dr. Boas Pucker

Verfügbarkeit der Materialien

PDF über GitHub verfügbar: [xxx](#)

Materialien unter CC BY 4.0 verfügbar (#OpenEducation)
Fragen, Feedback & mehr: b.pucker[a]tu-bs.de




Echte Kamille (*Matricaria chamomilla* L.)

- Familie der Asteraceae (Korbblütler)
- Einjährige, krautige Pflanze
- 15-50 cm hoch
- Sonniger Standort
- Ernte: 3-5 Tage nach Aufblühen
- Blütenköpfchen (Matricariae flos) pharmazeutisch verwendet



Matricaria chamomilla L. Observed in Greece by chichar (licensed under <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>) ; Alternative Namen: *Matricaria recutita*, *Chamomilla recutita*



Based on <https://doi.org/10.1038/s41598-021-00510-4>

Ökonomische Relevanz von Kamille


- Blüten sind Pflanzenteil, der Wirkstoff enthält
- Kamillentee wird aus ganzen Pflanzen hergestellt
- Preise sind stark abhängig von Qualität des Materials
- Preisentwicklungen (Blüten):
 - 1991: \$ 16.000 / t
 - 1997: \$ 617.000 / t
 - 2011: \$ 7 million / t
 - 2024: \$ 6.45 million / t



CC BY-SA 2.0 Deed, <https://www.flickr.com/photos/schrift-architekt/8083589636>

Historischer Hintergrund

- Kamille bereits im Alten Ägypten als heilige Pflanze verehrt (Sonnengott "Re")
- In Griechischer/Römischer Kultur als Heilpflanze verwendet
- *Matricaria* („Mutterkraut“) deutet auf Verwendung bei Frauenkrankheiten hin
- Matrix = Gebärmutter




CC BY-SA 3.0; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sun_god_Ra2.svg



CC BY 4.0 Deed; <https://vectorportal.com/de/vector/antiker-%C3%BCberlicher-helm.ai> / 19195

Verbreitung

- Import von Süd- und Osteuropa nach Mitteleuropa
- Hauptsächlich in Europa, inzwischen weltweit
- Neophyt, teilweise Klassifikation als invasive Art
- Anbauländer: Ägypten, Argentinien, Deutschland, Kroatien



GBIF = Global Biodiversity Information Facility

<https://www.gbif.org/species/8370958>

Verwechslungsgefahr!


- Echte Kamille (*Matricaria chamomilla*): hohler Blütenboden
- Hundskamille (*Chamaemelum nobile*): gefüllter Blütenboden
- Stinkende Hundskamille (*Anthemis cotula* L.): giftig



Matricaria chamomilla



Chamaemelum nobile



Echte Kamille
(Franz Eugen, CC0)

Anthemis cotula
(Franz Eugen, CC0)



Kamille-Identifikation per Dünnschichtchromatographie

Testlösung:

50 µL Öl
1 mL Xylen R

Referenzlösung:

2 µL Chamazulen
5 µL Bisabolol
10 mg Bornylacetat

Feste Phase:


TLC Silica R

Mobile Phase:

Ethylacetat R & Toluene R (5:95 v/v)

Detektion:


Anisoaldehydlösung R sprühen und erhitzen auf 100°C für 5 Minuten



EUROPEAN PHARMACOPOEIA


Ausgezeichnete Heilpflanze

- Kamille ist eine der am besten untersuchten Heilpflanzen
- 1987: Erste Arzneipflanze des Jahres
- 2002: Heilpflanze des Jahres
- Sehr vielseitiger Einsatz



Vielseitige Anwendungen

- Erkältungen
- Magen-Darm-Beschwerden
- Zahnfleischentzündungen
- Hautreizzungen und Wundbehandlung
- Beruhigende Wirkung durch Neurotransmitter GABA
- Entzündungshemmend, krampflösend, wundheilungsfördernd, antibakteriell und geruchsbindend



Anwendungsmöglichkeiten

- Tee (> 1 Mio Tassen pro Tag)
- Tinktur
- Öl
- Creme
- Gele
- Salben
- Mundsprays
- ...



Marco Verch CC BY 2.0 <https://www.flickr.com/photos/30478819@N09/50858245196/>



Pharma Preiss CC BY-NC 2.0 <https://www.flickr.com/photos/53798303@N02/11102349498>

Kaum Risiken, Nebenwirkungen oder Allergien

- Kaum Nebenwirkungen oder Allergien
- US Food and Drug Administration:
GRAS-Status (= Generally Regarded As Safe)
- Negative Effekte in Studien könnten auf
Kontaminationen beruhen
- Kamille wird nicht während
Schwangerschaften empfohlen (stimuliert
Uteruskontraktionen)



Tony Wills Alvesgaspar; CC BY-SA 3.0; https://en.wikipedia.org/wiki/File:Asteraceae_poster_3.jpg

Ausgewählte Kamille-Inhaltsstoffe

- **Terpenoide:** 5-70% (-)- α -Bisabolol (Levomenol), Bisabololoxide, Chamazulen
- Flavonoide: bis zu 6% **Apigenine**, **Luteoline**, Catechin und Flavonole
- **Schleimstoffe / Polysaccharide**
- Phenolische Komponenten: *p*-Coumarinsäure, Salicylsäure, ...
- Cumarine: Herniarin, Umbelliferon, Daphnetin, Daphnin



McKay & Blumberg, 2006: 10.1002/ptr.1900

Singh et al., 2011: 10.4103/0973-7847.79103

Miraj & Alesaeidi, 2016: 10.19082/3024


Miyaoui et al., 2022: 10.3390/life12040479

<https://www.pharmawiki.ch/wiki/index.php?wiki=kamille>




Terpenoide - Isoprenbiosynthese

- Isopren bildet die Grundlage für den Aufbau von Terpenen (Isoprenoiden)
- Methylerythritol 4-phosphat (MEP)-Weg oder Mevalonat (MVA)-Weg liefern Monomere
- MEP-Weg in Plastiden
- MVA-Weg im Cytoplasma




Terpenoide - Verknüpfung der Isoprene

- Dimethylallylpyrophosphat (DMAPP) und Isomer Isopentenylpyrophosphat (IPP) werden zu Geranylpyrophosphat (GPP) verknüpft
- Bildung von Farnesylpyrophosphat (FPP) und Geranylgeranylpyrophosphat (GGPP)



Andrew Murkin




Terpenoide - Klassifikation

- Terpene werden auf Grundlage der Isopren-Einheiten klassifiziert
- Terpensynthasen (TPS) katalysieren die Biosynthese
- Terpenoide beinhalten modifizierte Terpene
- Cytochrome P450-Enzyme häufig in Modifikation involviert

Terpenoid	# Isopren	# Kohlenstoff
Hemiterpenoide	1	5
Monoterpenoide	2	10
Sesquiterpenoide	3	15
Diterpenoide	4	20
Sestertenoide	5	25
Triterpenoide	6	30
Tetraterpenoide	8	40

Wichtige Terpenoide in Kamille

- Bisabolol / Bisabololoxide gehören zu den pharmazeutisch wichtigen Terpenoiden
- Bisabolol unterstützt Hautheilungen u.a. durch antibakterielle Wirkung^[1]
- Bisabolol reduziert die Freisetzung/Aktivität von proteolytischem Pepsin im Magen^[2,3]




10.2300/lifc120000170

[1] Rodrigues et al., 2018: 10.1016/j.micpath.2018.09.024
[2] Wagner & Wolff, 1976: New Natural Products and Plant Drugs with Pharmacological, Biological or Therapeutical Activity
[3] Isaac & Thiemer, 1975: Arzneimittelforschung. 25(9):1352-4. PMID: 21



Was verursacht die blaue Farbe des Kamillen-Öls?


- Chamazulen = Chamomilla + azur (himmelblau) + Alk[I]en
 - Chamazulen inhibiert bestimmte humane CYPs, die sonst Wirkstoffe abbauen^[1]
 - Chamazulen entsteht aus Matricin während Wasserdampfdestillation aus Blütenköpfchen



<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/> | 2009

Wie funktioniert eine Wasserdampfdestillation?

- Schonende Methode zur Extraktion lipophiler Komponenten
- Siedendes Wasser zieht wasserunlösliche Substanz mit
- Trennung von Produkt und Wasser durch Scheidetrichter




Basierend auf einer Abbildung von Joanna Kośmider




Flavonoide

- Flavonoide basieren auf Phenylalanin
- Verschiedene Zweige führen zu Produkten mit unterschiedlichen Eigenschaften
- Flavone und Flavonole sind farblos oder schwach gelblich gefärbt
- Komplexe Glykosylierung von Flavonoiden



Flavone

- CHI = Chalconisomerase
- FNS = Flavon synthase
- F3'H = Flavonoid 3'-hydroxylase
- OMT = O-Methyltransferase
- Glykosylierung erfolgt durch Vielzahl verschiedener Enzyme



Pharmazeutische Wirkung von Flavonoiden aus Kamille

- Apigenin:
 - Positive Effekte gegen Angst in Maus/Rattenstudien^[1]
 - Antioxidative und entzündungshemmende Effekte^[2,4]
- Quercetin: Krampflösende Wirkung^[3]
- Luteolin: Entzündungshemmende Effekte^[4]

[1] Nakazawa et al., 2003: 10.1248/bpb.26.474


[2] <https://www.koehler-pharma.de/elements-of-life/pflanzliche-substanzen/apigenin-kamille-extrakt>

[3] <https://www.myrrhinil.de/myrrhinil-intest/kamille>


[4] Schilcher H.: Die Kamille, Handbuch für Ärzte, Apotheker und andere Naturwissenschaftler. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH, Stuttgart, 1987.

Bestimmung des Apigeningehalts

2 g pulverisiertes Blütenmaterial



↓
Metabolitextraktion



HPLC-Analyse:

Säule: Octadecylsilyl-Kieselgel

Mobile Phase A: Phosphorsäure, Wasser (0.5:99.5 v/v)



Mobile Phase B: Phosphorsäure, Acetonitril (0.5:99.5 v/v)

Zeit (Minuten)	Mobile PhaseA (% v/v)	Mobile PhaseB (% v/v)
0-9	75	25
9-19	75 -> 25	25 -> 75
19-24	25	75

Flussrate: 1 mL/min

Detektion: 340 nm

Injektion: 20 µL



Auswertung:

A_1 = Fläche unter Apigenin 7-glukosid Peak in Testlösung

A_2 = Fläche unter Apigenin 7-glukosid Peak in Referenzlösung

m_1 = Masse der eingesetzten Blüten

m_2 = Masse von Apigenin 7-glukosid in Referenzlösung

P = Prozentualer Apigenin 7-glukosid-Gehalt in Reagenz


Prozentualer Apigenin 7-glukosid-Gehalt:

$$\frac{A_1 \times m_2}{A_2 \times m_1} \times P \times 0,625$$



Schleimstoffe (Polysaccharide)

- Aufnahme von Wasser bildet Hydrokolloide
- Kamille enthält ca. 10% Schleimstoffe, hängt stark von Wachstumsbedingungen ab
- Wirkung:
 - Schutz der Haut gegen Reizungen
 - Schutz der Schleimhäute des Verdauungstrakts
- Temperatursensitivität erfordert Kaltauszug (Mazerat)
- swelling index = Zunahme von Volumen oder Gewicht bei Wasserzugabe (15.8 bis 80.8)



Optimierte Produktion

- Keimung ist unzuverlässig, Vermehrung am besten durch pikieren von Sämlingen
- Abstand der Pflanzen hat Einfluss auf Anzahl der Blüten
- Herbizid-Behandlung beeinflusst Metabolitgehalt (weniger Chamazulen)
- Blüten können von Pilzen befallen werden (*Aspergillus, Penicillium*)



<https://pxhere.com/de/photo/594052>



Verbesserung durch Forschung/Züchtung

- Verbesserte, maschinelle Beerntbarkeit:
 - 600 kg/ha Blütendrogenertrag angestrebt
 - Hohe Regenerationsfähigkeit nach erster und zweiter Pflücke
- Verbesserung des Inhaltsstoffgehalts:
 - ≥25% Matrizin/Chamaluzengehalt
 - Steigerung Apigeningehalt
- Geringe Anfälligkeit gegenüber pilzlichen Schaderregern
- Verbesserung der Arzneipflanzentrocknung



Plescher & Sonnenschein, 2013: https://veranstaltungen.fnr.de/fileadmin/allgemein/pdf/veranstaltungen/Pflanzenzuechtung_2017/Sonderkulturen/Albrecht_Pharmaplant.pdf

Albrecht et al., 2017: https://veranstaltungen.fnr.de/fileadmin/allgemein/pdf/veranstaltungen/Pflanzenzuechtung_2017/Sonderkulturen/Albrecht_Pharmaplant.pdf

Ziegler, 2017: file:///home/bp/Downloads/BAB_94_Leitfaden_Trocknung_final.pdf

Warum ist Kamille so besonders?

- Gleiche Substanzen nicht in nah verwandten Arten
- Kombination von bestimmten Substanzen essentiell (Synergie)
- Observation bias (andere Arten viel weniger verwendet/untersucht)
- Überall und einfach anbaubar



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Matricaria_recutita.jpg CC BY-SA 3.0

Zusammenfassung

- Biologie der Kamille und Unterscheidung von ähnlichen Arten
- Verwendung von Kamille (Entzündungen, Erkältungen, Hautreizungen, Magen-Darm-Probleme)
- Wichtige Inhaltsstoffe (Terpenoide, Flavonoide, Schleimstoffe/Kohlenhydrate)
- Extraktionsmethoden: Wasserdampfdestillation, Kaltauszug (Mazerat), Tee
- Ansätze/Ziele für Produktionsoptimierungen


Weiterführende Literatur

- Informationen zur Verbreitung: <https://www.gbif.org/species/8370958>
- Allgemeine Informationen & Metabolite: <https://dx.doi.org/10.4103/0973-7847.79103>
- Terpenoide: <https://doi.org/10.1073/pnas.1419547112>
- Flavonoide: <https://doi.org/10.1017%2Fjns.2016.41>
- Schleimstoffe: <https://doi.org/10.1016/j.bbagen.2014.05.003>


Zeit für Fragen!

Warum produzieren Pflanzen spezialisierte Metabolite?


- Proximate Ursache: Enzymatische Promiskuität
- Ultimate Ursachen:
 - (A)biotische Umwelt-Interaktionen
 - Co-evolution und Linien-spezifische Eigenschaften




Flavonole & Flavone




Phenolische Komponenten




Gallic acid




Vanillic acid




Syringic acid




p-Hydroxybenzoic acid




Caffeic acid





p-Coumaric acid




Ferulic acid




Protocatechuic acid



Catechol




Salicylic acid




Ellagic acid

10.3390/life12040479


Cumarine




Herniarin



Umbelliferone



Daphnetin



Daphnin

10.3390/life12040479

Behandlung von Tieren

- Kamillentee für Hunde und Katzen (Verdauung, Haut, Schleimhäute)
- Fütterung von Pferden mit Kamille zur Behandlung von Koliken (25-50 g pro Tag)
- Gegen kleine Entzündungen und Verdauungsprobleme bei Kaninchen (0,1-1g pro Tag)
- Gegen Entzündungen bei Hühnern (abgekühlten Tee 1:1 mit Trinkwasser mischen)
- Nicht Augen behandeln wegen Infektionsgefahr



<https://www.krauterie.de/kamille-hunde.html>
<https://www.masterhorse.de/>
<https://www.kaninchen-haltung.com>
<https://huehner-kraeuter.de/kamille-fuer-huehner-wie-gesund-ist-das/>