



Yth.

1. Seluruh Kepala Bidang
2. Komite Medik
3. Kepala Instalasi Farmasi

**SURAT EDARAN
NOMOR : 1042/I-SE/DIR/VIII/2024**

**TENTANG
SK FORMULARIUM TAHUN 2024**

Berikut kami lampirkan data SK Formularium tahun 2024 berdasarkan Keputusan Direktur Utama Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor : 110.1/DPM/I-KEP/DIR/III/2024 tentang Penetapan Formularium Rumah Sakit Prima Husada (Data terlampir)

Demikian surat edaran ini dibuat, mohon dijadikan perhatian dan dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 05 Agustus 2024
PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Nur Mazidah



FORMULARIUM PT. DISA PRIMA MEDIKA TAHUN 2024

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : disaprimamedika@gmail.com

FORMULARIUM PT. DISA PRIMA MEDIKA 2024

Disusun oleh :
Ketua Tim Penyusunan Formularium PT. Disa Prima Medika



(Endang Susilowati)

Pengadaan Farmasi PT. Disa Prima Medika



(apt. Yeny Imas Christiana, S. Farm)

Disetujui Oleh :
Ketua Komite Farmasi dan Terapi



(dr. Sadi Hariono, MMRS)

**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PERSEROAN TERBATAS DISA PRIMA MEDIKA
NOMOR : 110.1/DPM/I-KEP/DIR/III/2024**

TENTANG

PENETAPAN FORMULARIUM RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA


DIREKTUR UTAMA PERSEROAN TERBATAS DISA PRIMA MEDIKA,

- Menimbang : a. bahwa Formularium disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sesuai kajian pola penyakit yang terjadi di rumah sakit dan mempertimbangkan formularium nasional
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur PT. Disa Prima Medika tentang Formularium yang berlaku di Rumah Sakit Prima Husada
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- e. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- f. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- g. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
- h. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/813/2019 tentang Formularium Nasional
- i. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 001.207/DPM/I-KEP/KOM/II/2024 tentang Perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : **KEPUTUSAN DIREKTUR PERSEROAN TERBATAS DISA PRIMA MEDIKA TENTANG PENETAPAN FORMULARIUM RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA**
- Kedua : Penetapan Formularium Rumah Sakit Prima Husada sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Keempat : Keputusan ini dapat dilakukan perubahan jika diperlukan

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 6 Maret 2024
Direktur Utama Perseroan Terbatas Disa Prima


 **PT. DISA PRIMA MEDIKA**
Endang Susilowati

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya Formularium Rumah Sakit Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit Prima Husada.

Formularium PT. Disa Prima Medika ini yang mulai dipergunakan pada tahun 2023 meliputi daftar sediaan farmasi yang tersedia di rumah sakit dan telah disepakati oleh para anggota Komite Farmasi dan Terapi.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah berjuang untuk menyelesaikan formularium ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para kontributor yang telah memberikan masukan sangat berharga.

Semoga dengan dipergunakan Formularium PT. Disa Prima Medika yang menaungi Rumah Sakit Prima Husada Malang dan Sukorejo ini, mutu pelayanan dan keselamatan pasien rumah sakit Prima Husada Group dapat lebih baik.

Malang, 6 Maret 2024
Direktur Utama PT. Disa Prima Medika

Endang Susilowati

DAFTAR ISI

SAMPUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
PERATURAN DIREKTUR	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
1 Analgesik, Antipiretik, Antiinflamasi Non Steroid, Antipirai	1
1.1 Analgesik Narkotik.....	1
1.2 Analgesik Non Narkotik	2
1.3 Anti Pirai.....	5
1.4 Nyeri Neuropatik	6
2 Anestetik	6
2.1 Anastesik Lokal.....	6
2.2 Anastesik Umum dan Oksigen	7
2.3 Obat untuk Prosedur Pre Operative.....	7
3 Relaksan Otot Perifer dan Penghambat Kolinesterase.....	8
3.1 Penghambat dan Pemacu Transmisi Neuromuskuler	8
3.2 Obat untuk Miastenia Gravis	8
3.3 Penghambat Kolinesterase	9
3.4 Spasme Muskuloskeletal.....	9
4 Antialergi dan Anafilaksis	10
5 Antidot dan Obat Lain untuk Keracunan.....	10
6 Antiepilepsi-Antikonvulsi	11
7 Antiinfeksi	13
7.1 Anti Bakteri	13
7.1.1 Beta Laktam	13
7.1.2 Sefalosporin.....	14
7.2 Antibakteri Lain	16
7.2.1 Tetrasiklin	16
7.2.2 Sulfametoksazol-Trimetoprim	16
7.2.3 Makrolida.....	16
7.2.4 Linkosamid	16
7.2.5 Aminoglikosida	17
7.2.6 Kuinolon	17
7.2.7 Lain-Lain.....	18
7.3 Anti Infeksi Khusus	19
7.3.1 Antiseptik Saluran Kemih.....	19
7.3.2 Anti Fungi	19
7.3.3 Anti Virus	20
7.3.4 Antituberkulosis.....	20
8 Anti Migrain dan Anti vertigo	22
8.1 Anti Migrain	22
8.1.1 Profilaksis	22
8.2 Anti Vertigo	23
9 Anti Neoplastik, Imunosupresan, dan Obat untuk Terapi Paliatif.....	23
9.1 Hormon dan Anti Hormon.....	23
9.2 Imunosupresan	24
9.3 Neurotonik	24
10 Anti Parkinson	25
11 Obat yang Mempengaruhi Darah.....	25
11.1 Anti Anemia	25

11.2 Obat yang Mempengaruhi Koagulasi.....	26
11.3 Obat untuk Kelebihan Besi.....	27
12 Produk Darah Dan Pengganti Plasma.....	27
12.1 Pengganti Plasma dan Plasma Ekspander	27
13 Diagnostik.....	29
13.1 Bahan Kontras Radiologi.....	29
13.2 Tes Fungsi.....	29
13.2.1 Tes Kulit	29
13.3 Ultrasound	29
13.4 Lain-Lain	29
14 Antiseptik dan Disinfektan.....	30
14.1 Antiseptik	30
14.2 Disinfektan	30
15 Obat dan Bahan untuk Gigi.....	30
15.1 Anti Fungi Orofaringeal	30
16 Diuretik dan Obat untuk Hipertrofi Prostat.....	31
16.1 Diuretik.....	31
16.2 Obat untuk Hipertrofi Prostat.....	31
17 Hormon, Obat Endokrin Lain, dan Kontrasepsi.....	32
17.1 Anti Diabetes	32
17.1.1 Anti Diabetes Oral	32
17.1.2 Anti Diabetes Parenteral	33
17.2 Hormon Kelamin dan Obat yang Mempengaruhi Fertilitas	34
17.2.1 Estrogen	34
17.2.2 Progesteron.....	34
17.2.3 Kontrasepsi	34
17.2.3.1 Kontrasepsi, Oral	34
17.2.3.2 Kontrasepsi, Parenteral	34
17.2.3.3 Kontrasepsi, AKDR (IUD)	35
17.2.3.4 Kontrasepsi, Implan	35
17.3 Hormon Tiroid dan Anti Tiroid	35
17.4 Kortikosteroid.....	35
18 Obat Kardiovaskuler.....	36
18.1 Antiangina.....	36
18.2 Anti Aritmia	37
18.3 Anti Hipertensi Sistemik	38
18.4 Anti Hipertensi Pulmonal	43
18.5 Anti Agregasi Platelet	43
18.6 Obat untuk Gagal Jantung	44
18.7 Obat untuk Syok Kardiogenik dan Sepsis.....	46
19 Antihiperlipidemia.....	47
20 Obat Topikal untuk Kulit.....	48
20.1 Anti Bakteri	48
20.2 Anti Fungi.....	48
20.3 Anti Inflamasi dan Antipruritik.....	49
20.4 Antiskabies dan Antipedikulosis.....	49
20.5 Keratolitik dan Keratoplastik.....	49
20.6 Lain-Lain	49
21 Larutan Elektrolit, Nutrisi, dan Lain-Lain.....	50
21.1 Oral	50
21.2 Parenteral	51
21.3 Elektrolit Pekat.....	53
21.4 Lain-Lain	53

22 Obat untuk Mata.....	54
22.1 Miotik dan Antiglaukoma.....	56
23 Oksitoksik	57
24 Psikofarmaka.....	57
24.1 Anti Ansietas.....	57
24.2 Anti Depresi	58
24.3 Anti Obsesi Kompulsi	59
24.4 Anti Psikosis	59
24.5 Obat untuk Gangguan Bipolar.....	61
25 Obat untuk Saluran Cerna	62
25.1 Antasida dan Antiulkus.....	62
25.2 Antiemetik	63
25.3 Antihemoroid.....	64
25.4 Antispasmodik	65
25.5 Obat untuk Diare	66
25.6 Katartik.....	66
25.7 Obat untuk Antiinflamasi	67
25.8 Lain-Lain	67
26 Obat Untuk Saluran Nafas	67
26.1 Antiasma.....	67
26.2 Antitusif	71
26.3 Ekspektoran dan Antimukolitik.....	71
26.4 Obat untuk Penyakit Paru Obstruksi Kronik	72
26.5 Batuk, Pilek, dan Flu.....	72
27 Obat yang Mempengaruhi Sistem Imun	74
27.1 Serum dan Immunoglobulin	74
27.2 Vaksin	75
28 Obat untuk Telinga, Hidung, dan Tenggorokan.....	78
29 Vitamin dan Mineral.....	79

KELAS TERAPI OBAT	SUB KELAS TERAPI/ NAMA GENERIK/ SEDIAAN/ KEKUATAN DAN RESTRIKSI PENGGUNAAN		NAMA OBAT	KATEGORI PASIEN										PERESEPAN RAWAT JALAN 30 HARI (OBAT KRONIS)	DIINPUT DALAM APOTEK ONLINE	PERESEPAN MAKSIMAL
				UMUM RANAP + RAJAL	KELAS BPJS KESEHATAN								ASURANS I			
					RAWAT JALAN	RAWAT INAP										
			KELA S I	KELA S II		KELAS III	NAIK KELAS I/II	NAIK KELAS VIP	NAIK KELAS VVIP	RF						
1. ANALGESIK, ANTIPIRETIK, ANTIINFLAMASI NON STEROID, ANTIPIRAI																
1.1 ANALGESIK NARKOTIK																
1	Fentanil															
	a)	Inj : Hanya untuk nyeri berat dan harus diberikan oleh tim medis yang dapat melakukan resusitasi.														
	1.	Inj. 0,05 mg/ml	Fentanyl inj	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	5 amp/kasus
2	Codein															
	1.	Tab. 10 mg	Codein	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Codein tab 10 mg	30 tab/bln
	2.	Tab. 20 mg	Codein	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Codein tab 20 mg	30 tab/bln
3	Morfin HCl															
	a)	Hanya untuk pemakaian pada tindakan anestesi atau perawatan di Rumah Sakit;														
	b)	Untuk nyeri pada serangan jantung.														
	1.	Inj. 10 mg/ ml	Morfin	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	infus per 24 jam
	2.	Tab. 10 mg	MST Continus	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Mst Continus Tab 10 Mg	60 tab/bulan

4	Pethidin HCl															
	1.	Inj. 50 mg/ ml	Pethidin HCl	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	2 amp/hari
	a)	Hanya untuk nyeri sedang hingga berat pada pasien yang dirawat di Rumah Sakit.														
1.2 ANALGESIK NON NARKOTIK																
1	Asam mefenamat															
	1.	Tab. 500 mg	Asam mefenamat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	Asam Mefenamat 500	30 tab/bulan.
2	Ibuprofen															
	1.	Tab. 400 mg	Ibuprofen tab 400 mg	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Ibuprofen 400 SK21 tab 400 mg	30 tab/bulan.
	2.	Susp 100 mg/5 ml	Ibuprofen susp 100 mg/5 ml	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Ibuprofen 100 mg/5mL	Maks 1 btl/kasus
	3.	Susp 200 mg/5 ml	Ibuprofen susp 100 mg/5 ml	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Ibuprofen 200 mg/5mL	Maks 1 btl/kasus
3	Kalium diklofenak															
	1.	Tab. 50 mg	Kalium diklofenak	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
4	Ketoprofen															
	1.	Tab. 100 mg	Ketoprofen	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
	2.	Sup. 100 mg	Kaltrofen Supp 100mg	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	2 sup/hari, maks 3 hari
		Untuk nyeri sedang sampai berat pada pasien yang tidak dapat menggunakan analgesik secara oral.														
5	Ketorolac															
	1.	Tab. 10 mg	Ketorolac	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	30 tab/bulan

		Inj. 30 mg/ml	Ketorolac inj	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	2-3 amp/hari, maks 2 hari
	2.	Untuk nyeri sedang sampai berat pada pasien yang tidak dapat menggunakan secara oral.														
6	Natrium Diklofenak															
	1.	Tab. 50 mg	Natrium diklofenak	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Natrium diklofenak	30 tab/bulan
	2.	Tab. 75 mg	Voltaren SR	√	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	√	√	√	√	(-)	(-)	
7	Meloxicam															
	1.	Tab. 7,5 mg	Meloxicam 7,5 mg	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
	2.	Tab. 15 mg	Meloxicam 15 mg	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
8	Kombinasi mengandung : Mentol 55 g, eugenol 14 mg, metilsalisilat 102 mg															
	1.	Krim	Lafalos	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	RJ : sesuai plafon
9	Kombinasi mengandung : mentol 55 g, eugenol 14 mg, metilsalisilat 102 mg, vit. E 30 mg															
	1.	Krim	Lafalos Plus	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	RJ : sesuai plafon
10	Metamizol															
	1.	Inj. 500 mg/ml Untuk nyeri post operatif dan hanya dalam waktu singkat.	Metamizole Sodium	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	Sesuai plafon dan indikasi medis

11	Paracetamol															
	1.	Tab. 500 mg	Paracetamol	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	RJ : Sesuai plafon
	2.	Tab. 600 mg	Sumagesic tab	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	Rj : sesuai plafon dan Ri : maks 10 tab
	3.	Sir. 120 mg/ 5 ml	Paracetamol	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	Rj : sesuai plafon dan Ri : maks 2 btl
	4.	Inf. 10 mg/ ml btl. 100 ml	Paracetamol	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	3 btl/kasus
		Inf. 10 mg/ ml btl. 50 ml	Eterfix	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	
		Hanya untuk pasien di ruang perawatan intensif yang memerlukan 4lafond a berkelanjutan.														
	5.	Drop 60 mg/0,6 ml	Sanmol	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	Sesuai plafon dan indikasi medis
	6.	Sup. 160 mg	Propyretic	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	Sesuai plafon dan indikasi medis
	7.	Sup. 240 mg	Propyretic	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	Sesuai plafon dan indikasi medis
13	Kombinasi mengandung : parasetamol 350 mg, ibuprofen 200 mg															
	1.	Tab.	Profenal	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	Rj : sesuai plafon dan Ri : maks 10 tab
14	Tramadol															
	1.	Inj. 100 mg/2 ml	Tramadol	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	Sesuai plafon dan indikasi medis
	2.	Kaps. 50 mg	Tramadol	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	Sesuai plafon dan indikasi medis

16	Kombinasi mengandung : Methampyrone 500 mg, Diazepam 2 mg															
	1.	Tab.	Analsik	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	Rj : sesuai plafon dan Ri : maks 10 tab
17	Etoricoxib															
	1.	Tab. 60 mg	Etoricoxib	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	Rj : sesuai plafon dan Ri : maks 10 tab
18	Parecoxib															
	1.	Serb. Kering 40 mg	Repacor													
19	Celecoxib															
	1.	Kaps. 200 mg	Celexocib	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
1.3 ANTI PIRAI																
1	Allopurinol															
	Tidak diberikan pada saat nyeri akut.															
	1.	Tab. 100 mg	Allopurinol	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Allopurinol tab 100 mg	30 tab/bulan
	2.	Tab. 300 mg	Allopurinol	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Alopurinol tab 300 mg	30 tab/bulan
2	Sodium Hyaluronate															
	1.	Inj. 10 mg/ml	Umaron	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	paket RJ
	2.	Injeksi 25 mg/2,5 ml	Osflex	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	paket RJ

3	Kolkisin															
	1.	Tab. 0,5 mg	Colchicine	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Colcicine 500 Imph Kolkisin tab 500 mcg	30 tab/bulan
1.4 NYERI NEUROPATIK																
1	Amitriptillin															
	1.	Tab. 2 mg	Amitriptilin	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Amitriptyline 25 SK21 tab sal 25 mg	60 tab/bulan
2	Gabapentin															
	Hanya untuk neuralgia pascaherpes atau nyeri neuropati diabetikum.															
	1.	Tab. 300 mg	Gabapentin	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Gabapentin kaps 300 mg	Hanya untuk neuralgia pascaherpes atau nyeri neuropati diabetikum.. Maks kaps 30/bln
2. ANESTETIK																
2.1 ANESTETIK LOKAL																
1	Bupivakain heavy															
	1.	Bupivacaine HCl monohydrate 0,5% + Dextrose monohydrate 8%	Regivell	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	
		Khusus untuk analgesia spinal														
2	Levobupivakain HCl															
	1.	Inj. 5 mg/ml	Levica	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	
3	Lidokain															
	1.	Inj. 20 mg/ ml	Lidocain inj	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	
4	Ropivakain															
	1.	Inj. 7,5 mg/ml	Ropivell	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	

5	Etil klorida															
	1.	Spray 100 ml	Ethylchloride	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	
2.2 ANESTETIK UMUM DAN OKSIGEN																
1	Deksmedetomidin															
	Untuk sedasi pada pasien di ICU, kraniotomi, bedah jantung dan operasi yang memerlukan waktu pembedahan yang lama.															
	1.	Inj. 100 mcg/ml	Icunes	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	
2	Isoflurane															
	1.	Ih. 250 ml	Isonest	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	
3	Sevoflurane															
	1.	Ih. 250 ml	Sevodex	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	
4	Ketamin															
	1.	Inj. 100 mg/ml	KTM	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	
5	Nitrogen Oksida															
	1.	Ih. Gas dalam tabung	N2O	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	
6	Oksigen															
	1.	Ih. Gas dalam tabung	O2	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	
7	Propofol															
	1.	Inj. 10 mg/ml	Nupovell	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	
2.3 OBAT UNTUK PROSEDUR PRE OPERATIF																
1	Atropine															
	1.	Inj. 0,25 mg/ml	Atropine	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	

2	Diazepam															
	1.	Inj. 5 mg/ml	Diazepam inj	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	
3	Midazolam															
	Dapat digunakan untuk premedikasi sebelum induksi anestesi dan rumatan selama anestesi umum															
	1.	Inj. 1 mg/ml	Miloz	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	Dosis rumatan: 1 mg/jam (24 mg/hari). Dosis premedikasi: 8 vial/kasus.
			Sedacum	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	
3. RELAKSAN OTOT PERIFER DAN PENGHAMBAT KOLINESTERASE																
3.1 PENGHAMBAT DAN PEMACU TRANSMISI NEUROMUSKULER																
1	Atrakurium besilat															
	1.	Inj. 10 mg/ ml	Atrakurium besilat	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	
2	Neostigmin															
	1.	Inj. 0,5 mg/ml	Neostigmin	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	
3.2 OBAT UNTUK MIASTENIA GRAVIS																
1	Neostigmin															
	1.	Inj. 0,5 mg/ml	Neostigmin	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	
2	Piridostigmin bromide															
	1.	Tab. 60 mg	Mestinon	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Mestinon tab 60 mg	Maks. 120 tab/bulan.

3.3 PENGHAMBAT KOLINESTERASE																
1	Donepezil															
	a)	Hanya untuk demensia 9lafond a ringan sampai sedang.														
	b)	Hanya diresepkan oleh neurologi berdasarkan pemeriksaan <i>neurobehaviour</i> .														
	1.	Tab. 5 mg	Donepezil 5 mg	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Donepezil tab 5 mg	Hanya untuk demensia 9lafond a ringan-sedang.Hanya diresepkan oleh neurologi brdsrkn pemeriksaan neurobehaviour. Maks 30 tab/bulan
	2.	Tab. 10 mg	Donaccept 10 mg	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Donepezil tab 10 mg	Hanya untuk dimensia ringan-sedang. Hanya diresepkan oleh neurologi berdasarkan pemeriksaan neurobehaviour. Maks 30tab/ bulan.
3.4 SPASME MUSKULOSKELETAL																
1	Eperison HCl															
	1.	Tab. 50 mg	Eperison hcl	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	Rj : sesuai 9lafond an Ri : maks 10 tab
2	Tizanidine															
	1.	Tab. 2 mg	Tizanidine	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	Rj : sesuai 9lafond an Ri : maks 10 tab

4. ANTIALERGI DAN ANAFILAKSIS																
1	Cetirizine															
	1.	Tab. 10 mg	Cetirizine	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Setirizin tab 10 mg	Urtikaria kronik: maks 30 tab/bulan
	2.	Sir. 5 mg/ 5 ml	Cetirizine – Novapharin	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	1 btl/kasus
2	Cyproheptadin															
	1.	Tab. 4 mg	Heptasan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
3	Dexametason															
	1.	Tab. 0,5 mg	Dexamethasone	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
	2.	Inj. 5 mg/ml	Dexamethason	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	20 mg/hari
4	Difenhidramin															
	1.	Inj. 10 mg/ ml	Diphenhydramine HCl	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	30 mg/hari
5	Epinefrin															
	1.	Inj. 1 mg/ml	Epinephrine	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	
7	Klorpeniramin maleat															
	1.	Tab. 4 mg	CTM	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	3 tab/hari, maks 5 hari
8	Loratadin															
	1.	Tab. 10 mg	Loratadin	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Loratadine 10 mg	Urtikaria kronik: maks 30 tab/bulan
9	Mebidrolin															
	1.	Tab. 50 mg	Interhistine	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
5. ANTIDOT DAN OBAT LAIN UNTUK KERACUNAN																
1	Atropin															
	1.	Inj. 0,25 mg/ ml	Atropin	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	

2	Efedrin															
	1.	Inj. 50 mg/ ml	Ephedrine HCl	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	
3	Kalsium Glukonat															
	1.	Inj. 100 mg/ml	Calcii Gluconas	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	
5	Natrium Bicarbonat															
	1.	Tab. 500 mg	Sodium Bicarbonate	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
	2.	Inj. 8,4 % amp.	Meylon	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	
6	Neostigmin															
	1.	Inj. 0,5 mg/ml	Neostigmin	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	
6. ANTIEPILEPSI – ANTIKONVULSI																
1	Diazepam															
	1.	Inj. 5 mg/ml	Diazepam inj	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	10 amp/kasus, kecuali untuk kasus di ICU
	2.	Enema 5 mg/2,5 ml	Diazepam supp 5mg/2,5 ml	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	2 tube/hari, bila kejang
	3.	Enema 10 mg/2,5 ml	Diazepam supp 10mg/2,5 ml	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	2 tube/hari, bila kejang
2	Fenitoin															
	1.	Kaps. 100 mg	Phenytoin	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Fenitoin 100 SK 100 mg	Maks 120 kaps/bulan
	2.	Inj. 50 mg/ml	Phenytoin Sodium	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	Untuk status epileptikus, dapat diberikan hingga dosis 15 – 30 mg/kgBB
		Dapat digunakan untuk status konvulsivus														

3	Karbamazepin															
	1.	Tab. 200 mg	Karbamazepin	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Karbamazepin 200 mg	120 tab/bulan
4	Magnesium Sulfat															
	Hanya untuk kejang pada 12lafond an12v dan eklampsia. Tidak digunakan untuk kejang lainnya															
	1.	Inj. 20 mg/ml amp.	MgSO4 20 % - Otsuka	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	
	2.	Inj. 40 mg/ml amp.	MgSO4 40 % - Otsuka	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	
5	Pregabalin															
	1	Kaps. 75 mg	Pregabalin	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	Rj : sesuai 12lafond an Ri : maks 10 tab
6	Phenobarbital															
	1.	Inj. 50 mg/ml	Phenobarbital	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	40 mg/kgBB
	2.	Tab. 30 mg	Phenobarbital	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Fenobarbital 30 mg	Maks. 120 tab/bulan.
7	Levetirasetam															
	Sebagai terapi tambahan pada pasien 12lafond onset parsial															
	1.	Tab. 500 mg	Eterlox	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Levetirasetam 500 mg	90 tab/bulan.
8	Asam Valproat															
	Dapat digunakan untuk 12lafond umum (general epilepsy)															

	1.	Sir. 250 mg/5 ml	Asam Valproat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Valproat sir 250 mg/5 ml	5 btl/bulan
9	Na Divalproat															
	1.	Tab. Lepas lambat 500 mg	Divalproex Sodium	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Natrium Valproat tab 500 mg	Dapat digunakan untuk umum (general epilepsy). Maks 60 tab/ bulan. Untuk gangguan bipolar maks 60 tab/ bulan.
	2.	Tab. Sal. 13lafond 250 mg	Divalproex Sodium	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Valproat tab ER 250 mg	Dapat digunakan untuk umum (general epilepsy). Maks 120 tab/bulan. Untuk gangguan bipolar 60 tab/bln
7. ANTI INFEKSI																
7.1 ANTIBAKTERI																
7.1.1 BETA LAKTAM																
1	Amoksisilin															
	1.	Tab. 500 mg	Amoxicillin	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	10 hari
	2.	Sir. 125 mg/5 ml	Amoxicillin	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	1 btl/kasus
2	Kombinasi mengandung : amoksisilin 500 mg, asam klavunalat 125 mg															
	1.	Kaps. 625 mg	Co amoxiclav	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
3	Kombinasi mengandung : Ampicillin 500 mg, sulbactam 250 mg															
	1.	Sbk. Inj. 750 mg	Bactecyn – Kalbe	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	10 hari.

4	Benzatin benzilpenisilin															
	1.	Inj. 1,2 juta IU/ml	Benzatin benzilpenisilin	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	√	√	2 vial/bln
5	Procain Penisilin G															
	1.	Inj. 3 gram	Procain Penicilin G- Meiji	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	√	√	
7.1.2 SEFALOSFORIN																
1	Cefadroxil															
	Hanya untuk pasien rawat inap yang sebelumnya mendapatkan an parenteral													(-)	(-)	
	1.	Kaps. 500 mg	Cefadroxil	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	30 kaps/ kasus
	2.	Sir. Kering 125 mg/5 ml	Cefadroxil	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	2 btl/kasus
2	Cefixime															
	Hanya untuk pasien rawat inap yang sebelumnya mendapatkan 14lafond an parenteral sefalosporin generasi tiga atau sesuai hasil uji resistensi															
	1.	Kaps. 100 mg	Cefixime	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	10 hari
	2.	Kaps. 200 mg	Cefixime	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	10 hari
	3.	Sir. Kering 100 mg/5 ml	Cefixim syr	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	1 btl/kasus
3	Cefotaxime															
	1.	Sbk. Inj. 1000 mg	Cefotaxime	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	10 hari
4	Ceftazidime															
	1.	Sbk. Inj. 1000 mg	Ceftazidime	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	3 g/hari selama 7 hari

		Antibiotik lini ketiga (<i>reserved antibiotic</i>), untuk infeksi yang terbukti disebabkan oleh <i>Pseudomonas aeruginosa</i> .														
5	Ceftriaxone															
	1.	Sbk. Inj. 1000 mg	Ceftriaxone	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	2 g/hari selama 7 hari. Untuk meningitis 4 g/hari selama 14 hari
6	Cefuroxime															
	1.	Sbk. Inj. 750 mg	Cefuroxime	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	3 g/ kasus
7	Ceftizoxime															
	1.	Sbk. Inj. 1000 mg	Ceftizoxime	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	
8	Kombinasi mengandung : Cefoperazone 500 mg, sulbactam 500 mg															
	1.	Sbk. Inj. 1000 mg	Cefoperazone Sulbactam	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	10 hari
	a)	Antibiotik lini ketiga (<i>reserved antibiotic</i>).	Cefoperazone Sodium	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	10 hari
	b)	Infeksi berat yang tidak 15laf diatasi dengan 15lafond an tunggal.														
9	Cefazolin															
	1.	Sbk. Inj. 1000 mg	Cefazolin	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	Selama 24 jam
		Digunakan pada profilaksis bedah untuk mencegah terjadinya infeksi luka operasi														

7.2 ANTIBAKTERI LAIN																
7.2.1 TETRASIKLIN																
1	Doksisiklin															
	Tidak digunakan untuk anak usia < 6 tahun, ibu hamil, atau ibu menyusui.															
	1.	Kaps. 100 mg	Doxycycline	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	2 kaps/hari selama 10 hari
7.2.2 SULFAMETOKSAZOL-TRIMETOPRIM																
1	Kombinasi mengandung : Sulfametoksazol 400 mg, trimetoprim 80 mg															
	1.	Tab.	Cotrimoxazole	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	4 tab/hari selama 10 hari kecuali pada <i>immunocompromised</i> selama 21 hari
2	Kombinasi mengandung : Sulfametoksazol 200 mg, trimetoprim 40 mg															
	1.	Suspensi	Cotrimoxazole	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	1 btl/kasus
7.2.3 MAKROLIDA																
1	Azitromisin															
	1.	Tab. 500 mg	Azithromycin	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	3 tab/kasus
2	Eritromisin															
	1.	Kaps. 500 mg	Erythromycin	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	4 tab/kaps per hari selama 10 hari.
	2.	Sir. Kering 200 mg/5 ml	Erythromycin	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	2 btl/kasus.
7.2.4 LINKOSAMID																
1	Klindamisin															
	1.	Kaps. 150 mg	Clindamycin	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	4 kaps/hari selama 5 hari kecuali untuk toksoplasmosis selama 6 minggu

	2.	Kaps. 300 mg	Clindamycin	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	4 kaps/hari selama 5 hari kecuali untuk toksoplasmosis 8 kaps/hari selama 6 minggu. untuk abses paru atau 17lafond: 3-4 kaps/hari selama 14 hari
7.2.5 AMINOGLIKOSIDA																
1	Amikasin															
	Hanya digunakan untuk infeksi oleh bakteri gram 17lafond yang resisten terhadap gentamisin															
	1.	Inj 250 mg /ml	Mikaject inj	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	
2	Gentamicin															
	1.	Inj. 40 mg/ml	Gentamicin	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	
3	Kombinasi mengandung : Neomycin sulfat 0,5%, placenta extract 10%															
	1.	Krim	Bioplacenton	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
7.2.6 KUINOLON																
1	Ciprofloxacin															
	1.	Tab. 500 mg	Ciprofloxacin	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
	2.	Infus 2 mg/ml	Ciprofloxacin	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	4 btl/hari
2	Levofloxacin															
	Tidak digunakan untuk pasien usia < 18 tahun, ibu hamil, atau ibu menyusui.															
	1.	Tab. 500 mg	Levofloxacin	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	maks 10 hari

		Tab 750 mg	Levofloxacin	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	maks 10 hari
	2.	Inf. 500 mg	Levofloxacin	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	maks 10 hari
	3	Inf. 750 mg	Levofloxacin	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	maks 10 hari
3	Ofloxacin															
	1.	Tab. 400 mg	Ofloxacin	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	10 hari
4	Moxifloxacin															
	1.	Inf. 400 mg	Moxifloxacin	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
7.2.7 LAIN-LAIN																
2	Kombinasi mengandung : Fradiomisin 2,5 mg, gramisidin HCl 1 mg															
	1.	Tab.	FG Throches	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	Rj : sesuai 18lafond an Ri : maks 10 tab
3	Meropenem															
	1.	Sbk inj. 1000 mg	Meropenem	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	Febrile neutropenia: dosis 1-3 g/hari, sampai ANC > 500/mm3. Sepsis dan infeksi berat lainnya: dosis 1-3 g/hari maks 7 hari. Penggunaan maksimal 7 hari/kasus. Setelah hasil kultur diperoleh, maka digantikan dengan antibiotika lini pertama atau Meropenem hanya dapat dilanjutkan apabila hasil kultur menunjukkan bahwa meropenem adalah satu-satunya antibiotic yang masih bisa untuk

																bakteri penyebab infeksi
4	Metronidazol															
	1.	Tab. 500 mg	Metronidazole	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	Rj : sesuai plafond an Ri : maks 10 tab
	2.	Infus 5 mg/ml	Metronidazole	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	3 btl/hari
5	Kombinasi mengandung : Metronidazol 500 mg, nistatin 100.000 IU															
	1.	Ovula	Trogystatin	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
6	Thiamphenicol															
	1.	Kaps. 500 mg	Thiamphenicol	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
	2.	Sir. Kering 125 mg/5 ml	Thiamphenicol	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	Rj : sesuai plafond an Ri : maks 1 btl
7.3 ANTI INFEKSI KHUSUS																
7.3.1 ANTISEPTIK SALURAN KEMIH																
1	Asam pipemidat															
	1.	Kapsul 400 mg	Urotractin	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
7.3.2 ANTI FUNGI																
1	Fluconazole															
	Hanya digunakan untuk kandidiasis sistemik/pada pasien <i>immunocompromised</i> .															
	1.	Kaps.150 mg	Fluconazole	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
	2.	Infus 2 mg/ml	Fluconazole	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	
2	Ketokonazol															
	1.	Tab. 200 mg	Ketokonazole	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
	2.	Krim 2% 10 gram	Ketokonazole	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	

3	Nistatin															
	1.	Susp 100.000 IU/ml	Nystatin	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	2 btl/kasus untuk 1 minggu
4	Itrakonazol															
	1.	Tab. 100 mg	Itraconazol	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
7.3.3 ANTI VIRUS																
1	Acyclovir															
	1.	Tab. 400 mg	Acyclovir	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
	2.	Krim 5 g	Acyclovir	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
2	Methisoprinol															
	1.	Tab. 500 mg	Methisoprinol	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	Rj : sesuai plafon
	2.	Sirup 250 mg/5ml	Methisoprinol	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	Rj : sesuai plafond an Ri : maks 2 btl
7.3.4 ANTITUBERKULOSIS																
Catatan:																
a)	Disediakan oleh Program Kemenkes.															
b)	Penggunaan sesuai dengan Program Nasional Pengendalian TB.															
	Isoniazid (Hibah)															
1	1.	Tab 100 mg	Isoniazid Stok tidak memenuhi jumlah pasien TB → boleh di orderkan asalkan ada pembayaran dari pasien	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	10 mg/kgBB, maks 6 bulan setiap hari.
		Dapat digunakan untuk profilaksis TB pada anak.														
2	Etambutol (Hibah)															
	1.	Tab. 500 mg	Ethambutol	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	

3	OAT KDT Kategori 1															
	Paduan dalam bentuk Kombinasi Dosis Tetap (KDT/FDC) untuk dewasa															
	1.	Tab. Kombinasi: Rifampicin 150 mg, isoniazid 75 mg, pirazinamid 400 mg, etambutol 275 mg	OAT Dewasa 4 FDC Tahap 1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	Digunakan pada: 1) pengobatan TB tahap awal: 1 tab/15 kgBB, maks selama 2 bulan pertama. 2) pengobatan TB tahap lanjutan: 1 tab/15 kgBB, maks selama 4 bulan tahap lanjutan, pemberian 3x seminggu.
			OAT Dewasa 4 FDC Tahap 1 Dosis Harian	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	
	3.	Tab. Kombinasi: Rifampicin 150 mg, isoniazid 150 mg	OAT Dewasa 2 FDC Tahap 2	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	
4.	Tab. Kombinasi: Rifampicin 150 mg, isoniazid 75 mg	OAT Dewasa 2 FDC Tahap 2 Dosis Harian	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)		
4	OAT KDT Kategori Anak															
	Kombinasi: Paduan dalam bentuk Kombinasi Dosis Tetap (KDT/FDC) untuk anak															
	1.	Tab. Kombinasi: Rifampicin 75 mg, isoniazid 50 mg, pirazinamid 150 mg.	OAT Anak 3 FDC Tahap 1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	Digunakan pada pengobatan TB tahap awal. 1 tab/5-8 kgBB, maks 2 bulan pertama, pemberian setiap hari.

	2.	Tab. Kombinasi: Rifampicin 75 mg, isoniazid 50 mg.	OAT Anak 2 FDC Tahap 2	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	Digunakan pada pengobatan TB tahap lanjutan. 1 tab/5-8 kgBB, maks 4 bulan tahap lanjutan, pemberian setiap hari.
5	OAT Kombipak Kategori 1															
	Diberikan untuk pasien TB yang tidak 22laf menggunakan OAT bentuk FDC/KDT.															
	1.	Tab. Kombinasi: Rifampicin 450 mg, isoniazid 300 mg, pirazinamid 500 mg, ethambutol 250 mg	Kombipak II	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	Digunakan pada pengobatan TB tahap awal. Kategori 1: Maks 448 tab (56 blister) selama 2 bulan pertama, pemberian setiap hari.
	2.	Tab. Kombinasi: Rifampicin 450 mg, isoniazid 300 mg	Kombipak III	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	Digunakan pada pengobatan TB tahap lanjutan. Kategori 1: Maks 144 tab selama 4 bulan (48 blister Kombipak III), pemberian 3x seminggu.
8. ANTI MIGRAIN DAN ANTI VERTIGO																
8.1 ANTI MIGRAIN																
8.1.1 PROFILKASIS																
1	Propranolol															
	1.	Tab. 10 mg	Propranolol	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Propranolol 10 Holi tab 10 mg	a) Untuk kasus dengan gangguan tiroid b) untuk tremor esensial, tremor 22lafond , dan tremor holmes. Maks 90 tab/bulan

	2.	Tab. 40 mg	Propranolol	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Propranolol Holi 40 mg tab 40 mg	Maks 30 tab/bln
8.2 ANTI VERTIGO																
1	Betahistine															
	1.	Tab. 6 mg	Betahistine	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Betahistine mesilat 6 mg	Maks 30 tab/bln
	a)	Hanya untuk sindrom 23lafond atau vertigo perifer														
	b)	Untuk sindrom 23lafond atau vertigo non BPPV														
	2.	Tab. 24 mg	Betahistine	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Betahistine mesilat tab 24 mg	Maks 90 tab/bln
		Hanya untuk sindrom meniere														
2	Flunarizine															
	1.	Tab. 5 mg	Flunarizine	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
9. ANTI NEOPLASTIK, IMUNOSUPRESAN, DAN OBAT UNTUK TERAPI PALIATIF																
9.1 HORMON DAN ANTI HORMON																
1	Dexametason															
	1.	Inj. 5 mg/ml	Dexamethason – Phapros	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
2	Metilprednisolon															
	1.	Tab. 4 mg	Metilprednisolon 4 mg	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Metilprednisolon 4	Jika sebagai Anti Asma maka maks 10 tab/kasus

	2.	Tab. 16 mg	Metilprednisolon 8 mg	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Metilprednisolon Kap 16 Mg	
	3	Tab 8 mg	Metilprednisolon 16 mg													
9.2 IMUNOSUPRESAN																
1	Metotreksat															
	1.	Tab. 2,5 mg	Metotreksat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Metotreksat tab 2.5 mg	a. utk imunosupresi; b. Untuk PTG, c. untuk pasien dgn luas psoriasis > 10%. Maintenance leukemia: 7,5 mg/hr tiap mgg. Utk PTG : 30 mg/hari slama 5 hari
2	Azatioprin															
	1.	Tab 50 mg	Imuran	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Azatriopin 50 SK21 tab 50 mg	
3	Hidroksiklorokuin															
	a)	Untuk kasus SLE (<i>Systemic Lupus Erythematosus</i>).														
	b)	Untuk kasus RA (<i>Rheumatoid Arthritis</i>).														
	1.	Tab. 200 mg	Hidroksiklorokuin	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Hidroksi Klorokuin mg	a.Untuk kasus SLE b.Untuk kasus RA (Rheumatoid Arthritis). Maks 60 tab/ bln.
4	Klorokuin															
	1.	Tab. 150 mg	Chloroquine – Kimia Farma	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Klorokuin 250 Kifa tab 250 mg	a. Untuk SLE; b. Untuk RA
9.3 NEUROTONIK																
1	Piracetam															
	1.	Tab. 800 mg	Piracetam	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	Sesuai plafon
	2.	Inj. 200 mg/15 ml	Piracetam	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	

2	Citicolin															
	1.	Tab. 500 mg	Citicolin	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	Sesuai plafon
	2.	Inj. 250 mg/ 2ml	Citicolin	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	
	3.	Inj. 500 mg/ 4ml	Citicolin – Hexpharm	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	
3	Megestrol Acetate															
	1.	Tab. 160 mg	Tracetate	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	Rj : sesuai 25lafond an Ri : maks 10 tab
10. ANTI PARKINSON																
1	Kombinasi mengandung : Benserazide Hydrochloride 25 mg, Levodopa 100 mg															
	1.	Tab.	Vosera	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Komb Levodopa dan Benzarasid 125 SK kaps 125 mg komb, dispersible	120 tab/bulan
2	Triheksifenidil															
	1.	Tab. 2 mg	Triheksifenidil	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Triheksifenidil 2 mg	90 tab/bulan
3	Pramipeksol															
	1.	Tab. 0,125 mg	Pramivex	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Pramipeksol 0,125 mg	60 tab/bulan
	2.	Tab. 0,250 mg	Pramivex	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
11. OBAT YANG MEMPENGARUHI DARAH																
11.1 ANTI ANEMI																
1	Asam Folat															
	1.	Tab. 0,4 mg	Folavit	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Asam Folat 0.4 SK tab 0.4 mg	Rj : sesuai 25lafond an Ri : maks 10 tab
	2.	Tab. 1 mg	Asam folat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Asam Folat 1 SK tab 1 mg	

2	Kombinasi mengandung : Fe Fumarat 360 mcg, asam folat 1,5 mcg, Cu sulfat 0,35 mcg, Co sulfat 0,15 mg, Mn Sulfat 0,05 mg, B12 15,5 mcg, vit C 75 mcg, B6 3 mg, Vit E 5 mg															
	1.	Tab.	Vitamin Tambah Darah	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	Rj : sesuai 26lafond an Ri : maks 8 tab
11.2 OBAT YANG MEMPENGARUHI KOAGULASI																
1	Asam Traneksamat															
	Untuk perdarahan 26lafon atau berpotensi perdarahan > 600 cc.															
	1.	Tab. 500 mg	Asam traneksamat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
	2.	Inj. 50 mg/ml	Asam traneksamat	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	
2	Vitamin K															
	1.	Inj. 2 mg/ml	Phytomenadion inj	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	
3	Enoxaparin sodium															
	Dapat digunakan untuk tromboemboli dan sindrom 26lafond akut serta pencegahan clotting pada 26lafond an26v, pada bedridden post operasi, medium dan high risk.															
	1.	Inj. 4.000 IU/ 0,4 ml	Enoxaparin sodium Inj. 4.000 IU/ 0,4 ml	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	
	2.	Inj. 6.000 IU/ 0,6 ml	Enoxaparin sodium Inj. 6.000 IU/ 0,6 ml	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	
4	Fondaparinux															

	Untuk tromboemboli dan sindrom 27lafond akut.															
	1.	Inj. 2,5 mg/ 0,5 ml	Diviti	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	1 vial/hari
5	Karbazokrom HCl															
	1.	Inj. 50 mg/10 ml	Carbazochrome HCl	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	
6	Heparin Sodium															
	1.	Inj. 5.000 IU/ml	Hepagusan	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	Dosis sesuai dengan target APTT (maks 20.000-40.000 IU/hari)
7	Edoxaban Tosylate															
	1.	Tab. 30 mg	Lixiana	√	√	(-)	(-)	(-)	(-)	√	√	√	√	(-)	(-)	
8	Warfarin Sodium															
	1.	Tab. 2 mg	Warfarin Sodium	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Warfarin 2 SK tab 2 mg	Dosis harian disesuaikan dengan target INR (2-3)
11.3 OBAT UNTUK KELEBIHAN BESI																
1.	Deferipron															
	1.	Tab. 500 mg	Ferriprox	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	50-75 mg/kgBB/hari, maks 1 btl/bulan
12. PRODUK DARAH DAN PENGANTI PLASMA																
12.1 PENGANTI PLASMA DAN PLASMA EKSPANDER																
1	Albumin serum normal (human albumin)															
	1.	Inj. 20%	Human Albumin 20%	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	100 mL/hari, 300 mL/minggu

		a. Kadar albumin < 2,5 g/dL, dan/atau untuk kasus 28lafond an28ve, dan/atau untuk sindrom nefrotik														
		b. Hanya untuk diberikan apabila terdapat kondisi presyok atau syok, dan/atau untuk kasus asites yang 28lafon/intens dengan penekanan organ pernafasan atau perut														
	2.	Inj. 25%	Albunorm	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	100 mL/hari, 300 mL/minggu
		a. Untuk bayi dan anak dengan kadar albumin < 2,5 g/dL, dan/atau untuk kasus 28lafond an28ve, dan/atau untuk sindrom nefrotik														
		b. Hanya diberikan apabila terdapat kondisi presyok atau syok, dan/atau untuk kasus asites yang 28lafon/intens dengan penekanan organ pernafasan atau perut														

2	Kombinasi mengandung : Glycyrrhizin 40 mg, Amino acetic acid 400 mg, L-cysteine HCl 20 mg															
	1.	Inj. 20 ml	Stronger Neo-Minophagen C	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	
3	Kombinasi : Gelatin polysuccinate 40 g, Na acetate trihydrate 3,675 g, NaCl 4,59 g, KCl 0,403 g, CaCl 29lafond a 0,133 g, MgCl 0,203 g															
	1.	Inf. 500 ml	Gelafusal	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	6 btl/hari, maks 2 hari
13. DIAGNOSTIK																
13.1 BAHAN KONTRAS RADIOLOGI																
1	Iohexol															
	1.	Lar. 375 mgI/ml	Iohexol	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	
13.2 TES FUNGSI																
13.2.1 TES KULIT																
1	Tuberkulin protein purified derivative															
	1.	inj. 2 TU/0,1 mL	Tuberculin PPD RT 23 SSI	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	
13.3 ULTRASOUND																
1	Ultrasound transmission gel															
	1.	Gel 250 ml	Ultrasonic Gel	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	
13.4 LAIN-LAIN																
1	M-Y jelly															
	1.	Gel	M-Y jelly	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	

14. ANTISEPTIK DAN DISINFEKTAN																
14.1 ANTISEPTIK																
1	Tetrachlorodecaoxide															
	1.	Lar. 0,001037%	Oxoferin	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
2	Hidrogen Peroksida															
	1.	Cairan 3 %	Hidrogen Peroksida 3 %	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	
3	Povidone Iodine															
	1.	Larutan 10%	Povidone Iodine 10%	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	
4	Octenidine dihydrochloride															
	1.	Spray 0.1%	Octedine	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
5	Hexetidine															
	1.	Larutan 0,1%	Hexadol Mint	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
14.2 DISINFEKTAN																
1	Etanol 70 %															
	1	70% etil 30lafond (CH ₃ CH ₂ OH) dan 30% air	Alkohol 70 %	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	
2	Etanol 96 %															
	1.	96% etil 30lafond (CH ₃ CH ₂ OH) dan 4% air.	Alkohol 96 %	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	
15. OBAT DAN BAHAN UNTUK GIGI																
15.1 ANTI FUNGI OROFARINGEAL																
1	Nistatin															
	1.	Susp 100.000 IU/ml btl.12 ml	Nystatin	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	

16. DIURETIK DAN OBAT UNTUK HIPERTROFI PROSTAT																
16.1 DIURETIK																
1	Furosemid															
	1.	Tab. 40 mg	Furosemide	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Furosemide 40 SK21 tab 40 mg	120 tab/bulan
	2.	Inj. 10 mg/ml	Furosemide	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	
2	Hidroklorotiazid															
	1.	Tab. 25 mg	Hydrochlorothiazide	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Hidroklorotiazid tab 25 mg	30 tab/bulan
3	Spironolakton															
	1.	Tab. 25 mg	Spironolakton 25 mg	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Spironolacton tab 25 mg	Maks 30 tab/bulan
	2.	Tab. 100 mg	Spironolakton 100 mg	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Spironolacton tab 100 mg	Untuk penyakit sirosis 31lafond 30 tab/bulan
4	Manitol															
	1.	Infus 20 % fls. 500 ml	Manitol	√	√	√	√	√	√	√	√		√	(-)	(-)	2 btl/hari
5	Acetazolamide															
	1.	Tab. 250 mg	Glauset	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	Asetazolamid 250 mg	sbg penanganan awal di PKM pd px 31lafond akut sbllm dirujuk. Maks 50 tab/bulan, utk 31lafond akut:1 mgg (paket CBG)
16.2 OBAT UNTUK HIPERTROFI PROSTAT																
1	Dutasterid															
	1.	Tab. 0,5 mg	Dutasterid	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Dutasterid 0.5 SK21	30 kaps /bulan

2	Phenazopyridine															
	1.	Tab. 100 mg	Nexurin	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	Rj : sesuai 32lafond an Ri : maks 10 tab
3	Tamsulosin															
	1.	Tab. Lepas lambat 0,4 mg	Tamsulosin	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Tamsulosin SR 0,4	Maks. 30 tab /bulan
17. HORMON, OBAT ENDOKRIN LAIN DAN KONTRASEPSI																
17.1 ANTI DIABETES																
17.1.1 ANTI DIABETES ORAL																
1	Acarbose															
	1.	Tab. 50 mg	Acarbose	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Akarbose tab 50 mg	90 tab /bulan
	2.	Tab. 100 mg	Acarbose	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Akarbose tab 100 mg	90 tab /bulan
2	Glibenklamid															
	1.	Tab. 5 mg	Glibenclamide	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Glibenklamide 5 mg	Dosis maks 15 mg per hari. Maks 90 tab/bulan
3	Gliquidon															
	1.	Tab. 30 mg	Gliquidon	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Glikuidon Tab 30 Mg	90 tab /bulan
4	Glimepirid															
	1.	Tab. 1 mg	Glimepiride 1 mg	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Glimepiride 1 mg	60 tab /bulan
	2.	Tab. 2 mg	Glimepiride 2 mg	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Glimepiride 2 mg	60 tab /bulan
	3.	Tab. 3 mg	Glimepiride 3 mg	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Glimepiride 3 mg	60 tab /bulan
	4.	Tab. 4 mg	Glimepiride 4 mg	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Glimepiride tab 4 mg	30 tab /bulan

5	Metformin															
	1.	Tab. 500 mg	Metformin 500 mg	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Metformin tab 500 mg	90 tab/bulan. Dosis efektif: 1.500-2.500 mg/hari
	2.	Tab. 850 mg	Metformin 850 mg	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Metformin 850 mg	60 tab /bulan
6	Pioglitazone															
	Tidak diberikan pada pasien dengan gagal jantung dan/atau riwayat keluarga bladder cancer															
	1.	Tab. 15 mg	Pioglitazone 15 mg	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Pioglitazon tab 15 mg	30 tab /bulan
	2.	Tab. 30 mg	Pioglitazone 30 mg	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Pioglitazon tab 30 mg	30 tab /bulan
7	1.	Tab. 50mg	Vildagliptin 50 mg	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Vildagliptin 50 SK 50 mg	a)tidak digunakan sebagai lini pertama/ terapi inisial b)sebagai terapi tambahan pada metformin dengan dosis optimal toleransi c) tidak sebagai obat Tunggal. Maks 60 tab/bln
17.1.2 ANTI DIABETES PARENTERAL																
1	Analog insulin, Rapid acting															
	1.	Insulin aspart Inj.100 IU/ml pen	Insulin aspart 100 IU/ml	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Insulin prandial inj 100IU/ml	Penyesuaian dosis insulin hingga 20 IU/hari
	2.	Insuline glulisine 100 IU/ml	Insuline glulisine 100IU/ml	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Insulin prandial inj 100IU/ml	Penyesuaian dosis insulin hingga 20 IU/hari

	3.	Insuline lispro 100 IU/ml	Insuline lispro 100 IU/ml	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Insulin prandial inj 100IU/ml	Penyesuaian dosis insulin hingga 20 IU/hari
	Pada kondisi khusus (misal: perioperatif) maka DM tipe 2 dapat langsung diberikan insulin															
2	Analog insulin, Long acting (Insulin gargline)															
	1.	Inj. 100 IU/ml pen	Insulin gargline 100 IU/ml	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	insulin basal inj 100 IU/ml	Penyesuaian dosis insulin hingga 20 IU/hari
17.2 HORMON KELAMIN DAN OBAT YANG MEMPENGARUHI FERTILITAS																
17.2.1 ESTROGEN																
1	Clomiphene citrate															
	1.	Tab. 50 mg	Profertil	√	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	√	(-)	(-)	
17.2.2 PROGESTERON																
1	Noretisteron															
	1.	Tab. 5 mg	Noresthil	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	30 tab/bulan
2	Micronized progesterone															
	1.	Kaps. 100 mg	Microgest	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
17.2.3 KONTRASEPSI																
17.2.3.1 KONTRASEPSI, ORAL																
1	Catatan: Disediakan oleh program BKKBN.															
	1.	Tab. Kombinasi : Levonorgestrel 0,15 mg, ethinyl estradiol 0,03 mg	Pil KB I Kombinasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
17.2.3.2 KONTRASEPSI, PARENTERAL																
1	Medroksi progesterone asetate															

	1.	Inj. 150 mg/ 3 ml	Depo progestin	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	
			Obat suntik KB I	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	
17.2.3.3 KONTRASEPSI, AKDR (IUD)																
1	Catatan: Disediakan oleh program BKKBN.															
	Copper T															
	1.	Set	Copper T TCU 380A	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	
17.2.3.4 KONTRASEPSI, IMPLAN																
1	Catatan: Disediakan oleh program BKKBN.															
	Levonorgestrel															
	1.	implan 2 rods, @ 75 mg (3-4 tahun)	Susuk KB II	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	
17.3 HORMON TIROID DAN ANTITIROID																
1	Levothyroxine Na															
	1.	Tab. 50 mcg	Euthyrox 50	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Levotiroksin 50 SK 50 mcg	Untuk substitusi 150-200 mcg/hari. Maks 90 tab/bulan
2	Propylthiouracil															
	1.	Tab. 100 mg	Propylthiouracil	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Propiltiourasil 100 mg	Untuk bulan pertama maks 180 tab/bulan
3	Thiamazol															
	1.	Tab. 10 mg	Thiamazol tab 10 ng	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Tiamazol 10 SK tab 10 mg	Untuk bulan pertama maks 90 tab/bulan
17.4 KORTIKOSTEROID																
1	Dexametason															
	1.	Tab. 0,5 mg	Dexametason 0,5 mg	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	

	2.	Inj. 5 mg/ml amp.	Dexametason inj	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	
2	Metilprednisolon															
	1.	Tab. 4 mg	Metilprednisolon 4 mg	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Metilprednisolon 4 mg	Jika sebagai Anti Asma maka maks 10 tab/kasus.
	2.	Tab. 8 mg	Metilprednisolon 8 mg	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Metilprednisolon 8 mg	
	3.	Tab. 16 mg	Metilprednisolon 16 mg	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Metilprednisolon 16 Mg	
	4.	Inj. 125mg/ 2ml vial.	Metilprednisolon 125 mg/ 2 ml	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	
3	Trimcinolon															
	1.	Inj. 10 mg/ml	Trilac inj	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	paket injeksi OA/saraf
			Triamcinolone inj	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	paket injeksi OA/saraf
	2.	Tab. 4 mg	Triamcinolone tab 4 mg	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
	3.	Salep 5 g	Bufacomb	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
4	Prednison															
	1.	Tab. 5 mg	Prednison 5 mg	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Prednison 5 SK tab 5 mg	Maks 90 tab/bulan
18. OBAT KARDIOVASKULER																
18.1 ANTI ANGINA																
1	Diltiazem HCl															

	1.	Tab. 100 mg	Herbesser CD 100	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Diltiazem 100 SK kap 100 mg	Pemberian obat antihipertensi harus didasarkan pada prinsip dosis titrasi, mulai dari dosis terkecil hingga tercapai dosis dengan outcome tekanan darah terbaik. Maks 30 kaps/bulan
	2.	Tab. 200 mg	Herbesser CD 200	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Diltiazem 200 SK kap 200 mg	Pemberian obat antihipertensi harus didasarkan pada prinsip dosis titrasi, mulai dari dosis terkecil hingga tercapai dosis dengan outcome tekanan darah terbaik. Maks 30 kaps/bulan
2	Isosorbid Dinitrat															
	1.	Tab. 5 mg	Isosorbid dinitrat (ISDN)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Issosorbid Dinitrat 5 mg	90 tab/bulan
		Tab. 10 mg	Isosorbid dinitrat (ISDN) - OGB Novell	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Issosorbid dinitrat 10 SK tab 10 mg	90 tab/bulan
	2.	Inj. 1 mg/ml	Nosorbide	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	
3	Nitroglyserin															
	1.	Tab 2.5 mg	Nitrokaf	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Gliseril trinitrate 2.5 SK tab 2.5 mg	90 kaps/bulan
	2.	Tab. 5 mg	Nitrokaf Retard - Kimia Farma	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Gliseril trinitrate 5 SK tab 5 mg	90 kaps/bulan
18.2 ANTI ARITMIA																
1	Amiodarone															
	1.	Tab. 200 mg	Amiodarone tab	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Amiodaron 200 SK tab 200 mg	30 tab/bulan

	2.	Inj. 50 mg/ml	Amiodarone inj	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	
2	Digoksin															
	1.	Tab. 0,25 mg	Digoxin	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Digoksin 0,25 mg	30 tab/bulan
3	Diltiazem HCl															
	1.	Tab. 100 mg	Herbesser CD-100	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Diltiazem 100 SK kap 100 mg	30 tab/bulan
	2.	Tab. 100 mg	Herbesser CD-200	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Diltiazem 200 SK kap 200 mg	30 tab/bulan
4	Lidokain															
	1.	Inj. 20 mg/ ml amp.	Lidocain	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	
5	Propranolol															
	1.	Tab. 10 mg	Propranolol 10 mg	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Propranolol 10 SK tab 10 mg	90 tab/bulan
		a. Untuk kasus-kasus dengan gangguan tiroid														
		b. Untuk tremor esensial, tremor distonia, dan tremor holmes														
18.3 ANTI HIPERTENSI SISTEMIK																
1	Amlodipine															
	1.	Tab. 5 mg	Amlodipine 5 mg	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Amlodipin 5 SK tab 5 mg	30 tab/bulan
	2.	Tab. 10 mg	Amlodipine 10 mg	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Amlodipin 10 SK tab 10 mg	30 tab/bulan

2	Bisoprolol															
	1.	Tab 2.5 mg	Bisoprolol	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bisoprolol 2 SK tab 2.5 mg	30 tab/bulan a. Untuk kasus HT. Pemberian obat antihipertensi harus didasarkan pada prinsip dosis titrasi, mulai dari dosis terkecil hingga tercapai dosis dengan outcome tekanan darah terbaik. b. untuk gagal jantung kronis dgn penurunan fs ventrikular sistolik yang sd
	2.	Tab. 5 mg	Bisoprolol	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bisoprolol 5 SK tab 5 mg	30 tab/bulan a. Untuk kasus HT. Pemberian obat antihipertensi harus didasarkan pada prinsip dosis titrasi, mulai dari dosis terkecil hingga tercapai dosis dengan outcome tekanan darah terbaik. b. untuk gagal jantung kronis dgn penurunan fs ventrikular sistolik yang sd
3	Diltiazem HCl															
	1.	Kaps. 100 mg	Herbesser CD-100	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Diltiazem 100 SK kap 100 mg	30 tab/bulan
	1.	Kaps. 200 mg	Herbesser CD-200	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Diltiazem 200 SK kap 200 mg	30 tab/bulan

4	Irbesartan														
	Untuk pasien yang telah mendapat ACE inhibitor sebelumnya sekurang-kurangnya 1 bulan dan mengalami intoleransi terhadap ACE inhibitor yang dibuktikan dengan melampirkan resep sebelumnya														
	1.	Tab. 150 mg	Irbesartan 150 mg	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Irbesartan 150 SK 150 mg	30 tab/bulan
	2.	Tab. 300 mg	Irbesartan 300 mg	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Irbesartan 300 SK 300 mg	30 tab/bulan
5	Candesartan														
	Untuk pasien yang telah mendapat ACE inhibitor sebelumnya sekurang-kurangnya 1 bulan dan mengalami intoleransi terhadap ACE inhibitor yang dibuktikan dengan melampirkan resep sebelumnya.														
	1.	Tab. 8 mg	Candesartan 8 mg	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kandesartan 8 SK 8 mg	30 tab/bulan
	2.	Tab. 16 mg	Candesartan 16 mg	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kandesartan 16 SK 16 mg	30 tab/bulan
6	Captopril														
	1.	Tab. 25 mg	Captopril	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kaptopril 25 SK tab 25 mg	90 tab/bulan
7	Clonidine														
	1.	Tab. 0,15 mg	Clonidine	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Klonidin 0,15 SK tab 0,15 mg	90 tab/bulan

8	Lisinopril															
	1.	Tab. 5 mg	Lisinopril 5 mg	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Lisinopril 5 SK tab 5 mg	30 tab/bulan
9	Nicardipine															
	Hanya untuk pasien dengan hipertensi berat dan memerlukan perawatan															
	1.	Inj. 1 mg/ml	Nicardipine HCl	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	
10	Nifedipine															
	1.	Kaps. 10 mg	Nifedipine	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Nifedipin 10 SK tab 10 mg	90 tab/bulan
	2.	Oros 30 mg	Adalat oros 30 mg	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Nifedipin 30 SK tab oros 30 mg	30 tab/bulan
11	Ramipril															
	1.	Tab. 5 mg	Ramipril 5 mg	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Ramipril 5 SK tab 5 mg	30 tab/bulan
	2.	Tab. 10 mg	Ramipril 10 mg	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Ramipril 10 SK tab 10 mg	30 tab/bulan
12	Valsartan															
	Untuk pasien yang telah mendapat ACE inhibitor sebelumnya sekurang-kurangnya 1 bulan dan mengalami intoleransi terhadap ACE inhibitor yang dibuktikan dengan melampirkan resep sebelumnya															
	1.	Tab. 80 mg	Valsartan 80 mg	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Valsartan 80 SK tab 80 mg	30 tab/bulan

	2.	Tab. 160 mg	Valsartan 160 mg	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Valsartan 160 SK tab 160 mg	30 tab/bulan
13	Nimodipine															
	a. Untuk pencegahan kasus vasospasme pada pengobatan perdarahan subarachnoid															
	b. Hanya diberikan di ruang perawatan															
	1.	Tab. 30 mg	Nimotop	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	8 tab/hari, maks 18 hari
14	Metildopa															
	Untuk hipertensi pada wanita hamil															
	1.	Tab. 250 mg	Dopamet 250	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Metildopa 250 SK tab 250 mg	90 tab/bulan
15	Hidroklortiazid															
	1.	Tab. 25 mg	Hydrochlorothiazide - Kimia Farma	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Hidroklorotiazid (HCT) tab 25 mg - Kimia Farma	30 tab/bulan
16	Telmisartan															
	Digunakan untuk hipertensi dengan nilai eGFR < 30 mL/menit/1,73 m ²															
	1.	Tab. 80 mg	Telmisartab tab 80 mg – OGB Novell	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Telmisartan 80 SK 80 mg	30 tab/bulan
17	Imidapril															
	1.	Tab. 5 mg	Tanapres - Tanabe	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Tanapres 5 mg - Tanabe	Maks 30 tab/bln

18	Sacubitril valsartan														
	a) untuk pasien yang tidak respon gol ARB & ACE inhibitor														
	b) pasien dengan reduced ejection fraction (LVEF = 40%)														
	1.	Sacubitril valsartan 50 SK tab sal selaput 24,3 / 25,7 mg	Uperio 50mg	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sacubitril valsartan 50 SK tab sal selaput 24,3 / 25,7 mg	
	2.	Sacubitril valsartan 100 SK tab sal selaput 48,6 / 51,4 mg	Uperio 100mg	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sacubitril valsartan 100 SK tab sal selaput 48,6 / 51,4 mg	
	3.	Sacubitril valsartan 200 SK tab sal selaput 97,2 / 102,8 mg	Uperio 200mg	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sacubitril valsartan 200 SK tab sal selaput 97,2 / 102,8 mg	
18.4 ANTI HIPERTENSI PULMONAL															
1	Sildenafil														
	1.	Tab. 50 mcg	Sildenafil	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sildenafil 20 SK tab 20 mg	90 tab/bulan.
2	Beraprost Sodium														
	1.	Tab. 20 mcg	Beraprost tab	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		90 tab/bulan.
18.5 ANTI AGREGASI PLATELET															
1	Asam Asetilsalisilat														
	1.	Tab. 80 mg	Asam Asetilsalisilat 80 mg	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Asam Asetilsalisilat (asetosal) 80 SK tab 80 mg	30 tab/bulan.
2	Cilostazol														
	1.	Tab. 100 mg	Cilostazol	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Cilostazol tab SR 100 mg	Secondary prevention pada pasien stroke dengan Cerebral Small Vessel Disease (CSVD). Maks 60 tab/bln

3	Clopidogrel															
	1.	Tab. 75 mg	Clopidogrel	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Clopidogrel Tab 75 Mg	Sesuai foras. Saat akan dilakukan tindakan ptca diberikan 4-8 tab. Maintenance: 1 tab/hari selama 1 tahun.
4	Ticagrelor															
	1.	Tab. 90 mg	Ticagrelor	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Tikagrelor 90 SK tab 90 mg	Untuk pasien kasus pci dengan acute coronary syndrome (acs). 60 tab/bulan maks 1 th
18.6 OBAT UNTUK GAGAL JANTUNG																
1	Bisoprolol															
	1.	Tab. 5 mg	Bisoprolol	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bisoprolol 5 SK tab 5 mg	30 tab/bulan
	1.	Tab. 2.5 mg	Bisoprolol	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bisoprolol 2.5 SK tab 2.5 mg	30 tab/bulan
2	Digoksin															
	1.	Tab. 0,25 mg	Digoxin	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Digoksin Tab 0,25 Mg - Yarindo	Hanya untuk gagal jantung dengan atrial fibrilasi atau sinus takikardia. Maks 30 tab/bln
	2.	Inj. 0,5 mg/ 2 ml	Digoxin inj	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	
3	Furosemid															
	1.	Tab. 40 mg	Furosemide	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Furosemide 40 SK tab 40 mg	120 tab/bulan
	2.	Inj. 10 mg/ml	Furosemide	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	
4	Captopril															
	1.	Tab. 25 mg	Captopril 25 mg	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kaptopril 25 SK tab 25 mg	90 tab/bulan

5	Spironolakton															
	1.	Tab. 25 mg	Spironolakton 25 mg	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Spironolacton 25 SK tab 25 mg	Maks 30 tab/bulan
	2.	Tab. 100 mg	Spironolakton 100 mg	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Spironolacton 100 SK tab 100 mg	30 tab/bulan
6	Ramipril															
	1.	Tab. 5 mg	Ramipril 5 mg	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Ramipril 5 SK tab 5 mg	30 tab/bulan
	2.	Tab. 10 mg	Ramipril 10 mg	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Ramipril 10 SK tab 10 mg	30 tab/bulan
7	Karvedilol															
	Hanya untuk gagal jantung kronis dengan penurunan fungsi ventrikular sistolik yang sudah terkompensasi.															
	1.	Tab. 6,25 mg	Carvedilol 6,25	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Karvedilol 6.25 Dava Carvedilol tab 6.25 mg	60 tab/bulan
8	Trimetazidine diHCl															
	1.	Tab. 35 mg	Trimetazidine	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	Rj : sesuai plafon dan Ri : maks 10 tab
9	Candesartan															
	Untuk pasien yang telah mendapat ACE inhibitor sebelumnya sekurang-kurangnya 1 bulan dan mengalami intoleransi terhadap ACE inhibitor yang dibuktikan dengan melampirkan resep sebelumnya.															

	1.	Tab. 8 mg	Candesartan 8 mg	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kandesartan 8 SK tab 8 mg	30 tab/bulan
	2.	Tab. 16 mg	Candesartan 16 mg	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kandesartan 16 SK tab 16 mg	30 tab/bulan
10	Ivabradin															
	1.	Tab. 5 mg	Coralan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Ivabradin 5 SK tab 5 mg	Hanya dapat digunakan untuk pasien dengan ejection fraction < 35%. Maks 60 tab/bulan.
18.7 OBAT UNTUK SYOK KARDIOGENIK DAN SEPSIS																
1	Dobutamin															
	1.	Inj. 50 mg/ml	Dobutamin	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	
2	Dopamin															
	1.	Inj. 40 mg/ml	Indop	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	
3	Epinephrine															
	1.	Inj. 1 mg/ml	Epinephrine	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	
4	Norephineprine															
	1.	Inj. 1 mg/ml	Norepinephrine	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	

19. ANTIHIPERLIPIDEMIA																
1	Atorvastatin															
	1.	Tab. 20 mg	Atorvastatin 20 mg	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Atovastatin 20 SK tab 20 mg	Maks pemberian adalah selama 3 bulan.pasien ascvd (post pci, cabg, stroke iskemi dan/atau pad, pasca infark) yang dibuktikan dengan ekg atau msct atau riwayat angiografi. Target ldl adalah = 70 mg/dl, yang harus diperiksa setiap 3 bulan. Maks 30 tab/bln
2	Cholestyramine															
	1.	Serbuk 4 gram	Sequest	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	Rj : sesuai plafon dan Ri : maks 4 sach
4	Simvastatin															
	1.	Tab. 20 mg	Simvastatin 20 mg	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Simvastatin 20 SK tab 20 mg	tlh 6 bulan dilakukan evaluasi ketaatan pasien thdp kontrol diet dan hasil LDL dilampirkan setiap 6 bulan. Maksimal 30 tab/bulan.
Fenofibrat																
5.	1.	Tab. 300mg	Fenofibrate 300 mg	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Fenofibrate 300 SK tab 300 mg	a)Hanya untuk hipertriglisieridemia dengan kadar trigliserida > 250 mg/dL b)Pemeriksaan trigliserida dilakukan pada pasien yang telah menjalani puasa Maks 30tab/ bulan

20. OBAT TOPIKAL UNTUK KULIT																
20.1 ANTI BAKTERI																
1	Perak Sulfadiazin															
	1.	Krim 1 %	Burnazin	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
2	Kombinasi mengandung : Neomycin sulfat 0,5%, placenta extract 10%															
	1.	Krim	Bioplacenton	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
3	Mupirocin Calcium															
	1.	Krim 2%	Mupirocin Calcium	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	maks 10 hari
4	Gentamicin															
	1.	Salep 0,1%	Gentamicin	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
20.2 ANTI FUNGI																
1	Fusidic Acid 2 %															
	1.	Krim 2 %	Fuladic	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
2	Ketoconazole															
	1.	Krim 2 %	Ketoconazole	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
	2.	Tab. 200mg	Ketoconazole													
	3.	Scalp sol 2%	Ketomed SS	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
		Pada pitiriasis yang luas.														
3	Mikonazol															
	1.	Krim 2 %	Miconazole	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
4	Kombinasi mengandung : Metronidazol 500 mg, nistatin 100.000 IU															
	1.	Ovula	Trogystatin	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	

20.3 ANTIINFLAMASI DAN ANTIPRURITIK																
1	Heparin Natrium															
	1.	Gel 20 gram	Thrombopop	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
2	Hidrokortison															
	1.	Krim 1%	Hidrocortison 1%	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
	2.	Krim 2,5%	Hidrocortison 2,5%	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
3	Mometason furoat															
	1.	Krim 0,1%	Mometasone	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
4	Clobetasol Propionate															
	1.	Salep 0,05%	Clobetasol Propionate	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	maks 10 hari
5	Desonide															
	1.	Krim 0,05%	Desolex Cream													
	2.	Lotion 0,05%	Desolex Lotion	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
20.4 ANTISKABIES DAN ANTIPEDIKULOSIS																
1	Permethrin															
	1.	Lotion 5%	Medscab	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
	2.	Krim 5%	Permethrin krim 5%	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
20.5 KERATOLITIK DAN KERATOPLASTIK																
1	Asam salisilat															
	1.	Serbuk 1 kg	Asam salisilat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
2	Liquor carbonis detergens															
	1.	Lar. 5%	Liquor carbonis detergens	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
20.6 LAIN-LAIN																
1	Centella asiatica extract															
	1.	Salep 10 mg	Tekasol	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	

2	Urea															
	1.	Krim 10%	Carmed 10%	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
3	Triamcinolon															
	Hanya untuk keloid															
	1.	Inj. 10 mg/ml	Trilac inj	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	
			Triamcinolon inj	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	
21. LARUTAN ELEKTROLIT, NUTRISI DAN LAIN-LAIN																
21.1 ORAL																
1	Kalium Klorida															
	1.	Tab. 600 mg	KSR	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kalium Klorida 600 SK 600 mg	90 tab/bulan
2	Kombinasi mengandung : Karbohidrat 0,6g, protein 0,02g, lemak total 0,1 g, vit C 10mg, vit B1 0,5 mg, vit B2 0,5 mg, vit B6 0,5 mg, Niacin 2 mg															
	1.	Sachet	Lacto B	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	Rj : sesuai plafon dan Ri : maks 10 tab
3	Kalsium polistirena sulfonat															
	1.	Serbuk 5 gram	Kalquest	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kalsium polistirena sulfonate 5 SK serbuk 5 gram	15-30 gram/hari dibagi dlm 2-3 kali pemberian. Maks slm 5 hr sampai dg dialisis dilakukan
4	Natrium Bikarbonat															
	1.	Tab. 500 mg	Sodium Bicarbonate	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	90 tab/bulan
5	Zinc															
	1.	Tab. 20 mg	Zinc 20 mg	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	

21.2 PARENTERAL																
1	Kombinasi mengandung : CaCl ₂ 0,10 g, KCl 0,15 g, NaCl 3 g, Na asetat 3H ₂ O 1,9 g, WFI ad 500 ml															
	1.	Inf.	Ring As	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	
2	Kombinasi mengandung : Glukosa 25 g, WFI ad 500 ml															
	1.	Inf.	D5%	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	
3	Kombinasi mengandung : Glukosa 25 g, NaCl 4,5 g, WFI ad 500 ml															
	1.	Inf.	D5/NS	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	
4	Kombinasi mengandung : Glukosa 25 g, NaCl 2,25 g, WFI ad 500 ml															
	1.	Inf.	D5 ½ NS	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	
5	Kombinasi mengandung : Glukosa 27,5 g, NaCl 1,125 g, WFI ad 500 ml															
	1.	Inf.	D5 ¼ NS	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	
6	Kombinasi mengandung : Glukosa 50 g, WFI ad 500 ml															
	1.	Inf.	D10%	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	
7	Kombinasi mengandung : Dextrosa anhidrat 13.5 g, NaCl 0.875 g, KCl 0.750 g, Na laktat 1.12 g, WFI ad 500 ml															
	1.	Inf.	Kaen 3B	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	

8	Kombinasi mengandung : Dextrosa anhidrat 50 g, NaCl 0,875 g, KCl 0,75 g, Na Lactate 1,075 g, WFI ad 500 ml															
	1.	Inf.	Kaen Mg3	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	
9	Kombinasi mengandung : NaCl 0,9 g, WFI ad 100 ml															
	1.	Inf.	NS 100 ml	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
10	Kombinasi mengandung : NaCl 4,5 g, WFI ad 500 ml															
	1.	Inf.	NS 500 ml	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
11	Kombinasi mengandung : NaCl 9 g, WFI ad 1000 ml															
	1.	Inf.	NS 1000 ml	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
12	Kombinasi mengandung : NaCl 4.3 g, KCl 0.15 g, CaCl ₂ 0.165 g, dekstrosa monohidrat 25 g, WFI ad 500 ml															
	1.	Inf.	RD 5	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	
13	Kombinasi mengandung : NaCl 3 g, KCl 0.15 g, CaCl ₂ 0.1 g, Na.Laktat 1,55 g, WFI ad 500 ml															
	1.	Inf.	RL	√	(-)	√	√	√	√	√	√		√	(-)	(-)	
14	Kombinasi mengandung : NaCl 15 g, WFI ad 500 ml															
	1.	Inf.	Normal Salin 3 %	√	(-)	√	√	√	√	√	√		√	(-)	(-)	

15	Kombinasi mengandung: L-Isoleucine 8,45 g, L-Leucine 9,46 g, L-Valine 7,09 g, L-Arginine 15 g, L-Ornithine-L-aspartate 10 g, L-Malic acid 7 g, Xylitol 50 g, Pyridoxine HCl 0,12 g, Nicotinamide 0,08 g, Sodium acetate 1,831 g, Sodium chloride 1,987 g, Magnesium sulphate 0,739 g, Sodium hydroxide 0,898 g															
	1.	Larutan	Comafusin Hepar	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	
21.3 ELEKTROLIT PEKAT																
1	Dextrosa monohidrat															
	1.	Lar. 400 mg	D 40 %	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	
2	Kalium Klorida															
	1.	Lar. 74.6 mg	KCl 7.46 %	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	
3	Natrium Bicarbonat															
	1.	Lar. 84 mg	Meylon	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	
4	Magnesium sulfat															
	1.	Lar. 200 mg	MgSO ₄ 20%	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	
	2.	Lar. 400 mg	MgSO ₄ 40%	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	
5	Sodium Chloride															
	1.	Lar. 9 mg	Otsu NS 0,9%	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	
21.4 LAIN-LAIN																
1	Manitol															
	1.	Inf. 20 %	Manitol	√	(-)	√	√	√	√	√	√		√	(-)	(-)	
2	Sterile water															
	1.	Lar. 25 ml	Otsu WI	√	(-)	√	√	√	√	√	√		√	(-)	(-)	
	2.	Lar. 1000 ml	Wida WITM UNICAP	√	(-)	√	√	√	√	√	√		√	(-)	(-)	

22. OBAT UNTUK MATA

1	Carboksimetil selulosa Na															
	1.	Tetes mata 5 mg	Cendo Cenfresh MDS	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
2	Gentamisin															
	1.	Salep mata 0,3%	Genoint	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
3	Kombinasi mengandung : CaCl ₂ anhidrat 0,075 g, K Iodida 0,075 g, Na Tiosulfat 0,0075 g, Fenilmerkuri nitrat 0,3 mg															
	1.	Tetes mata	Cendo Catarlent MDS	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
4	Kombinasi mengandung : Dextran 70 1 mg, hypromellose 3 mg															
	1.	Tetes mata	Sanbe Tears	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
5	Kombinasi mengandung : HPMC 3 mg, Dextran 1 mg															
	1.	Tetes mata	Cendo Eyefresh MDS	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
6	Kombinasi : Chloramphenicol base 5 mg, Dexamethasone sodium phosphate 1 mg															
	1.	Tetes mata	Erlamycetin TM Plus	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
7	Kombinasi mengandung : NaCl 4,4 mg, KCl 0,8 mg															
	1.	Tetes mata	Cendo Lyteers MDS	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	

8	Kombinasi mengandung : polimiksin 600 UI, neomisin 3,5 mg, deksametason 1 mg, benzalkonium 0,1 mg															
	1.	Tetes mata	Cendo Xitrol MDS	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
9	Kombinasi mengandung : polimiksin-B sulfat 6000 UI/ml, neomisin 3,5 mg, deksametason 0,1%															
	1.	Salep mata	Salep Xitrol	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
10	Kombinasi mengandung : tobramycin 3 mg, deksametason 1 mg															
	1.	Tetes mata	Cendo Tobroson MDS	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
11	Levofloxacin															
	1.	Tetes mata 0,1%	Levofloxacin TM	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
12	Nafazolin HCl															
	1.	Tetes mata 1 mg	Cendo Vasacon	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
13	Natrium diklofenak															
	1.	Tetes mata 1 %	Flamar	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
14	Phenylephrine HCL															
	1.	Tetes mata 10%	Cendo Efrisel	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
15	Tetrakain															
	1.	Tetes mata 0,5%	Cendo Pantocain	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
	2.	Tetes mata 2%	Cendo Pantocain	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
16	Tobramycin															
	1.	Tetes mata 3 mg	Bralifex	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	

17	Tropikamid															
	1.	Tetes mata 0,5%	Midric	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
	2.	Tetes mata 1%	Midric	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
18	Sodium Hyaluronate															
	1.	Tetes mata 0,1 %	Sodium hyaluronate	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
19	Cromoyl Sodium															
	1.	Tetes mata 20 mg	Cendo Conver MDS	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
20	Polyvinylpyrrolidone															
	1.	Tetes mata 20 mg	Cendo Protagenta MDS	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
22.1 MIOTIK DAN ANTIGLAUKOMA																
1	Timolol Maleate															
	1.	Tetes mata 0,5%	Cendo Timol MDS	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	Timolol 0.5 SK tetes mata 0.6ml	
2	Asetazolamid															
	a)	Tidak diberikan dalam jangka panjang.														
	b)	Hati-hati pemberian pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal.														
	c)	Sebagai penanganan awal dan sementara di Puskesmas pada pasien glaukoma akut sebelum dirujuk.														
	1.	Tab. 250 mg	Glauset	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	Asetazolamid 250 SK tab 250 mg	50 tab/bulan. untuk glaukoma akut: 1 minggu
3	Betaxolol															
	1.	Tetes mata 0,5 %	Cendo Tonor MDS	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	Betaxolol 0.5% SK botol 0.6ml	

4	Latanoprost															
	1.	Latanoprost 0,0005%	Latanoprost	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	Latanoprost 0,0005% SK tetes mata 2.5 ml	Hanya untuk pasien glaucoma yang tidak memberikan respon pada timolol. Maks 1 btl/bln
23. OKSITOSIK																
1	Metilergometrin															
	1.	Tab. 0,125 mg	Methylergometrine Tab. 0,125 mg	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
	3.	Inj. 0,2 mg/ml	Methylergometrin inj	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
2	Misoprostol															
	1.	Tab. 0,2 mg	Misoprostol tab	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
3	Oksitosin															
	1.	Inj. 10 UI	Oxytocin	√		√	√	√	√	√	√		√	(-)	(-)	
24. PSIKOFARMAKA																
24.1 ANTI ANSIETAS																
1	Alprazolam															
	a)	Hanya dapat diresepkan oleh Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa dan Internis Psikosomatik.														
	b)	Hanya untuk kasus: - Panic attack - Panic disorder														
	c)	Peresepan oleh Dokter Spesialis Penyakit Dalam maksimal 5 hari/bulan.														
	1.	Tab. 0,5 mg	Alprazolam 0.5 mg	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Alprazolam 0,5 SK tab 0,5 mg	Maks 2 minggu/kasus, 30 tab/bulan

	2.	Tab. 1 mg	Alprazolam 1 mg	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Alprazolam 1 SK tab 1 mg	Maks 2 minggu/kasus, 30 tab/bulan
2	Diazepam															
	1.	Tab. 2 mg	Diazepam 2 mg	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Diazepam 2 SK tab 2 mg	30 tab/bulan
	2.	Tab. 5 mg	Diazepam 5 mg	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Diazepam 5 SK tab 5 mg	30 tab/bulan
	3.	Inj. 5 mg/ml	Diazepam inj	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	
3	Clobazam															
	1.	Tab. 10 mg	Clobazam 10 mg	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Klobazam 10 SK tab 10 mg	30 tab/bulan
4	Kombinasi mengandung : klordiazepoksid 5 mg, klidinium Br 2,5 mg															
	1.	Tab.	Braxidin	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	Rj : sesuai plafon dan Ri : maks 10 tab
5	Lorazepam															
	1.	Tab. 0,5 mg	Merlopam 0.5 mg	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Lorazepam 0.5 SK tab 0.5 mg	30 tab/bulan
	2.	Tab. 2 mg	Merlopam 2 mg	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Lorazepam 2 SK tab 2 mg	30 tab/bulan
6	Estazolam															
	1.	Tab. 1 mg	Alena 1 mg	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	(-)	
	2.	Tab. 2 mg	Alena 2 mg	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	(-)	
24.2 ANTI DEPRESI																
1	Amitriptilin															
	1.	Tab. 2 mg	Amitriptilin	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Amitriptiline 25 SK tab 25 mg	60 tab/bulan
2	Escitalozam															
	1.	Tab. 10 mg	Depram	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	

3	Fluoksetin HCl															
	1.	Tab. 10 mg	Fluoxetin 10 mg	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Fluoksetin HCl 10 SK Kap 10 mg	30 tab/bulan
	2.	Tab. 20 mg	Fluoxetin 20 mg	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Fluoksetin HCl 20 SK Kap 20 mg	30 tab/bulan
24.3 ANTI OBSESI KOMPULSI																
1	Fluoksetin HCl															
	1.	Tab. 10 mg	Fluoxetin 10 mg	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Fluoksetin HCl 10 SK Kap 10 mg	30 tab/bulan
	2.	Tab. 20 mg	Fluoxetin 20 mg	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Fluoksetin HCl 20 SK Kap 20 mg	30 tab/bulan
24.4 ANTI PSIKOSIS																
1	Aripripazol															
		Tab. 10 mg	Aripiprazole	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Aripripazol 10 SK tab discmelt 10 mg	Rj: 30 tab/bulan dan Ri : maks 10tab
2	Clozapin															
	1.	Tab. 25 mg	Clozapine 25 mg	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Clozapine 100 SK tab 100 mg	Hanya untuk skizofrenia yang resistensi/ intoleran. Maks 90 tab/ bulan
3	Haloperidol															
	1.	Tab. 0,5 mg	Haloperidol 0,5 mg	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Haloperidol 0,5 SK tab 0,5 mg	Hanya dapat diresepkan oleh Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa. Maks 90 tab/bulan
	2.	Tab. 5 mg	Haloperidol 5 mg	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Haloperidol 5 SK tab 5 mg	Maks 90 tab/bln
	3.	Inj. 5 mg/ml	Haloprerdol Inj 5mg/ml	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	

4	Risperidon															
	a)	Untuk skizofrenia.														
	b)	Adjunctive treatment pada pasien bipolar yang tidak memberikan respons dengan pemberian litium atau valproat.														
	c)	Hanya dapat diresepkan oleh dokter spesialis kesehatan jiwa.														
	1.	Tab. 2 mg	Risperidone 2 mg	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Risperidon 2 SK tab 2 mg	90 tab/bulan.
5	Trifluoperazin															
	Hanya dapat diresepkan oleh Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa.															
	1.	Tab. 5 mg	Trifluoperazine 5 mg	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Trifluoperazin 5 SK tab 5 mg	Maks 90 tab/bln
6	Olanzapin															
	Hanya dapat diresepkan oleh Dokter Sp.KJ.															
	1.	Tab. 5 mg	Olanzapin 5 mg	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Olanzapin 5 SK tab 5 mg	Maks 60 tab/bulan
		a. Untuk skizofrenia														
		b. <i>Adjunctive treatment</i> pada kasus bipolar yg tdk memberikan respons dgn pemberian litium atau valproat														

7	Fluphenazine decanoate															
	1.	Inj. 25 mg/ml	Sikzonoate	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	√	√	Flufenazin 25 SK inj 25 mg/ml	Hanya untuk rumatan pada pasien skizofrenia. Maks 1 amp/2 minggu
8	Quetiapine fumarat															
	a)	Untuk skizofrenia.														
	b)	Untuk pasien bipolar yang tidak memberikan respons terhadap pemberian litium atau valproat.														
	c)	Hanya dapat diresepkan oleh Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa.														
	1.	Tab. 200 mg	Quetvelli	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Seroquel XR 200 Asca tab 200 mg	Maks 60 tab/bulan dan Ri : maks 10 tab
9	Klorpromazin HCl															
	1.	Tab. 100 mg	Cepezet 100	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Klorpromazin 100 SK tab sal 100 mg	Maks 90 tab/bulan
24.5 OBAT UNTUK GANGGUAN BIPOLAR																
1.	Na Divalproat															
	1.	Tab. lepas lambat 500 mg	Divalproex Sodium 500 mg	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Valproat 500 SK tab lepas lambat 500 mg	Maks 60 tab/ bulan
	2.	Tab. sal. enterik 250 mg	Divalproex Sodium 250 mg	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Valproat 250 SK tab sal 250 mg	Dapat digunakan untuk epilepsy umum (general epilepsy) maks 90 tab/ bulan. Untuk bipolar maks 60 tab/ bulan.

25. OBAT UNTUK SALURAN CERNA																
25.1 ANTASIDA DAN ANTIULKUS																
1	Kombinasi mengandung : Al(OH) ₃ 200 mg, Mg(OH) ₂ 200 mg															
	1.	Sir.	Myllacid	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	Rj : sesuai plafon dan Ri : maks 2 btl	
3	Lansoprazole															
	1.	Kaps. 30 mg	Lansoprazole	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Lansoprazole 30 SK kap 30 mg	Maks 30 tab/bln	
		a) Untuk terapi jangka pendek pada kasus tukak lambung, tukak duodenum dan refluks esofagitis.														
		b) Diberikan 1 jam sebelum makan.														
	2.	Serbuk inj. 30 mg	Lansoprazole inj	√	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	1-3 amp/hari maks 3 hari.	
		Untuk pasien IGD atau rawat inap dengan riwayat perdarahan saluran cerna.														
4	Omeprazole															
	1.	Kaps. 20 mg	Omeprazole	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Omeprazol 20 SK kaps 20 mg	Maks 30 kaps/bulan	
		a) Untuk terapi jangka pendek pada kasus tukak lambung, tukak duodenum dan refluks esofagitis.														
		b) Diberikan 1 jam sebelum makan.														
	2.	Serbuk inj. 40 mg	Omeprazole	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	1-3 amp/hari maks 3 hari.	

		Untuk pasien IGD atau rawat inap dengan riwayat perdarahan saluran cerna.														
5	Pantoprazole															
	1.	Serbuk inj. 40 mg	Pantoprazole – Bernofarm	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	
	Ranitidine															
6	1.	Tab. 150 mg	Ranitidine Tab 150 mg	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Ranitidin 150 SK tab 150 mg	Maks 30 tab/bln
	2.	Sirup 75mg/5ml	Ranivel	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)		Ri : maksimal 1 btl Rj : sesuai plafon
	3.	Inj. 25 mg/ml	Ranitidine inj	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
7	Sucralfat															
	1.	Sir. 500 mg/ml	Sucralfat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
8	Dimetil-polisiloksan aktif															
	1.	Tab. 40 mg	Dysflatil	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
9	Esomeprazole															
	1.	Inj. 40 mg	Esomeprazole inj	√	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	√	√	(-)	√	(-)	(-)	1 amp/hari maks 3 hari
10	Misoprostol															
	1.	Tab. 600 mcg	Misoprostol tab	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
25.2 ANTIEMETIK																
1	Dimenhidrinat															
	1.	Tab. 50 mg	Dimenhidrinat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
2	Domperidone															
	1.	Tab. 10 mg	Domperidone tab	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	

	2.	Sir. 5 mg/5 ml	Domperidone sirup	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
	3.	Drop 5 mg/5 ml	Monel drop	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
3	Metokloperamid															
	1.	Tab. 5 mg	Metoklorpramid tab	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
	2.	Inj. 10 mg/2 ml	Metoklorpramid inj	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
4	Ondansetron															
	1.	Tab. 8 mg	Ondancetron tab 8 mg	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
	2.	Inj. 8 mg/ 4 ml	Ondancetron inj 8 mg/ 4 ml	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	
	3.	Inj. 4 mg/ 2ml	Ondancetron inj 4mg/ 2 ml	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	
6	Ramosetron Hcl															
	1	Inj. 0,3 mg/2 ml	Ramozex - Novell	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	Premed atau post op maks 2x
25.3 ANTIHEMOROID																
1	Kombinasi mengandung : Bismuth subgallate 150 mg, zinc oxide 120 mg, lidocaine HCl 10 mg, hexachlorophene 2,5 mg															
	1.	Suppositoria	Antihemoroid	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
2	Hidrosmin															
	1.	Kaps. 200 mg	Venosmil	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	Rj : sesuai plafon dan Ri : maks 10 tab

3	Kombinasi mengandung: Lithospermi radix extractum 0,18 mg, aethylis aminobenzoas 20 mg, dibucaini HCl 0,5 mg, diphenhydramini HCl 0,5 mg, cetrimide 2,5 mg															
	1.	Suppositoria	Borraginol N	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)		
4	Kombinasi mengandung : Lithospermi radix extractum 0,18 mg, prednisolone 1 mg, lidocaine 15 mg, cetrimide 2,5 mg, aethylis aminobenzoas 20 mg, lechitium ovi 100 mg															
	1.	Suppositoria	Borraginol S	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)		
25.4 ANTI SPASMODIK																
1	Atropin															
	1.	Inj. 0,25 mg/ml	Atropine inj	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	
2	Hiosina butilbromida															
	1.	Inj. 20 mg/ml	Buscopan inj	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	
3	Kombinasi : Hyoscine butylbromide 10 mg, Paracetamol 500 mg															
	1.	Tab.	Spasmal	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
4	Isoxsuprine HCl															
	1.	Tab. 20 mg	Hystolan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
	2.	Inj. 10 mg	Proterine	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	

25.5 OBAT UNTUK DIARE																
1	Kombinasi mengandung : NaCl 0,52 g, KCl 0,30 g, trinitrium sitrat dinitrat 0,58 g, glukosa anhidrat 2,7 g															
	1.	Sachet	Pharolit - Novell	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
2	Attapulgit															
	1.	Tab. 600 mg	Attapulgit	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
3	Loperamid HCl															
	Tidak digunakan untuk anak.															
	1.	Tab. 2 mg	Loperamid	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
4	Zinc															
	Harus diberikan bersama oralit selama 10 hari.															
	1.	Tab. 20 mg	Zinc tab	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
	2.	Sir. 20 mg/5 ml	Zinc syr	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	Rj : sesuai plafon dan Ri : maks 1 btl
25.6 KATARTIK																
1	Bisakodil															
	1.	Tab. 5 mg	Bisacodyl	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
	2.	Sup. 10 mg	Dulcolax supp	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
2	Lactulosa															
	1.	Sir. 3,335 g / 5ml	Lacons syr	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	Rj : sesuai plafon dan Ri : maks 2 btl
3	Kombinasi mengandung : Na. lauril sulfoasetat 0,045 g, PEG 400 0,625 g, sorbitol 4,465 g, Na Sitrat 0,450 g, asam sorbat 0,005 g															
	1.	Enema	Microlax	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	

4	Kombinasi mengandung : Monobasic Na phosphate 19 g, dibasic Na phosphate 7 g															
	1.	Enema	Fleet enema	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
25.7 OBAT UNTUK ANTIINFLAMASI																
1	Sulfasalazin															
	Untuk episode akut colitis ulcerativa dan colitis ulcerativa yang hipersensitif terhadap sulfonamida															
	1.	Tab. 500 mg	Sulfasalazin	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sulfasalazin 500 SK 500 mg	
25.8 LAIN-LAIN																
1	Asam ursodeoksikolat															
	1.	Kaps. 250 mg	Ursodeoxycolic Acid	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Asam Ursodeoksikholik 250 SK tab 250 mg	
26. OBAT UNTUK SALURAN NAFAS																
26.1 ANTI ASMA																
1	Aminofillin															
	1.	Tab. 200 mg	Erphafilin	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Aminofilin 200 SK tab scored 200 mg	
	2.	Inj. 24 mg/ml	Aminophyllin - Phapros	√	(-)	√	√	√	√	√	√		√	(-)	(-)	
2	Budesonid															
	1.	Cairan inh. 0,25 mg/ml	Pulmicort Respules	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	Hari pertama maks 5 respul perhari, selanjutnya 2-4 respul perhari selama 5 hari.
		Hanya untuk serangan asma akut.														

3	Kombinasi mengandung : kombinasi: budesonide 160 mcg, formoterol fumarate dihydrate 4.5 mcg															
	1.	Serbuk inhalasi	Symbicort Turbuhaler 120 dosis	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kombinasi: Budesonide Formoterol 120 SK inh 120 dosis Turbuhaler	Utk trp rumatan pd asma. Utk trp pelega pd asma persisten sdg-berat.Utk trp rumatan pd PPOK.Tdk utk bronkhospasme akut.Maks Asma persisten sdg:2tbg/bln. Asma berat:3-4 tbg/bln.PPOK:2tbg/bln
	2	Serbuk inhalasi	Symbicort Rapihaler 120 dosis	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kombinasi: Budesonide Formoterol 120 SK inh 120 dosis Rapihaler	Utk trp rumatan pd asma. Utk trp pelega pd asma persisten sdg-berat.Utk trp rumatan pd PPOK.Tdk utk bronkhospasme akut.Maks Asma persisten sdg:2tbg/bln. Asma berat:3-4 tbg/bln.PPOK:2tbg/bln
4	Dexametason															
	1.	Inj. 5 mg/ml	Dexametason inj	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
5	Epinefrin															
	1.	Inj. 1 mg/ml	Epinephrine inj	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	

6	Fenoterol HBr															
	Hanya untuk serangan asma akut.															
	1.	Aerosol 100 mcg/puff	Berotec -	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Fenoterol HBr 200 SK inh 200 dosis	Hanya untuk serangan asma akut. Maks 1 tbg/bulan
7	Indacaterol															
	1.	Serbuk inhalasi 150 mcg	Onbres Breezhaler	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Indakaterol 150 SK serb ih 150 mcg	Maks 30 kaps inhalasi/bulan.
8	Kombinasi mengandung : Ipatropium bromide 0.5 mg, salbutamol sulphate 2,5 mg															
	a)	Serangan asma akut.														
	b)	Bronkospasme yang menyertai PPOK.														
	c)	SOPT (Sindrom Obstruksi Pasca Tuberkulosis).														
	d)	Sebagai nebulizer di UGD dan ruang perawatan.														
	1.	Cairan inh.	Farbivent - Fahrenheit	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	Hari pertama maks 8 vial/hari, selanjutnya maks 4 vial/hari paling lama 5 hari. Kasus ICU maks 10 vial/hari.
9	Metilprednisolon															
	1.	Tab. 4 mg	Metilprednisolon 4 mg	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Metilprednisolon 4 SK tab 4 mg	Jika sebagai Anti Asma maka maks 10 tab/kasus
	2.	Tab. 8 mg	Metilprednisolon 8 mg	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Metilprednisolon 8 SK tab 8 mg	

	3.	Tab. 16 mg	Metilprednisolon 16 mg	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Metilprednisolon 16 SK tab 16 mg	
	4.	Inj. 125 mg/ 2ml	Metilprednisolon inj 125 mg/ 2 ml	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	
11	Salbutamol															
	1.	Tab. 2 mg	Salbutamol 2 mg	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Salbutamol tab 2 Imfi tab 2 mg	
	3.	Cairan inh. 2,5 mg	Velutine	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	Rj : maks 1 amp dan Ri : maks 3 amp
12	Kombinasi mengandung : Salmeterol xinafoate 50 mcg, fluticasone propionate 250 mcg															
	Tidak diberikan pada kasus asma akut.															
	1.	Inh. 250 mcg/puff	Seretide Diskus	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kombinasi : Salmeterol 50 mcg; Flutikason propionate 250 mcg 60 SK inh 60 dosis	Tidak diberikan pada kasus asma akut. Maks 1 tbg/bln
15	Tiotropium bromide															
	Hanya digunakan untuk severe asthma.															
	1.	Respimat inh. 2.5 mcg	Spiriva Respimat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	tiotropium 2,5 SK cairan inh2,5mcg/sempr ot	Hanya digunakan untuk PPOK, termasuk bronkitis kronik dan emfisema Maks 1 cartridge/bulan.
	2	Respimat inh. 2.5 mcg	Spiriva Respimat Reffil	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	tiotropium 2,5 SK cairan inh2,5mcg/sempr ot,refill	Hanya digunakan untuk PPOK, termasuk bronkitis kronik dan emfisema Maks 1 cartridge/bulan.

26.2 ANTITUSIF																
1	Codein															
	1.	Tab. 10 mg	Codein 10 mg	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
	2.	Tab. 20 mg	Codein 20 mg	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
26.3 EKSPEKTORAN DAN MUKOLITIK																
1	Ambroxol															
	1.	Tab. 30 mg	Ambroxol	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
	2.	Sir. 15 mg/5 ml	Ambroxol sirup	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
			Epexol sirup	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
	3.	Drops 15 mg/ml	Epexol drop	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
2	Glyceril Guaiacolat															
	1.	Tab. 100 mg	Glyceril Guaicolat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
3	Asetilsistein															
	1.	Tab. 200 mg	Acetylcysteine	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	N-Asetil Sistein 200 Eter	Maks 10 kaps/kasus
	2.	Inf. 200 mg	Acetylcysteine	√	(-)	(-)	(-)	(-)	√	√	√	√	(-)	(-)	(-)	
4	Kombinasi mengandung : asetilsistein 200 mg, parasetamol 500 mg															
	1.	Tab.	Dorbigot	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	Rj : sesuai plafon dan Ri : maks 10 tab
5	Erdostein															
	1.	Tab. 300 mg	Erdostein	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
	2.	Sir. 175 mg/ 5 ml	Erdostein	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	Rj : sesuai plafon dan Ri : maks 2 btl

26.4 OBAT UNTUK PENYAKIT PARU OBSTRUKSI KRONIS																
1	Indacaterol															
	1.	Serbuk inhalasi 150 mcg	Onbres Breezhaler	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Indakaterol 150 SK serb ih 150 mcg	Maks 30 kaps inhalasi/bulan.
2	Kombinasi mengandung : Ipatropium bromide 0.5 mg, salbutamol sulphate 2,5 mg															
	a)	Serangan asma akut.														
	b)	Bronkospasme yang menyertai PPOK.														
	c)	SOPT (Sindrom Obstruksi Pasca Tuberkulosis).														
	1.	Cairan inh.	Farbivent	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	Rj : maks 1 amp dan Ri : maks 3 amp
26.5 BATUK, PILEK, DAN FLU																
1	Kombinasi mengandung ; parasetamol 125 mg, dekstrometorfan 3,75 mg, kloramfenikol, fenilopropanolamin 3,125 mg															
	1.	Tab.	Alpara	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
2	Pseudoephedrin HCl															
	1.	Drops 7,5 mg btl. 15 ml	Devosix drop	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	

3	Kombinasi mengandung : Pseudoefedrin HCl 60 mg, Triprolidin HCl 2,5 mg															
	1.	Tab.	Tremenza Tablet	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	Rj : sesuai plafon dan Ri : maks 10 tab
4	Kombinasi mengandung : Pseudoefedrin HCl 30 mg, Triprolidin HCl 1,25 mg															
	2.	Sir.	Tremenza Sirup	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	Rj : sesuai plafon dan Ri : maks 2 btl
5	Kombinasi mengandung : chlorpheniramine maleate 2 mg, dextromethorphan HBr 10 mg, Pseudoephedrin HCL 30 mg															
	1.	Sir.	Hustadin sirup	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	Rj : sesuai plafon dan Ri : maks 2 btl
6	Kombinasi mengandung : Noscapine 10 mg, chlorpheniramine maleate 2 mg, glyceryl guaiacolate 50 mg, paracetamol 500 mg, phenylpropanolamine HCl 15 mg															
	1.	Tab.	Paratusin Tablet	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	Rj : sesuai plafon dan Ri : maks 10 tab

7	Kombinasi mengandung : Noscapine 10 mg, chlorpheniramine maleate 0,5 mg, glyceryl guaiacolate 25 mg, paracetamol 125 mg, pseudoephedrine HCl 7,5 mg, succus liquiritiae 125 mg															
	1.	Sir.	Paratusin Sirup	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	Rj : sesuai plafon dan Ri : maks 2 btl
9	Kombinasi mengandung : Extract thymi 41,67 mg, extract primulae 10 mg, extract althaea 58,33 mg, extr droserae 25 mg, extract serphylli 35 mg, oleum eucalyptus, oleum anisi, menthol, oleum menthae, sodium saccharin															
	1.	Sir.	Silex sirup	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	Rj : sesuai plafon dan Ri : maks 2 btl
27. OBAT YANG MEMPENGARUHI SISTEM IMUN																
27.1 SERUM DAN IMMUNOGLOBULIN																
1	Imunoglobulin tetanus															
	1.	Inj. 250 IU/ml	Tetagam	√	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	√	√		√	(-)	(-)	khusus umum, asuransi swasta, JKK
2	Hepatitis B hosphatelin															
	1.	Inj. 0,5 mg amp.	Euvax-B 0,5 mg	√	√	√	√	√	√	√	√		√	(-)	(-)	
	2.	Inj. 1 mg amp.	Euvax-B 1 mg	√	√	√	√	√	√	√	√		√	(-)	(-)	

27.2 VAKSIN

1	Kombinasi mengandung : Diphtheria toxoid not <20 IU; tetanus toxoid not <40 IU; Bordetella pertussis antigens: Pertussis toxoid 25 mcg, filamentous haemagglutinin 25 mcg; inactivated poliovirus: type 1 (Mahoney) 40 D antigen units, type 2 (MEF-1) 8 D antigen units, type 3 (Saukett) 32 D antigen units; HBsAg 10 mcg; H. influenzae type b polysaccharide 12 mcg (polyribosylribitol phosphate) conjugated to tetanus protein 22-36 mcg														
	1.	Inj. 0,5 ml	Hexaxim	√	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	√	(-)	(-)	
2	Kombinasi mengandung : Adsorbed diptheria toxoid not <30 IU, adsorbed tetanus toxoid not <40 IU, adsorbed pertusis toxoid 25 mcg, adsorbed filamentous haemagglutinin 25 mcg, adsorbed pertactin 8 mcg, adsorbed recombinant HBsAg 10 mcg, 40 D-antigen units of type 1 (Mahoney), 8 D-antigen units of type 2 (MEF-1) & 32 D-antigen units of type 3 (Saukett) of the poliovirus, adsorbed polysaccharide of HiB (PRP) 10 mcg (conjugated to tetanus toxoid 20-40 mcg)														

	1.	Inj. 0.5 ml	Infarix hexa	√	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	√	(-)	(-)	
3	Adsorbed diphtheria toxoid not <30 IU, adsorbed tetanus toxoid not <40 IU, pertussis toxoid 25 mcg, filamentous haemagglutinin 25 mcg, pertactin 8 mcg, inactivated poliovirus type 1 (Mahoney) 40 D-antigen units, type 2 (MEF-1) 8 D-antigen units & type 3 (Saukett) 32 D-antigen units, H. influenzae type b polysaccharide 10 mcg (terkonjugasi dg tetanus toxoid lebih kurang 30 mcg)															
	1.	Inj. 0.5 ml	Infarix hexa IPV+Hib	√	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	√	(-)	(-)	
4	Human tetanushosphatelin Antitoksin Tetanus 1.500 UI															
	1.	Inj. 1.500 UI	Biosat 1.5	√	(-)	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
5	Kombinasi mengandung : Agkistrodon rhodostoma ≥10 LD50, Bungarus fasciatus ≥10 LD50, Naja sputatrix ≥25 LD50, phenol 2.5 mg															
	1.	Inj. 5 ml	Biosave	√	(-)	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	

6	Kombinasi mengandung : Human papillomavirus type 16 L1 protein 20 mcg, human papillomavirus type 18 L1 protein 20 mcg (recombinant & ASO4 adjuvanted).														
	1.	Inj. 0.5 ml	Cervarix	√	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	√	(-)	(-)
7	Human rotavirus vaccine RIX4414 strain not < 10 ⁶ CCID50														
	1.	Inj. 1.5 ml	Rotarix	√	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	√	(-)	(-)
8	Kombinasi mengandung : Pneumococcal polysaccharide (serotype 1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F, & 23F) & nontypeable Haemophilus influenzae protein D conjugate vaccine, adsorbed														
	1.	Inj. 0.5 ml	Synflorix	√	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	√	(-)	(-)
9	Kombinasi mengandung : Haemagglutinin of influenza virus antigen of strain A/H1N1 15 mcg, strain A/H3N2 15 mcg, strain B 15 mcg, thimerosal 4 mcg														
	1.	Inj. 0,5 ml	Flubio	√	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	√	(-)	(-)
10	Kombinasi mengandung : Measles, Mumps, Rubella Vaccine														
	1.	Inj. 0,5 ml	M-M-R	√	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	√	(-)	(-)
11	Pneumococcal polysaccharide conjugated vaccine 7 valent														

	1.	Inj. 0,5 ml	Prevenar	√	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	√	(-)	(-)	
12	Typhoid Vi polysacchari de 0.025 mg, Phenol (preservative) max 1.250 mcg.															
	1.	Inj. 0,5 ml	Thypim Vi	√	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	√	(-)	(-)	
28. OBAT UNTUK TELINGA, HIDUNG, DAN TENGGOROKAN																
1	Docusate Sodium															
	1.	Drop 5 mg/ 10 ml	Forumen	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
2	Chloramphenicol base 1 %															
	Untuk infeksi telinga dengan membran timpani yang utuh															
	1.	Tetes telinga	Erlamycetin	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
3	Fluticasone-furoat															
	1.	Lar. inhalasi 27,5 mcg/puff	Avamys	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
4	Kombinasi mengandung : Polymixin B Sulfate 10.000 UI, neomycin sulfate 5 mg, fludocortisone acetate 1 mg, lidokain HCl 40 mg															
	1.	Tetes telinga	Otilon	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
5	Natrium Klorida															
	1.	Drops 6,5 mg/ml	Breathy	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	

29. VITAMIN DAN MINERAL																
1	Kombinasi mengandung : Ekstrak kering Bilberry 80 mg, Retinol 1600 IU, vit.E 40 mg, Beta-carotene 5 mg.															
	1.	Tab.	Berryvision tab	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	Rj : sesuai plafon dan Ri : maks 10 tab
2	Vitamin B1															
	1.	Inj. 2,5mg/ml amp.	Furamin	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	
3	Kombinasi mengandung : vit.B1 1 mg, vit.B2 1,25 mg, vit.B6 1 mg, vit.B3 10 mg, Ca D-Panhotenat 5 mg															
	1.	Tab.	Vitamin B Kompleks	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Vitamin - B Complex Nova komb tab	
4	Piridoksine (Vitamin B6)															
	1.	Tab. 10 mg	Vitamin B6	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Vitamin B6 Piridoksi 10 Imfi tab 10 mg	
5	Kombinasi mengandung : Vit.B1 100 mg, vit.B6 100 mg, vit.B12 5000 mcg															
	1.	Tab.	Neuromed	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	Rj : sesuai plafon dan Ri : maks 10 tab
6	Kombinasi mengandung : Vit. B1 50 mg, vit. B6 100 mg, vit. B12 100 mcg, metampiron 500 mg															

	1.	Tab.	Neurosanbe plus	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	Rj : sesuai plafon dan Ri : maks 10 tab
7	Kombinasi mengandung : Vit. B1 100 mg, vit. B6 100 mg, vit. B12 5000 mcg															
	1.	Inj.	Vit. B1 100 mg, vit. B6 100 mg, vit. B12 5000 mcg	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	
	1.	Sachet	Minowell - Novell	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	Rj : sesuai plafon dan Ri : maks 10 tab
8	Kombinasi mengandung : Silybin-phospholipids (silybin setara dg 48 mg, 3-SN-phosphatidyl choline 96 mg) 144 mg, vitamin B1 6 mg, vitamin B2 6 mg, vitamin B6 6 mg, vitamin B12 6 mcg, vitamin E 15 mg, nicotinamide 30 mg.															
	1.	Tab.	Prohepar - Yarindo	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	Rj : sesuai plafon dan Ri : maks 20 tab
10	Vitamin C															
	1.	Tab. 500 mg	Vitamin C	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
11	Kombinasi mengandung : Vit.A 2400 IU, vit.D 400 IU, vit.C 60 mg, vit.B1 4mg, vit.B2 1.2mg, vit.B6 1.2mg, vit.B12 4mcg, nikotinamida 16 mg, kolin 12mg, inositol 12mg, L-lysine HCl 200 mg, kalsium 33,1mg, natrium 5,2mg/ 5 ml															
	1.	Sir.	Elkana	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
12	Kombinasi mengandung : natural fish oil, providing DHA 214 mg, EPA 20 mg, vit E 10 mg															


	1.	Kaps.	Prolacta for baby	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	Rj : sesuai plafon dan Ri : maks 10 tab
13	Kombinasi mengandung : Cod liver oil 200 mg, vit.A 120 IU, vit D3 17 IU, omega-3, EPA 16mg, DHA 14mg, vit.E 5mg, vit.B12 1mcg, vit.B9 0.3mg, vit.B6 0,6 mg, Ca 40mg, Mg 25mg, Fe 4.76 mg															
	1.	Kaps.	Caloma Plus	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	Rj : sesuai plafon dan Ri : maks 10 tab
14	Kombinasi mengandung : Fe Fumarat 360 mcg, B6 3 mg, vit.B9 1,5 mcg, B12 15,5 mcg, vit C 75 mcg, Vit E 5 mg, Cu sulfat 0,35 mcg, Co sulfat 0,15 mg, Mn Sulfat 0,05 mg															
	1.	Tab.	Proferro	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	Rj : sesuai plafon dan Ri : maks 10 tab
15	Kombinasi mengandung : Fe fumarat 90 mg, vit.B1 6mg, vit.B3 30 mg, vit.B6 5 mg, vit.B9 0.8 mg, vit.B12 0.025 mg, fish oil 10%, EPA 50%, DHA 200 mg															
	1.	Kaps.	Prohelic	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	Rj : sesuai plafon dan Ri : maks 10 tab
16	Vitamin E															
	1.	Kaps. 400 IU	Koni E 400 soft capsul	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	

17	Kombinasi mengandung : DL-3-methyl-2-oxo-valeric acid 67 mg, 4-methyl-2-oxo-valeric acid 101 mg, 2-oxo-3-phenyl-propionic acid 68 mg, 3-methyl-2-oxo-butyric acid 86 mg, DL-2-hydroxy-4-methylthio-butyric acid 59 mg, L-lysine monoacetate 105 mg, L-threonine 53 mg, L-tryptophan 23 mg, L-histidine 38 mg, L-tyrosine 30 mg															
	1.	Tab.	Prorenal	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	Rj : sesuai plafon dan Ri : maks 10 tab
18	Kombinasi mengandung : kolin sitrat 147,5 mg, sitidin monofosfat 121,5 mg, fosfatidil serin 125 mg															
	1.	Tab.	Neulin PS	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	Rj : sesuai plafon dan Ri : maks 10 tab
19	Kombinasi mengandung : Orthosiphonis Folium 150 mg, Sericocalysis Folium 75 mg, Phyllanthi Herba 50 mg, Foenigraeci Semen 100 mg															
	1.	Kaps.	Nefromex	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
20	N (2) L Alanyl Glutamin															
	1.	Infus 200 mg/ 100 ml	Gabaxa	√	(-)	√	√	√	√	√	√	(-)	√	(-)	(-)	Rj : sesuai plafon dan Ri : maks 1 flash

21	Kombinasi mengandung : Dibasic calcium phosphate 200 mg, Calcium Lactate 100 mg, Vitamin B6 20 mg, Vitamin C 25 mg,Vitamin D 100 IU															
	1.	Tab.	Elkana	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
22	Metilcobalamin															
	1.	Kaps. 500 mg	Mecobalamin	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	
	Calcitriol															
	Hanya untuk penyakit ginjal kronis grade 5 atau pasien hipoparatiroid pemeriksaan kadar kalsium ion 1,1 - 2,5 mmol.															
	1.	Kaps. Calcitriol 0,25 mcg	Calcitriol 0,25 mcg	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Calcitriol 0.25 SK kap 0.25 mcg	Hanya untuk penyakit ginjal kronis grade 5 dan pasien hipoparatiroid pemeriksaan kadar kalsium ion 1,1 - 2,5 mmol.Maks 90 kaps/bulan
	Glucosamine HCl															
	25	1.	Tab. 500 mg	Glucosamine HCl	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)
26	Kombinasi mengandung : Kalsium karbonat 400 mg, vit D3 50 IU, evening primrose oil (mengandung asam γ-linoleate 40 mg) 400 mg															
	1.	Kap.	Epocaldi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	Rj : sesuai plafon dan Ri : maks 10 tab

27	Kalsium Laktat															
	1.	Tab. 500 mg	Lactas Calcicus	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kalsium Laktat - 500 Mersi	Untuk hipoparatiroidisme.
28	Fe															
	1.	Sir. 15 mg/5 ml	Ferro-K	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	Rj : sesuai plafon dan Ri : maks 1 btl
	2.	Drop. 15 mg/ml	Ferro-K	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	(-)	(-)	Rj : sesuai plafon dan Ri : maks 1 btl

Ditetapkan di Malang
 Pada tanggal 6 Maret 2024
 Direktur Utama Perseroan Terbatas Disa Prima




Endang Susilowati