

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMBERIAN TERAPI PENCEGAHAN TUBERKULOSIS PADA ANAK																					
	No. Dokumen 1029.2/I-SPO/DIR/VII/2024	No. Revisi 00	Halaman1 / 1																			
STANDART PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 30 Juli 2024	Ditetapkan Oleh : PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Nur Mazidah																				
Pengertian	Pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) adalah pemberian pengobatan untuk pasien anak yang kontak serumah dengan dengan pasien terkonfirmasi TBC dan orang dengan HIV/AIDS (ODHA) yang tidak sakit TBC untuk mencegah perkembangan penyakit TBC pada anak																					
Tujuan	Memberi acuan dalam melakukan pemberian TPT pada anak Mencegah penyakit TBC sehingga dapat menurunkan beban TBC																					
Kebijakan	Peraturan Direktur Nomor 791.1/I-PDM/DIR/VI/2022 tentang Pedoman Pelayanan dan Asuhan																					
Prosedur	1. Poli Paru: berikan KIE pada pasien terkonfirmasi TBC yang memiliki anak untuk melakukan pemeriksaan di poli Anak 2. Poli Anak: jika terdapat pasien anak yang dibawa untuk konsultasi akibat adanya kontak TBC aktif, berikan KIE tentang penularan TBC dan pemberian TPT 3. Lakukan anamnesa untuk skrining gejala TBC kemudian lakukan pemeriksaan fisik dan timbang berat badan anak 4. Jika anak bergejala, lakukan pemeriksaan penunjang yaitu mantoux atau pemeriksaan dahak jika anak sudah bisa mengeluarkan dahak 5. Pada anak yang tidak bergejala dan berusia lebih dari 5 tahun, lakukan pemeriksaan Mantoux. Jika hasil negatif, maka dapat diberikan TPT 6. Pada anak yang tidak bergejala dan berusia kurang dari 5 tahun, berikan TPT tanpa pemeriksaan Mantoux 7. Regimen TPT yang dapat diberikan adalah sebagai berikut <table><tr><th rowspan="2">Sasaran</th><th colspan="3">Pilihan Paduan TPT</th></tr><tr><th>3HP</th><th>3HR</th><th>6H</th></tr><tr><td>< 2 tahun</td><td></td><td>√</td><td>√</td></tr><tr><td>2 – 4 tahun</td><td>√</td><td></td><td></td></tr><tr><td>≥ 5 tahun</td><td>√</td><td></td><td></td></tr></table> 8. Jika sediaan 3HR tidak tersedia, gunakan isoniazid untuk anak usia < 2 tahun 9. Jika terdapat pasien anak yang terkonfirmasi TBC, lakukan KIE pada keluarga yang kontak serumah untuk skrining TBC ke puskesmas			Sasaran	Pilihan Paduan TPT			3HP	3HR	6H	< 2 tahun		√	√	2 – 4 tahun	√			≥ 5 tahun	√		
Sasaran	Pilihan Paduan TPT																					
	3HP	3HR	6H																			
< 2 tahun		√	√																			
2 – 4 tahun	√																					
≥ 5 tahun	√																					
Unit Terkait	Instalasi Rawat Jalan																					