

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	RESUSITASI BAYI BARU LAHIR		
	No. Dokumen 571.73/I-SPO/NEO/VI/2025	No. Revisi 01	Halaman 1 / 3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 18 Juli 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Suatu tindakan pertolongan yang dilakukan pada korban yang mengalami henti nafas dan henti jantung		
Tujuan	1. Sebagai acuan langkah-langkah menyelamatkan bayi baru lahir yang mengalami asfiksi 2. Menyelamatkan Jiwa 3. Mencegah terjadinya kecacatan 4. Memberikan hemodinamik dan pernafasan dalam batas normal		
Kebijakan	1. Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor : 571.2/I-PDM/DIR/VI/2025 tentang Pedoman PONEK 24 jam 2. Dilakukan oleh Dokter dan perawat		
Prosedur	1. Persiapan Alat. 1. Selimut hangat/tebal yang bersih/popok <u>serta</u> kain penyeka muka 2. Sungkup no.1 <u>untuk bayi</u> cukup <u>bulan</u> dan no.0 untuk bayi kurang bulan 3. Penghisap <u>lendir</u> .slym dan penekan <u>lidah</u> : 1 set 4. Meja kering, bersih dan hangat 5. Pemotong dan pengikat tali pusat : 1 set 6. Timer (<u>jam</u> tangan yang ada detiknya 7. Oxygen, ventilasi dengan oxygen 1. Jaga Bayi tetap hangat. 1. Selimuti bayi dengan kain yang ada di dekat ibunya. 2. Pindahkan bayi terselimuti ke tempat resusitasi yang disiapkan. 3. Kerjakan pedoman pencegahan <u>infeksi</u> dalam melakukan tindakan <u>perawatan</u> dan resusitasi 2. Atur Posisi Bayi 1. Letakkan bayi telentang dengan ganjal kain dibawah bahunya. 2. Atur posisi kepala bayi sedikit ekstensio agar jalan napas terbuka. 3. Isap Lendir. 1. Isap lendir dengan alat pengisap lendir De Lee atau bola karet 2. Lakukan isapan lendir pada mulut dulu, sedalam < 5 cm. 3. Lakukan isapan lendir pada hidung sampai batas cuping hidung. 4. Isap lendir saat ujung kateter di dalam mulut dan saat menarik kateter keluar, tidak waktu memasukkannya.		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	RESUSITASI BAYI BARU LAHIR		
	No. Dokumen 571.73/I-SPO/NEO/VI/2025	No. Revisi 01	Halaman 2 / 3
Prosedur	4. Keringkan dan rangsang bayi 1. Keringkan bayi mulai muka, kepala, tubuh dengan sedikit tekanan. 2. Nepuk / Sentil telapak kaki bayi atau menggosok punggung/perut/ dada/ tungkai bayi dengan telapak tangan. 3. Ganti kain ke-1 yang basah dengan kain dibawahnya yang kering. 4. Selimuti bayi dengan kain kering, muka dan dada terbuka.		
	5. Atur kembali posisi kepala bayi 1. Mengatur kembali posisi kepala bayi agar sedikit ekstensio. 2. Seluruh kegiatan Langkah Awal diselesaikan dalam 30 detik 6. Lakukan Penilaian - Keputusan - Tindakan BBL 1. Nilai apakah bayi bernapas normal,megap-megap atau tak bernapas. 2. Lakukan asuhan pasca resusitasi jika bernapas normal 3. Mulai ventilasi jika megap-megap atau tak bernapas. 7. Bila Air ketuban bercampur mekonium lakukan langkah berikut: 1. Setelah seluruh badan bayi lahir Nilai apakah menangis/bernapas normal/megap-megap/tak bernapas 2. Jika menangis/bernapas normal. Potong tali pusat dengan cepat, tidak diikat & tidak dibubuhi apapun, dilanjutkan dengan Langkah Awal 3. Jika Bayi megap-megap/ tidak bernapas. Buka lebar mulut bayi, usap mulut bayi, isap lendir. Memotong tali pusat dengan cepat, dilanjutkan dengan Langkah Awal 2. LANGKAH RESUSITASI : VENTILASI 1. Pasang Sungkup 1.1 Pasang sungkup pada muka bayi, menutup hidung, mulut, dagu 2. Lakukan Ventilasi 2x 2.1 Tiup udara melalui alat tabung & sungkup / memompa alat balon & sungkup ke mulut & hidung bayi 2 X (dengan tekanan 30 cm air) 2.2 Lihat apakah dada bayi mengembang saat ditiup atau dipompa 3. Jika dada bayi tidak berkembang 1. Periksa posisi sungkup dan pastikan tidak ada udara bocor 2. Periksa posisi kepala dan membetulkan agar sedikit ekstensi. 3. Periksa apakah ada cairan/ lendir dimulut dan		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	RESUSITASI BAYI BARU LAHIR		
	No. Dokumen 571.73/I-SPO/NEO/VI/2025	No. Revisi 01	Halaman 3 / 3
	mengisap bila ada 4. Tiup udara melalui alat tabung & sungkup / memompa alat balon & sungkup ke mulut & hidung bayi 2 X (dengan tekanan 30 cm air). 4. Jika dada bayi berkembang 1. Lanjutkan langkah ventilasi jika dada bayi berkembang.		
Prosedur	2. Lakukan Ventilasi 20x dalam 30 detik 3. Lakukan ventilasi sebanyak 20 X dalam 30 detik (tekanan 20 cm air) 4. Lakukan Penilaian - Keputusan - Tindakan BBL 5. Nilai usaha napas. 5. Jika bernapas spontan. 1. Hentikan ventilasi bertahap 2. Lakukan asuhan pasca resusitasi 6. Jika megap-megap/ tidak bernapas Ulangi ventilasi sebanyak 20X dalam 30 detik 7. Hentikan ventilasi dan Nilai bayi tiap 30 detik 1. Hentikan ventilasi setiap 30 detik. 2. Nilai usaha napas 8. Jika megap-megap/ tidak bernapas 1. Ulangi ventilasi sebanyak 20X dalam 30 detik 2. Hentikan ventilasi & nilai frekuensi jantung, napas tiap ventilasi 30 detik 9. Jika megap-megap/tidak bernapas sesudah 2 menit resusitasi: 1. Meneruskan ventilasi 20 X / 30 detik. 2. Hentikan ventilasi & nilai napas tiap ventilasi 30 detik. 3. Menyiapkan rujukan bayi bersama ibunya sesuai pedoman 10. Bila tidak bernapas sesudah Resusitasi 10 menit Pertimbangkan menghentikan ventilasi sesudah resusitasi menit dan tidak terdengar denyut jantung. 11. Dokumentasi 1. Tanggal dan jam lahir 2. Kondisi bayi saat baru lahir 3. Jam mulai resusitasi 4. Tindakan resusitasi yang dilakukan 12. Hasil Resusitasi		
Unit Terkait	1. Instalasi Kandungan & Kebidanan 2. Instalasi Neonatologi 3. Instalasi Kamar Operasi 4. IGD Ponak		