

Yth.

1. Kepala Bidang Pelayanan Medis
2. Kepala Bidang Penunjang Medis
3. Seluruh Dokter Penanggungjawab Pasien (DPJP)
4. Instalasi Rawat Jalan (IRJA)
5. Instalasi Farmasi RS (IFRS)

SURAT EDARAN
NOMOR : 261/I-SE/DIR/IV/2026

TENTANG
PENGANTAR FORMULARIUM NASIONAL TAHUN 2025

Berdasarkan dengan surat dari BPJS Kesehatan tanggal 16 April 2026 Nomor : 2509/VII-05/0426 perihal : Pengantar FORNAS Tahun 2025 ditetapkannya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 01.07/Menkes/1199/2025 tentang Formularium Nasional sebagai acuan daftar obat yang dijamin, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Ketentuan perubahan acuan daftar obat sebagai berikut :
 - a. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 01.07/Menkes/1199/2025 tentang Formularium Nasional yang ditetapkan 31 Desember 2025 dan mulai berlaku 1 April 2026.
 - b. Penyesuaian Formularium Nasional (Fornas) 2025 tersebut memuat kebijakan tentang :
 - 1) Penambahan Sediaan/Obat PRB;
 - 2) Pengurangan jenis/bentuk sediaan;
 - 3) Perubahan tingkat yanfaskes/restriksi peresepan maksimal obat/penulisan nama zat aktif dan bentuk sediaan.
(daftar perubahan terlampir)
 - c. Sebagaimana konfirmasi dari Kemenkes RI bahwa Perubahan Formularium Nasional Tahun 2023 selanjutnya memuat **677 item dalam 1.149 bentuk sediaan/kekuatan**, yang terbagi dalam **33 kelas terapi**, dengan rincian perubahan sebagai berikut :

JENIS PERUBAHAN	JUMLAH
Penambahan sediaan baru	9 bentuk sediaan/ kekuatan dari 9 item obat
Perubahan tingkat fasyankes	7 item dalam 9 bentuk sediaan/ kekuatan
Perubahan retriksi	15 item dalam 25 bentuk sediaan/ kekuatan
Perubahan peresepan maksimal	9 item dalam 11 bentuk sediaan/ kekuatan
Penambahan Obat PRB	2 bentuk sediaan/ kekuatan dari 2 item obat
Obat Keluar (Sediaan)	3 bentuk sediaan/ kekuatan dari 3 item obat
Perubahan penulisan nama zat aktif	3 bentuk sediaan/ kekuatan dari 3 item obat
Perubahan penulisan bentuk sediaan	2 bentuk sediaan/ kekuatan dari 2 item obat

2. Berkaitan dengan ketentuan perubahan sebagaimana poin 1, telah dilakukan deploy penyesuaian referensi obat pada Aplikasi Apotek Online sesuai ketentuan Fornas 2025, dengan catatan untuk item obat/sediaan obat luar paket yang baru ditetapkan pada Fornas 2025 masih menunggu ketentuan penetapan harga oleh Kemenkes.



3. Berikut daftar penyesuaian referensi obat aplikasi apotek online sebagai berikut:

NO	KODE OBAT	GENERIK	JNS OBAT	OBAT	JENIS PERIBAHAN
1	05081	Kombinasi: Budesonide Formoterol	120	Kombinasi: Budesonide Formoterol 120 SK inh 120 dosis Turbuhaler	Penyesuaian Nama Obat
2	04686	Prokaterol	200	Prokaterol 10 SK serb ih 10 mcg	Penyesuaian TAT
3	05014	Haloperidol	120	Haloperidol 50 SK inj 50 mg/ ml	Penyesuaian Retriksi
4	05208	Trifluoperazine	120	Trifluoperazine 5 SK tab 5 mg	Penyesuaian Retriksi
5	01210	Mesalazine	200	Mesalazine 250 SK tab 250 mg	Penyesuaian Retriksi
6	04987	Fenoterol HBr	120	Fenoterol HBr 100 SK inh 100 mcg/puff	Penyesuaian Retriksi
7	04923	Terbutalin	120	Terbutalin 0,5 SK inh turbu 0.5 mg/dosis	Penyesuaian Retriksi

*) Catatan untuk item obat / sediaan obat luar paket yang baru ditetapkan pada Fornas 2025 tersebut masih menunggu ketentuan penetapan harga oleh Kemenkes.

4. Berkenaan dengan hal tersebut diatas agar :

- Acuan penulisan resep dan penjaminan pelayanan obat bagi peserta JKN sesuai dengan Formulir Nasional 2025 tersebut berlaku sejak pelayanan obat tanggal 1 April 2026.
- FKRTL yang telah mengajukan klaim obat kronis dan kemoterapi melalui bridging agar melakukan *remapping* kode obat baru mulai pelayanan obat 1 April 2026.
- Fasilitas Kesehatan memastikan ketersediaan obat sesuai daftar obat sebagaimana tercantum pada Formulir yang berlaku.
- Fasilitas Kesehatan memastikan peserta mendapatkan obat luar paket sesuai indikasi medis dan sesuai dengan ketentuan Fornas, serta tidak ada iur biaya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 24 April 2026
Direktur RS Prima Husada,



dr. Resti Lestantini. M. Kes



RINCIAN PERUBAHAN FORMULARIUM NASIONAL 2025

1. Penambahan Sediaan Baru

No	Nama Obat	Bentuk sediaan	Alasan
1	morfin	sir 10 mg/5 mL	Diperlukan pada pasien yang tidak dapat menggunakan sediaan tablet, terutama untuk mengatasi nyeri akibat kanker
2	oksimetazolin	ts mata 0,25 mg/mL	Diperlukan penanganan pada kasus iritasi ringan yang tidak membaik setelah penggunaan <i>artificial tears</i>
3	mesalazin	tab 500 mg	- Diperlukan pengobatan pada fase akut kolitis ulseratif, baik yang ringan maupun sedang, serta tindakan untuk mencegah kekambuhan - Sediaan existing (tab 250 mg) sudah discontinued, hanya menghabiskan sisa stok
4	tiotropium	serb ih 10 mcg/semprot	- Diperlukan untuk digunakan pada pasien PPOK, termasuk bronkitis kronik dan emfisema, sebagai terapi rumatan untuk mengatasi dyspnea serta mencegah eksaserbasi. - Kelebihan sediaan serbuk kering (<i>dry powder</i>) adalah tidak perlu koordinasi penggunaan khusus seperti pada aerosol, sehingga dapat menjadi alternatif yang praktis - Sediaan serbuk kering bisa menjadi pilihan alternatif tergantung kondisi pasien atau saat device aerosol rusak atau sulit digunakan
5	mometason furoat	semprot hidung 50 mcg	Diperlukan untuk rhinitis alergi, polip nasal atau rhinosinusitis
6	fenobarbital	tab 50 mg	Sebagai alternatif dosis bagi anak dengan tubuh besar yang membutuhkan penyesuaian dosis lebih besar untuk pengobatan antiepilepsi dan antikonvulsi
7	takrolimus	kaps lepas lambat 3 mg	Keuntungan terapeutik dari bentuk sediaan kapsul lepas lambat 3 mg bagi pasien transplantasi adalah pengurangan jumlah kapsul yang harus dikonsumsi setiap hari, sehingga berpotensi meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan dan menurunkan angka rejeksi jangka panjang.
8	fludrokortison	tab 0,102 mg	Dibutuhkan untuk pengobatan parsial insufisiensi korteks adrenal primer pada penyakit Addison dan kehilangan garam pada sindrom adrenogenital.
9	vaksin human rotavirus	susp	Digunakan dalam obat program Kemenkes

2. Perubahan Tingkat Faskes (7 item dalam 9 bentuk sediaan/kekuat

No	Nama Obat	Bentuk Sediaan	Sebelum	Menjadi	Alasan
1	Ketoprofen	sup 100 mg	FPKTL	FPKTP, FPKTL	Mengacu pada Kepmenkes No. HK.01.07/Menkes/4799/2021 tentang Daftar Obat Keadaan Darurat Medis
2	Domperidon	drops 5 mg/mL	FPKTL	FPKTP, FPKTL	Keuntungan diterima di FPKTP adalah mencegah penggunaan obat yang bukan lini pertama dan memudahkan pemberian pada bayi.
3	Fenoterol HBr	aerosol 100 mcg/puff	FPKTL, PRB	FPKTP, FPKTL, PRB	Merupakan golongan SABA yang memiliki efektivitas yang setara dengan salbutamol yang dapat diberikan di FPKTP dan digunakan untuk kasus kegawatan di FPKTP.
4	Terbutalin	serb ih 0,50 mg/dosis	FPKTL, PRB	FPKTP, FPKTL, PRB	Dapat digunakan untuk kasus kegawatan di FPKTP.
5	trifluoperazin	tab sal selaput 5 mg	FPKTL, PRB	FPKTP, FPKTL, PRB	Berdasarkan Kepmenkes No.1936/2022 tentang Panduan Praktik Klinis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama, diagnosis dan penatalaksanaan gangguan skizofrenia dan depresi ringan-sedang masuk dalam jenis penyakit dengan tingkat kemampuan 4, sehingga dokter dapat melakukan pelayanan secara mandiri tanpa surat penugasan khusus.
6	akarbose	tab 50 mg tab 100 mg	FPKTL, PRB	FPKTP, FPKTL, PRB	Akses langsung di FPKTP diharapkan dapat memperluas cakupan kendali Diabetes dan Dislipidemia
7	atorvastatin	tab sal selaput 10 mg tab sal selaput 20 mg	FPKTL, PRB	FPKTP, FPKTL, PRB	



3. Perubahan Restriksi (15 item dalam 25 bentuk sediaan/kekuatan)

No	Nama Obat	Bentuk Sediaan	Sebelum	Menjadi	Alasan
1	Mesalazin	granul pelepasan lambat 2.000 mg	Digunakan untuk <i>colitis ulcerativa mild to moderate</i> , baik untuk terapi induksi atau <i>maintenance</i> yang hipersensitif terhadap sulfonamida.	Digunakan untuk <i>colitis ulcerativa mild to moderate</i> , baik untuk terapi induksi atau <i>maintenance</i> .	Merupakan obat lini pertama dan tidak perlu menunggu kondisi hipersensitif terhadap sulfonamida.
		tab sal enterik 250 mg	Untuk episode akut <i>colitis ulcerativa</i> atau <i>colitis ulcerativa</i> yang hipersensitif terhadap sulfonamida	Untuk episode akut <i>colitis ulcerativa</i> .	
2	Kombinasi: tiotropium 2,5 mcg+ olodaterol 2,5 mcg	cairan ih cairan ih, refill	Obat lini kedua untuk PPOK berat yang tidak respons lagi dengan LABA atau LAMA atau LABACs.	a) Obat lini kedua untuk PPOK berat yang tidak respons lagi dengan LABA atau LAMA atau LABACs. b) Dapat dikombinasikan dengan ICS jika hasil pemeriksaan eosinofil > 100 atau jika masih sering mengalami eksaserbasi dengan terapi sebelumnya. c) Hanya dapat diresepkan oleh dokter yang memiliki kompetensi di bidang ilmu kedokteran paru.	- Dasar penambahan ICS perlu didukung oleh pengecekan kadar eosinofil atau jika sering terjadi eksaserbasi. - Kompetensi paripurna diperlukan untuk pemberian obat PPOK, yang hanya dapat didiagnosis oleh dokter paru.
3	zonisamid	tab sal selaput 100 mg	Sebagai terapi tambahan pada pasien epilepsi onset parsial.	Digunakan pada pasien epilepsi dewasa dengan ketentuan: a) Sebagai monoterapi untuk pengobatan kejang parsial dengan atau tanpa generalisasi sekunder atau a) Sebagai terapi tambahan untuk pengobatan kejang parsial	Menyesuaikan dengan indikasi yang tercantum di BPOM

No	Nama Obat	Bentuk Sediaan	Sebelum	Menjadi	Alasan
4	somatropin	inj	Diresepkan oleh dokter yang memiliki kompetensi di bidang ilmu endokrinologi metabolik dan diabetes.	Diresepkan oleh dokter yang memiliki kompetensi di bidang ilmu endokrinologi anak.	Kompetensi peresepan dibatasi pada dokter spesialis endokrinologi anak karena penggunaan hormon pertumbuhan ini membutuhkan keahlian khusus dalam diagnosis dan pengelolaan gangguan pertumbuhan pada anak dan remaja, termasuk evaluasi dengan provocative test dan penyesuaian terapi berkelanjutan.
5	albendazol	tab 400 mg susp 200 mg/5 mL susp 400 mg/10 mL	-	Pada wanita hamil hanya digunakan bila manfaat jelas lebih besar daripada risiko, sebaiknya digunakan pada trimester 2 dan trimester 3.	Ada potensi risiko terhadap janin (Kategori FDA C)
6	Simvastatin	tab 10 mg Tab 20 mg tab 40 mg	kadar LDL > 130 mg/dL untuk pasien diabetes melitus. Setelah 6 bulan dilakukan evaluasi ketaatan pasien terhadap kontrol diet dan pemeriksaan laboratorium LDL dilampirkan setiap 6 bulan.	kadar LDL > 100 mg/dL untuk pasien diabetes melitus. Setelah 6 bulan dilakukan evaluasi ketaatan pasien terhadap kontrol diet dan pemeriksaan laboratorium LDL dilampirkan setiap 6 bulan. Pemberian dapat dilanjutkan untuk mempertahankan pengendalian LDL dibawah 100 mg/dL, kecuali apabila ada kontraindikasi.	Digunakan pada pasien risiko tinggi karena meskipun kadar LDL sudah mencapai batas target (>100), pengobatan tetap dilanjutkan guna mempertahankan kadar LDL dalam rentang tersebut dan menjaga kualitas hidup pasien.

No	Nama Obat	Bentuk Sediaan	Sebelum	Menjadi	Alasan
7	triheksifenidil	tab 2 mg	Terapi awal dapat diberikan di Puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan terlatih dan mempunyai surat pengutuhan dari Kementerian Kesehatan.	(dihapus)	Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1936/2022 tentang Panduan Praktik Klinis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama, diagnosis dan penatalaksanaan gangguan skizofrenia dan depresi ringan-sedang masuk dalam jenis penyakit dengan tingkat kemampuan 4, sehingga dokter dapat melakukan pelayanan secara mandiri tanpa surat penugasan khusus.
8	flufenazin dekanat	inj 25 mg/mL			
9	haloperidol dekanat	inj 50 mg/mL			
10	klorpromazin	tab 100 mg			
11	risperidon	tab 2 mg			
12	Trifluoperazin	tab sal selaput 5 mg	Diresepkan oleh dokter yang memiliki kompetensi di bidang ilmu kedokteran jiwa.		



No	Nama Obat	Bentuk Sediaan	Sebelum	Menjadi	Alasan
13	leuprorelin asetat	serb inj 3,75 mg	c) Dapat digunakan untuk terapi pubertas prekoks disertai dengan pemeriksaan 2 dari 3 tanda-tanda seks sekunder pubertas prekoks. d) Kadar LH basal pada awal terdiagnosis adalah > 0,83 IU/L pada perempuan dan > 0,6 IU/L pada lelaki.	c) Dapat digunakan untuk terapi pubertas prekoks disertai dengan pemeriksaan 2 dari 3 tanda-tanda seks sekunder pubertas prekoks. Kadar LH basal pada awal terdiagnosis adalah > 0,83 IU/L pada perempuan dan > 0,6 IU/L pada lelaki	Poin c dan d digabungkan agar tidak menimbulkan misprepsi
14	takrolimus	kaps 0,5 mg kaps 1 mg kaps lepas lambat 0,5 mg kaps lepas lambat 1 mg	a) Untuk pasien pascatransplantasi hati atau ginjal yang telah mendapat imunosupresan lainnya, tetapi tidak respons. b) Untuk pencegahan rejeksi pada transplantasi hati atau ginjal.	a) Untuk pasien pascatransplantasi hati atau ginjal yang telah mendapat imunosupresan lainnya, tetapi tidak respons. atau b) Untuk pencegahan rejeksi pada transplantasi hati atau ginjal.	Poin a dan b ditambahkan kata "atau" agar tidak menimbulkan misprepsi.
15	klozapin	tab 25 mg tab 100 mg	Hanya untuk pengobatan psikosis yang sudah resisten terhadap antipsikotik lain.	Hanya untuk pengobatan psikosis yang sudah resisten terhadap antipsikotik lain. Pemberian dapat diawali dengan periode cross-tapering hingga 3 bulan, yaitu penurunan bertahap antipsikotik sebelumnya disertai dengan melakukan peningkatan dosis klozapin secara bertahap.	Pemberian klozapin dilakukan dengan cross titrasi; pengobatan lama ditapering off secara bertahap sampai dosis klozapin meningkat secara bertahap, karena jika langsung dihentikan, pasien dapat menjadi tidak stabil.

4. Perubahan Peresepan Maksimal (9 item dalam 11 bentuk sediaan/kekuatan)

No	Nama Obat	Bentuk Sediaan	Sebelum	Menjadi	Alasan
1	solifenasin	tab 5 mg tab 10 mg	Maks 3 bulan.	60 tab/ bulan, maksimal 3 bulan	Disesuaikan dengan dosis yang disetujui BPOM, evaluasi dilakukan tiap 3 bulan
2	imidafenasin	tab sal selaput 0,1 mg	Maks 3 bulan.	60 tab/ bulan, maksimal 3 bulan	
3	fenoterol HBr	aerosol 100 mcg/puff	1 tbg/bulan.	1 tabung / 2 bulan	Kondisi yang tidak terkontrol biasanya membutuhkan lebih dari 2 tabung per tahun, karena umumnya hanya 1 tabung untuk 1-2 bulan.
4	terbutalin	serb inh 0,50 mg/dosis	1 tbg/bulan.	1 tabung / 2 bulan	
5	diazepam	inj 5 mg/mL	10 amp/kasus, kecuali untuk kasus di ICU.	10 amp/kasus, kecuali untuk kasus di ICU dan pada pasien kejang pada tetanus	Diperlukan untuk mengendalikan kejang pada tetanus yang dapat menyebabkan kematian jika tidak ditangani dengan adekuat.
6	benzatin benzilpenisilin	inj 2,4 juta IU/mL (i.m.)	1 vial/bulan.	1 vial per minggu selama 3 minggu	Menyesuaikan posologi yang tercantum di BPOM
7	somatropin	inj	Diberikan setiap hari, dievaluasi setiap tiga bulan sampai umur 14 tahun untuk perempuan dan 16 tahun untuk laki-laki, maksimal 5 vial/bulan.	Diberikan setiap hari, dievaluasi setiap tiga bulan pada tahun pertama kemudian setiap tahun, sampai umur 14 tahun untuk perempuan dan 16 tahun untuk laki-laki, maksimal 5 vial/bulan.	Merujuk pada PPK IDAI 2017 tentang "Penggunaan Hormon Pertumbuhan pada Anak dan Remaja Indonesia," pemantauan kadar IGF-1 serum dilakukan secara intensif pada tahun pertama yaitu setiap 3 bulan sebanyak 4 kali, kemudian dilanjutkan setiap tahun sekali. Jadwal ini bertujuan untuk memantau respons terapi dan menyesuaikan dosis sehingga penggunaan hormon pertumbuhan dapat optimal dan aman
No	Nama Obat	Bentuk Sediaan	Sebelum	Menjadi	Alasan
8	Ketoprofen	sup 100 mg	2 sup/hari, maks 3 hari.	• FPKTP: 2 sup/hari, maks 1 hari. • FPKTL: 2 sup/hari, maks 3 hari.	Perlu dipertimbangkan pembatasan lama penggunaan di FPKTP dan FPKTL agar dapat dibedakan untuk mengidentifikasi kondisi yang memerlukan rujukan.
9	oksümetazolin	fts hidung 0,025% semprot hidung 0,05%	-	1 botol / 2 bulan.	Pertimbangan efek rebound (rhinitis medicamentosa) yang sering terjadi akibat penggunaan obat semprot hidung dekongestan secara berkepanjangan



5. Penambahan Obat PRB (2 bentuk sediaan/kekuatan dari 2 item)

No	Nama Obat	Bentuk Sediaan	Alasan
1	tiotropium	serb ih 10 mcg/semprot	- Diperlukan untuk digunakan pada pasien PPOK, termasuk bronkitis kronik dan emfisema, sebagai terapi rumatan untuk mengatasi dyspnea serta mencegah eksaserbasi. - Kelebihan sediaan serbuk kering (dry powder) adalah tidak perlu koordinasi penggunaan khusus seperti pada aerosol, sehingga dapat menjadi alternatif yang praktis - Sediaan serbuk kering bisa menjadi pilihan alternatif tergantung kondisi pasien atau saat device aerosol rusak atau sulit digunakan
2	fenobarbital	tab 50 mg	Sebagai alternatif dosis bagi anak dengan tubuh besar yang membutuhkan penyesuaian dosis lebih besar untuk pengobatan antiepilepsi dan antikonvulsi

6. Obat Keluar (sediaan) (3 bentuk sediaan/kekuatan dari 3 item)

No	Nama Obat	Bentuk Sediaan	Alasan
1	fludrokortison	tab 20 mg	Sudah digantikan dengan sediaan tablet 0,102 mg sesuai dengan yang tercantum di BPOM.
2	natrium fusidat	salep 2%	Tidak Memiliki Nomor Izin Edar di BPOM.
3	prokaterol	serb ih 10 mcg	• Sediaan ini sudah tidak terdaftar di BPOM. • Sudah tercantum pilihan sediaan lain dalam Fornas.

7. Perubahan Penulisan

No	Nama Obat	Bentuk Sediaan	Jenis Perubahan	Sebelum	Menjadi	Alasan
1	ondansetron	sir 4 mg/mL	Perubahan Penulisan bentuk sediaan/kekuatan	sir 4 mg/mL	sir 4 mg/ 5 ml	Menyesuaikan dengan Registrasi BPOM
2	kombinasi KDT/FDC mengandung: a. ergotamin 1 mg b. kafein 50 mg	tab	Perubahan Penulisan nama zat aktif	kombinasi KDT/FDC mengandung: a. ergotamin 1 mg b. kafein 50 mg	kombinasi KDT/FDC mengandung: a. ergotamin 1 mg b. kafein 100 mg	Menyesuaikan dengan yang tercantum di BPOM
3	natrium fusidat	krim 2%	Perubahan Penulisan nama zat aktif	natrium fusidat	asam fusidat	Menyesuaikan dengan yang tercantum di BPOM
4	anestetik lokal gigi, kombinasi KDT/FDC mengandung: a. lidokain 2% b. epinefrin 1 : 80.000	inj 2 mL	Perubahan Penulisan bentuk sediaan/kekuatan	inj 2 mL	inj	Tidak perlu mencantumkan kemasan agar tidak mengunci dan mempermudah proses pengadaan
5	vaksin pneumokokus polisakarida konjugasi ^[P]	inj (0,5 mL) vial multidosis	Perubahan Penulisan nama zat aktif dan penulisan bentuk sediaan/kekuatan	vaksin pneumokokus polisakarida konjugasi ^[P] inj (0,5 mL) vial multidosis	Vaksin pneumokokus polisakarida konjugasi (PCV) ^[P] inj	Menyelaraskan nama produk dengan kebutuhan Program imunisasi.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 24 April 2026
Direktur RS Prima Husada,



dr. Resti Lestantini. M. Kes