

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PERAWATAN KONSERVATIF GRAVIDA DENGAN PEB		
	No. Dokumen 571.18/I-SPO/MTR/VI/2025	No. Revisi 01	Halaman 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 18 Juli 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Perawatan konservatif yang dilakukan pada wanita hamil dengan umur kehamilan kurang dari 37 minggu dengan gejala-gejala hipertensi (tensi ≥ 160 mmHg), proteinuria (albumin urine +2) dan oedema		
Tujuan	1. Sebagai acuan terselenggaranya perawatan konservatif pada penderita PEB dan mencegah komplikasi yang dapat timbul 2. Agar tindakan yang dilakukan berjalan efektif, efisien, konsisten dan aman dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan melalui pemenuhan standart yang berlaku		
Kebijakan	1. Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor : 571.2/I-PDM/DIR/VI/2025 tentang Pedoman PONEK 24 jam 2. Dilakukan oleh Dokter dan Bidan.		
Prosedur	1. Siapkan alat 1.1. Siapkan alat-alat: a. Alat tensi b. Stetoscop c. Hammer d. Funandoskop e. Obat-obatan sesuai terapi 1.2. Dekatkan alat disamping pasien 2. Siapkan pasien 1. Lakukan tindakan dengan 5 S (senyum, salam, sapa, sopan, santun) 2. Perkenalkan diri pada pasien 3. Identifikasi pasien (nama , register , tanggal lahir) 4. Jelaskan pada ibu tujuan dan prosedur yang akan dilakukan 3. Siapkan lingkungan 3.1 Tempatkan pasien di ruangan khusus PEB 4. Lakukan perawatan konservatif 1. Cuci tangan 6 langkah 2. Observasi keadaan umum : a. Observasi TTV: tensi,nadi, respirasi, suhu b. Observasi His, BJA c. keluhan subyektif, tanda-tanda impending eklamsia (pusing, pandangan kabur, mual muntah, nyeri ulu hati)		
Prosedur	3. Bedrest 4. Terapi sesuai intruksi dokter : a. Sulfas Magnesicus, dosis konservatif		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PERAWATAN KONSERVATIF GRAVIDA DENGAN PEB		
	No. Dokumen 571.18/I-SPO/MTR/VI/2025	No. Revisi 01	Halaman 2 / 2
	b. Aspilet, kalsium, vit E, multivitamin. c. Anti hipertensi (bila tekanan diastolic > 100 mmHg) 5. Beri diit TKTP 6. Mobilisasi bertahap bila tensi < 160/100 mmHg 7. Perawatan konservatif dikatakan gagal bila: a. Ada tanda-tanda impending eklamsia, syndrome HELLP b. Ada kenaikan tensi yang progresif, kelainan fungsi ginjal c. Penilaian kesejahteraan janin jelek 8. pasien boleh pulang bila: a. pasien mencapai perbaikan dengan tanda-tanda preeklamsia ringan (albumin urine $\leq$ + 2, tensi < 160/100mmHg), dan perawatan telah dilanjutkan minimal selama 3 hari. b. Keadaan umum baik 5. Rapikan pasien dan bereskan alat 1. Rapikan pasien dengan posisi yang nyaman 2. Cuci tangan 6 langkah 6. Lakukan evaluasi dan dokumentasi perkembangan pasien 6.1 Amati dan catat hasil tindakan 6.2 Evaluasi hasil tindakan dan respon pasien		
Unit Terkait	1. Ruang perawatan Kandungan & Kebidanan 2. IRNA VIP Gedung IRNA 2C		