

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	EPISIOTOMI		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
	571.23/I- SPO/MTR/VI/2025	01	1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 18 Juli 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Irisan yang dibuat pada perineum untuk melebarkan jalan lahir pada saat kepala janin tampak dari luar dan mulai meregangkan perineum.		
Tujuan	1. Sebagai acuan pelaksanaan tindakan episiotomi 2. Mencegah terjadinya robekan perineum yang tidak teratur sehingga menghambat penyembuhan luka 3. Mencegah terjadinya <i>ruptura perinei</i> tingkat III / totalis 4. Agar tindakan yang dilakukan berjalan efektif, efisien, konsisten dan aman dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan melalui pemenuhan standart yang berlaku		
Kebijakan	1. Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor : 571.2/I-PDM/DIR/VI/2025 tentang Pedoman PONEK 24 jam 2. Dilakukan oleh Dokter dan bidan.		
Prosedur	1. Siapkan alat 1.1. Siapkan alat-alat: a. Gunting episiotomi yang sudah termasuk dalam Partus set b. <i>Heacting</i> set c. Spuit 5 cc dan lidocain 1 %. d. Bethadine e. Kassa deppres 1.2. Dekatkan alat disamping pasien 2. Siapkan pasien 2.1 Lakukan tindakan dengan 5 S (senyum, salam, sapa, sopan, santun) 2.2 Perkenalkan diri pada pasien 2.3 Identifikasi pasien (nama , register , tanggal lahir) 2.4 Jelaskan pada ibu tujuan dan prosedur yang akan dilakukan 2.5 Atur posisi pasien dalam posisi <i>dorsal recumbert</i> 2.6 Lakukan pencegahan infeksi sebelum tindakan, (termasuk asepsis dan anti sepsis pada vulva dan vagina luar) 3. Siapkan lingkungan 3.1 Pasang sampiran agar <i>privacy</i> pasien terjaga 4. Lakukan episiotomi 1. Cuci tangan 6 langkah 2. Pakai APD sesuai standart (Celemek, masker, <i>google</i>,		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	EPISIOTOMI		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
	571.23/I- SPO/MTR/VI/2025	01	2 / 2
Prosedur	sepatu boot dan sarung tangan) - Hisap lindocain 1 % kedalam Spuit 5 cc - Saat ada his dan perineum tampak pucat, letakkan dua jari kiri kedalam Vagina diantara kepala bayi dan perineum. - Masukkan jarum di tengah fourchette dan arahkan jarum sepanjang tempat yang akan di episiotomi. - Aspirasi untuk memastikan jarum tidak masuk pembuluh darah. - Tarik jarum perlahan sambil menyuntikkan maksimal 10 ml lidocain. - Tunggu 1-2 menit hingga lidokain 1% bekerja - Saat ada his dan perinium meregang, gunting perinium sekitar 3-4 cm dengan arah mediolateralis dengan satu kali guntingan - Rapikan pasien dan bereskan alat - Rapikan pasien dengan posisi yang nyaman - Dekontaminasi sarung tangan dan peralatan yang telah digunakan dengan larutan klorin 0,5 % selama 10 menit - Cuci tangan 6 langkah - Lakukan evaluasi dan dokumentasi perkembangan pasien - Periksa dengan hati-hati apakah luka epis pada perineum mengalami perluasan laserasi (setelah bayi dan plasenta lahir) persiapan penjahitan luka episiotomi - Evaluasi hasil tindakan dan respon pasien - Catat hasil tindakan		
Unit Terkait	- IGD - Ruang Kandungan & Kebidanan		